GUÍA RÁPIDA · ENFERMERÍA

Gasometría arterial

Toma, manejo y traslado de la muestra

ANTES

- Orden médica vigente.
- Identifica al paciente: nombre completo y fecha de nacimiento.
- FiO_2 sin cambios al menos 10 minutos antes.
- Registra FiO_2 o dispositivo y temperatura.
- Pregunta por anticoagulantes o trastornos de coagulación.
- Jeringa heparinizada (de preferencia comercial), antiséptico, gasas, guantes y recipiente rígido.

PRUEBA DE ALLEN (RADIAL)

1. Ocluye radial y cubital al mismo tiempo.
2. Pide que cierre y abra la mano hasta que palidezca.
3. Libera solo la cubital.
4. El color debe volver en segundos. Si no, no punciones esa muñeca.

TÉCNICA

- Muñeca en ligera extensión sobre un rollo.
- Antisepsia y secado del sitio.
- Bisel hacia arriba, ángulo de 45°, hacia el pulso.
- El flujo arterial es pulsátil y llena la jeringa sin aspirar.

DESPUÉS

- Presión firme **al menos 5 minutos**; más si hay anticoagulación.
- Activa el dispositivo de seguridad y desecha la aguja.
- Expulsa burbujas de inmediato y tapa.
- Mezcla rodando la jeringa.
- Etiqueta: identificadores, fecha, hora, FiO_2 y temperatura.
- Envía de inmediato; idealmente analizada antes de 30 minutos.

ERRORES QUE ALTERAN EL RESULTADO

Burbujas
PaO_2 ↑ · $PaCO_2$ ↓

Exceso de heparina
Diluye; altera pH y HCO_3

Muestra venosa
PaO_2 falsamente baja

Retraso
PaO_2 ↓ · $PaCO_2$ ↑

VALORES DE REFERENCIA (ADULTO, NIVEL DEL MAR)

pH 7.35–7.45 · $PaCO_2$ 35–45 mmHg · HCO_3 22–26 mEq/L · PaO_2 80–100 mmHg. Interpreta siempre con el médico y los valores del laboratorio.

AVISA DE INMEDIATO

Dolor intenso, palidez, frialdad, entumecimiento o llenado capilar lento en la mano puncionada.