GUÍA RÁPIDA · MEDICACIÓN SEGURA

Medicamentos de alto riesgo

Barreras contra el error, de la prescripción a la administración

Definición

Medicamentos que, usados de forma incorrecta, tienen una probabilidad elevada de causar daño grave o la muerte. La lista vigente la publica Farmacia.

GRUPOS MÁS FRECUENTES

Electrolitos concentrados
KCl, fosfato de potasio, NaCl > 0.9 %, sulfato de magnesio

Insulinas
Todas

Anticoagulantes
Heparinas, enoxaparina, warfarina, trombolíticos

Opioides
Morfina, fentanilo, hidromorfona

Sedantes IV
Midazolam, propofol, dexmedetomidina

Bloqueadores neuromusculares
Rocuronio, vecuronio, succinilcolina

Vasoactivos IV
Norepinefrina, epinefrina, dopamina

Quimioterapia
Oral y parenteral

IDENTIFICACIÓN

- **Rojo** Alto riesgo; siglas AR.
- **Naranja** LASA; siglas LASA.
- Electrolitos concentrados solo en carros rojos.

PRESCRIPCIÓN

- Nombre genérico, dosis en mEq, g o mg, vía, velocidad y duración.
- Nunca “1 ámpula” como dosis ni “U” por unidades.
- Cero a la izquierda (0.5 mg); nunca a la derecha (5.0).

DOBLE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE

- Paciente: nombre completo y fecha de nacimiento.
- Medicamento contra la indicación vigente.
- Dosis: cada profesional calcula por separado.
- Vía y línea de infusión.
- Velocidad y programación de la bomba.
- Ambos registran en la nota de enfermería.
- Solo se omite ante riesgo inminente para la vida.

ANTE LA DUDA

Detén la administración y aclara con quien prescribe o con Farmacia.

REPORTA

Errores y cuasi fallas en la plataforma de Calidad. Reportar no busca culpables.