GUÍA RÁPIDA · ÁREA MÉDICA

Soporte vital básico

Repaso con base en las guías AHA 2025

SECUENCIA EN ADULTO

1. Verifica que la escena sea segura.
2. Comprueba la respuesta: toca los hombros y habla fuerte.
3. Activa el **Código Azul** y pide el DEA.
4. Revisa pulso y respiración a la vez, en no más de 10 segundos.
5. Sin pulso o con jadeos: inicia compresiones de inmediato.
6. Usa el DEA en cuanto llegue y sigue sus indicaciones.

RCP DE ALTA CALIDAD

100–120 / min
Frecuencia

5–6 cm
Profundidad en adulto

Reexpansión
Completa en cada compresión

< 10 s
Pausas mínimas

VENTILACIÓN

- Sin vía aérea avanzada: **30:2**, cada ventilación de 1 segundo.
- Con vía aérea avanzada: compresiones continuas y 1 ventilación cada 6 s.
- Con pulso y sin respiración: 1 ventilación cada 6 s; pulso cada 2 min.
- Que el tórax se eleve; evita hiperventilar.
- Cambia de compresor cada 2 minutos.

DEA

- Enciéndelo y sigue sus indicaciones.
- Parches sobre piel descubierta y seca.
- Nadie toca al paciente durante el análisis y la descarga.
- Reanuda compresiones de inmediato tras la descarga.

NIÑOS Y LACTANTES

Profundidad de un tercio del tórax (≈ 5 cm niño, ≈ 4 cm lactante). 30:2 con un reanimador y 15:2 con dos. Lactante: talón de una mano o dos pulgares.

ATRAGANTAMIENTO

Adulto y niño: 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales, alternados. Embarazo u obesidad: compresiones en el tórax. Lactante: 5 golpes y 5 compresiones torácicas. Si pierde el estado de alerta: RCP.