



## ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Лабораторная работа №1  
По дисциплине  
«Численные методы и прикладное программирование»

Тема:  
«Методы решения системы линейных уравнений.  
Число обусловленности матрицы»

Работу выполнили:

*Дзенис Ричард  
Кобелев Денис  
Якушин Владислав*

# 1 Формулировка задания

- Реализовать программным путём метод исключения Гаусса и итерационный метод Гаусса-Зейделя.
- Результат работы программы проверить с помощью предоставленных примеров.
- Ручным или программным путём рассчитать число обусловленности матриц для примеров (3) и (5).
- Для расчёта обусловленности выбрать Манхэттенскую или Евклидову норму.
- Составить отчёт с результатами вычислений и выводами, содержащими сравнение двух реализованных методов, а так же объяснить значения полученные при вычислении числа обусловленности матриц.

## 1.1 Примеры

$$\begin{cases} 1x_1 - 2x_2 + 1x_3 = 2 \\ 2x_1 - 5x_2 - 1x_3 = -1 \\ -7x_1 + 1x_3 = -2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 7 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} 5x_1 - 5x_2 - 3x_3 + 4 = -11 \\ 1x_1 - 4x_2 + 6x_3 - 4 = -10 \\ -2x_1 - 5x_2 + 4x_3 - 5 = -12 \\ -3x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 5 = 8 \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} 8x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 30 \\ -2x_1 + 8x_2 + 1x_3 = 15 \\ 1x_1 + 3x_2 - 10x_3 = 42 \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} 0.78x_1 + 0.563x_2 = 0.217 \\ 0.913x_1 + 0.659x_2 = 0.254 \end{cases} \quad (5)$$

## 2 Метод исключения Гаусса с ведущим элементом

```
// Input: linear system 'Ax=b',  
//         where Ab is matrix A combined with vector b.  
//         Size of Ab is (n, n+1).  
// Output: x.  
void solve(double **Ab, ssize_t n, double *x) {  
    ssize_t base, r, c;  
    double sum;  
  
    // Forward elimination  
    for (base = 0; base < n; base++) {  
        // Select maximal element in the column;  
        // optimize by skipping base row.  
        c = base;  
        ssize_t leading_row = base;  
        double max_value = Ab[base][base];  
        for (r = base + 1; r < n; r++) {  
            double abs_val = fabs(Ab[r][c]);  
            if (abs_val > max_value) {  
                leading_row = r;  
                max_value = abs_val;  
            }  
        }  
    }
```

```

    }
}

// Swap base row with with leading row
std::swap(Ab[base], Ab[leading_row]);

// Eliminate base column
for (r = base + 1; r < n; r++) {
    double coef = Ab[r][base] / Ab[base][base];
    for (c = base; c <= n; c++) { // including vector B
        Ab[r][c] -= coef * Ab[base][c];
    }
}

// Backward substitution
for (base = n - 1; base >= 0; base--) {
    sum = 0.0;
    for (c = base + 1; c < n; c++) {
        sum += Ab[base][c] * x[c];
    }
    x[base] = (Ab[base][n] - sum) / Ab[base][base];
}
}

```

### 3 Метод Гаусса-Зейделя

```

bool solve(double **Ab, ssize_t n, double *x, double eps) {
    ssize_t i, j;
    double acc, prev_acc = HUGE_VALF;
    do {
        acc = 0.0f;
        for (i = 0; i < n; i++) {
            double denom = Ab[i][i];
            double new_xi = Ab[i][n] / denom;
            for (j = 0; j < n; j++) {
                if (i == j)
                    continue;
                new_xi -= Ab[i][j] / denom * x[j];
            }
            acc = std::fmaxf(acc, fabs(new_xi - x[i]));
            x[i] = new_xi;
        }
        if (acc >= prev_acc)
            return false;
        prev_acc = acc;
    } while (acc > eps);
    return true;
}

```

### 4 Экспериментальное определение числа обусловленности матрицы

### 5 Выводы