MUSKELUBALANSE FOR DEG SOM LIKER Å GÅ ELLER LØPE

Naprapat Lise Karine, Optimal Bevegelse Naprapati

Dette dokumentet tar for seg løping spesifikt, men det som står her gjelder like mye for deg som liker å gå eller driver med idrett der jogging eller en form av løping er gjeldende.

For de som liker å gå raskt eller løpe er det essensielt å opprettholde en god balanse mellom leggmusklenes fleksibilitet og setesmuskulaturens styrke for å forebygge skader og optimalisere prestasjonen. Gjør man dette kan redusere risikoen for muskelplager og fremme en mer effektiv og smertefri gang/ løpsopplevelse.

Løping er en fysisk aktivitet som stiller litt ekstra krav til muskulaturen i underekstremitetene. Løpere kan ofte oppleve flere ulike muskelplager som kan påvirke deres trening, prestasjonsevne og risiko for skader.
To av de mest sentrale muskelgruppene vi erfarer løpere kan trøble med er leggmuskulaturen (i hovedsak gastrochnemius og soleus, men også de mindre leggmusklene) og setesmuskulaturen (gluteus maximus, medius og minimus).

Klinisk er det ikke sjeldent at løpere kommer innom med plager i leggene. Det kan være plager på den ene eller begge sider. Begge deler er ganske vanlig. Ubehagene beskrives ofte som at leggene alltid er stramme, at stramheten i leggene ikke kan tøyes vekk eller trenes vekk selv om det utføres styrketrening på leggen. Andre opplever smerter langs beinhinnen (eller beinhinnebetennelse- noe vi ofte ser dreier seg mer om en beinhinneirritasjon pga leggmuskulatur som kompenserer.) Ellers kan følelse av kramper, muskelstrekk eller melkesyre i leggene være plagene de søker for. Ofte er det plager som hindrer løperne i å løpe så lenge og ofte de ønsker.

Stramhet og plager i leggene kan oppstå som følge av flere faktorer. Noen ganger er det at man har begynt løpingen og økt for mye, for ofte og for fort. Andre ganger er nye sko problemet, dårlig bevegelighet i ankelleddet eller rett og slett at det blir for mye løping og lite restitusjon. Oftest ser vi at problemet ikke sitter i leggene, men i hofte/bekkenregionen.

Når leggmuskulaturen blir stram, blir den mindre fleksibel, som kan påvirke ankel mobiliteten, og forårsake endringer i løpsmønsteret. Vi ser her at det ofte blir kompensasjon i andre muskelgrupper. Og har man da i tillegg litt svak setesmuskulaturer ser man at plagene raskt kan forverre seg.
Setesmuskulaturen spiller en stor rolle i stabiliseringen av hoften og bekkenet under løping. Hvis denne store og sterke muskelgruppen ikke jobber slik den bør, om den er svak eller inaktiv, blir andre muskelgrupper tvunget til å kompensere. Dette kan skape en hel del kjedereaksjoner av problemer i bakside lår, kne og legg.
Klinisk bruker jeg å forklare det enkelt : «Når setesmuskulaturen ikke gjør jobben sin så må bakside lår (hamstrings) ta over jobben til setesmuskulaturen. Siden bakside lår nå utfører en del av jobben til setesmuskulaturen, har ikke bakside lår like stor kapasitet til å utføre sin egen oppgave. Da kommer leggmuskulaturen inn for å hjelpe bakside lår. På denne måten har man en kjedereaksjon pågående, og man kan fort kjenne at løpingen ikke fungerer så bra som tidligere.»

Når setesmuskulaturen ikke jobber tilstrekkelig under løping, må bakside lår og leggmuskulaturen jobbe hardere for å opprettholde stabilitet og kraftoverføring. Dette resulterer ofte i økt belastning, som igjen kan føre til at leggene blir mer stramme, får muskelknuter eller i verste fall akutte skader. Det er ikke uvanlig at mange havner inn i en ond sirkel her med ubehag, smerter, verk, muskelstrekk etc.

Klinisk ser man mange som har kommet inn i denne onde sirkelen som har prøvd med både hvile og betennelsesdempende. Likevel har smertene kommet tilbake igjen og igjen. Det er ikke uvanlig at plagene ikke slipper taket før man gjør en helhetlig tilnærming av problemet. Oftest dreier det da seg om å få en bevissthet om hva som er svakt, og hva som er stramt. For de fleste gjelder det å øke styrken i setesregionen, samt øke mobiliteten og redusere spenninger i bakside lår og legger. Dette kan man gjøre ved hjelp av behandling til en terapeut, mobilitetstrening, tøyeøvelser eller bruk av foam roller på egen hånd.

Har du plager eller ønsker å bedre løpsprestasjonene dine?
Gjenopprett balansen mellom legg, lår og setesmuskulaturen. Gjør du dette vil du redusere risikoen for overbelastningsskader og mest trolig få mer igjen for løpstreningen din. Vi ser også at løpere som begynner å trene styrke i hofteregionen etter hvert kan løpe både lengre og oftere. Likevel er det gøyeste at mange opplever at de blir både raskere og kan løpe med en mye bedre teknikk.

©COPYRIGHT 2025