

real symmetric matrix diagonalizable

$$\left\{ \begin{array}{ll} \left\{ \begin{array}{ll} A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R}) & \text{real matrix} \\ A^\top = A & \text{symmetric matrix} \end{array} \right. & \text{real symmetric matrix} \\ Ax = \lambda x & \left\{ \begin{array}{ll} \lambda \in \mathbb{C} & \text{complex eigenvalue} \\ \mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n & \text{complex eigenvector} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$$\Downarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \lambda \in \mathbb{R} & \text{real eigenvalue (1)} \\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n & \text{real eigenvector (2)} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} Ax &= \lambda x \\ \overline{Ax} &= \overline{A} \overline{x} = \overline{\lambda x} = \overline{\lambda} \overline{x} \\ \overline{x}^\top \overline{A}^\top &= (\overline{Ax})^\top = (\overline{\lambda x})^\top = \overline{\lambda} \overline{x}^\top \\ \overline{x}^\top A &\stackrel{\text{symmetric}}{=} \overline{x}^\top A^\top \stackrel{\text{real}}{=} \overline{x}^\top A = \overline{\lambda} \overline{x}^\top \\ \lambda \overline{x}^\top x &= \overline{x}^\top (\lambda x) \stackrel{Ax=\lambda x}{=} \overline{x}^\top Ax = \overline{\lambda} \overline{x}^\top x \\ \lambda \overline{x}^\top x &= \overline{\lambda} \overline{x}^\top x \\ (\lambda - \overline{\lambda}) \overline{x}^\top x &= 0 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \overline{x}^\top x = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \\ \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \end{array} \right. \Rightarrow \overline{x}^\top x \neq 0 \\ \lambda - \overline{\lambda} &= 0 \\ \lambda &= \overline{\lambda} \Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\overline{Ax})^\top x &= (\overline{x}^\top A^\top) x \stackrel{\text{symmetric}}{=} (\overline{x}^\top A) x = \overline{x}^\top (\overline{Ax}) \\ (L) &= (\overline{Ax})^\top x = \overline{x}^\top (\overline{Ax}) = (R) \\ (L) &= (\overline{Ax})^\top x \stackrel{Ax=\lambda x}{=} (\overline{\lambda x})^\top x = \overline{\lambda} \overline{x}^\top x \\ (R) &= \overline{x}^\top (\overline{Ax}) \stackrel{\text{real}}{=} \overline{x}^\top (Ax) \stackrel{Ax=\lambda x}{=} \overline{x}^\top (\lambda x) = \lambda \overline{x}^\top x \\ \overline{\lambda} \overline{x}^\top x &= (\overline{Ax})^\top x = \overline{x}^\top (\overline{Ax}) = \lambda \overline{x}^\top x \\ \overline{\lambda} \overline{x}^\top x &= \lambda \overline{x}^\top x \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \left\{ \begin{array}{ll} A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R}) & \text{real matrix} \\ A^\top = A & \text{symmetric matrix} \end{array} \right. & \text{real symmetric matrix} \\ Ax = \lambda x & \left\{ \begin{array}{ll} \lambda \in \mathbb{R} & \text{real eigenvalue} \\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n & \text{real eigenvector} \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{ll} Ax_1 = \lambda_1 x_1 & (e_1) \\ Ax_2 = \lambda_2 x_2 & (e_2) \end{array} \right. & \lambda_1 \neq \lambda_2 \end{array} \right.$$

$$\Downarrow$$

$$\mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x}_1 \perp \mathbf{x}_2$$

$$\begin{aligned}
A\mathbf{x}_2 &= \lambda_2 \mathbf{x}_2 \\
\mathbf{x}_1^\top A\mathbf{x}_2 &\stackrel{\mathbf{x}_1^\top}{=} \mathbf{x}_1^\top \lambda_2 \mathbf{x}_2 = \lambda_2 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 = (1) \\
A\mathbf{x}_1 &= \lambda_1 \mathbf{x}_1 \\
\mathbf{x}_1^\top A^\top &= (A\mathbf{x}_1)^\top = (\lambda_1 \mathbf{x}_1)^\top = \lambda_1 \mathbf{x}_1^\top \\
\mathbf{x}_1^\top A^\top &= \lambda_1 \mathbf{x}_1^\top \\
\mathbf{x}_1^\top A\mathbf{x}_2 &\stackrel{\text{symmetric}}{=} \mathbf{x}_1^\top A^\top \mathbf{x}_2 \stackrel{\mathbf{x}_2}{=} \lambda_1 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 = (2) \\
\lambda_2 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 &\stackrel{(1)}{=} \mathbf{x}_1^\top A\mathbf{x}_2 \stackrel{(2)}{=} \lambda_1 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 \\
\lambda_2 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 &= \lambda_1 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 \\
(\lambda_2 - \lambda_1) \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 &= 0 \wedge \lambda_1 \neq \lambda_2 \\
\mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 &= 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\mathbf{A}\mathbf{x}_1)^\top \mathbf{x}_2 &= (\mathbf{x}_1^\top A^\top) \mathbf{x}_2 \stackrel{\text{symmetric}}{=} (\mathbf{x}_1^\top A) \mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1^\top (\mathbf{A}\mathbf{x}_2) \\
(L) &= (\mathbf{A}\mathbf{x}_1)^\top \mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1^\top (\mathbf{A}\mathbf{x}_2) = (R) \\
(L) &= (\mathbf{A}\mathbf{x}_1)^\top \mathbf{x}_2 \stackrel{(e_1)}{=} (\lambda_1 \mathbf{x}_1)^\top \mathbf{x}_2 = \lambda_1 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 \\
(R) &= \mathbf{x}_1^\top (\mathbf{A}\mathbf{x}_2) \stackrel{(e_2)}{=} \mathbf{x}_1^\top (\lambda_2 \mathbf{x}_2) = \lambda_2 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 \\
\lambda_1 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 &= (\mathbf{A}\mathbf{x}_1)^\top \mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1^\top (\mathbf{A}\mathbf{x}_2) = \lambda_2 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 \\
\lambda_1 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2 &= \lambda_2 \mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_2
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} \left\{ \begin{array}{ll} A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R}) & \text{real matrix} \\ A^\top = A & \text{symmetric matrix} \end{array} \right. & \text{real symmetric matrix} \\ A\mathbf{x}_1 = \lambda \mathbf{x}_1 & (e) \\ \mathbf{x}_2^\top \mathbf{x}_1 = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x}_2 \perp \mathbf{x}_1 & (o) \end{cases} \\ \Downarrow \\ A\mathbf{x}_2 \perp \mathbf{x}_1 \Leftrightarrow (A\mathbf{x}_2)^\top \mathbf{x}_1 = 0
\end{cases}$$

$$\begin{aligned}
(A\mathbf{x}_2)^\top \mathbf{x}_1 &= (\mathbf{x}_2^\top A^\top) \mathbf{x}_1 \stackrel{\text{symmetric}}{=} (\mathbf{x}_2^\top A) \mathbf{x}_1 \\
&= \mathbf{x}_2^\top (A\mathbf{x}_1) \stackrel{(e)}{=} \mathbf{x}_2^\top (\lambda \mathbf{x}_1) \\
&= \lambda \mathbf{x}_2^\top \mathbf{x}_1 \stackrel{(o)}{=} \lambda \cdot 0 = 0 \\
(A\mathbf{x}_2)^\top \mathbf{x}_1 &= 0 \Leftrightarrow A\mathbf{x}_2 \perp \mathbf{x}_1
\end{aligned}$$

distance from a point to a line

$$\begin{cases} P = P(x_0, y_0) \\ L = L(x, y) = Ax + By + C = 0, A^2 + B^2 \neq 0 \end{cases} \\ \Downarrow \\ d(P, L) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

y

by shortest  $\overline{PP'}$

$$\begin{aligned}
P' &= P'(x, y) \in L = Ax + By + C = 0 \\
\Rightarrow y &= \frac{-1}{B} (Ax + C)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{PP'}^2(x, y) &= (x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 \\
&= (x_0 - x)^2 + \left( y_0 - \frac{-1}{B} (Ax + C) \right)^2 \\
&= (x - x_0)^2 + \left( \frac{A}{B}x + \frac{C}{B} + y_0 \right)^2 = \overline{PP'}^2(x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{\partial}{\partial x} \overline{PP'}^2(x) = 2(x - x_0) + 2\left(\frac{A}{B}x + \frac{C}{B} + y_0\right) \frac{A}{B} \\
&= \frac{2}{B^2} (B^2(x - x_0) + A^2x + AC + AB y_0) \\
&= \frac{2}{B^2} [(A^2 + B^2)x - (B^2x_0 - AB y_0 - AC)] \\
x &= \frac{B^2x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2}
\end{aligned}$$

or by completing the square

$$\begin{aligned}
&\overline{PP'}^2 \left( x = \frac{B^2x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2} \right) \\
&= \left( \frac{B^2x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2} - x_0 \right)^2 + \left( \frac{A}{B} \frac{B^2x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2} + \frac{C}{B} + y_0 \right)^2 \\
&= \left( \frac{-A^2x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2} \right)^2 + \left( \frac{A(B^2x_0 - AB y_0 - AC) + C(A^2 + B^2) + B(A^2 + B^2)y_0}{B(A^2 + B^2)} \right)^2 \\
&= \left( \frac{-A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2} \right)^2 + \left( \frac{AB^2x_0 + B^3y_0 + B^2C}{B(A^2 + B^2)} \right)^2 \\
&= \frac{A^2(Ax_0 + By_0 + C)^2}{(A^2 + B^2)^2} + \frac{B^2(Ax_0 + By_0 + C)^2}{(A^2 + B^2)^2} \\
&= \frac{(Ax_0 + By_0 + C)^2}{A^2 + B^2} \\
\overline{PP'} &= \overline{PP'} \left( x = \frac{B^2x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2} \right) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}
\end{aligned}$$

by perpendicular foot

$$\begin{aligned}
y &= \frac{-A}{B}x - \frac{C}{B} = \frac{-1}{B}(Ax + C), \text{ if } B \neq 0 \\
L_\perp &: \left( y = \frac{B}{A}x + K \right) \perp \left( y = \frac{-A}{B}x - \frac{C}{B} \right) : L \\
L_\perp &= L_\perp(x, y) = Bx - Ay + K = 0 \\
P &= P(x_0, y_0) \in L_\perp = B(x - x_0) - A(y - y_0) = 0 \\
L_\perp &= Bx - Ay - (Bx_0 - Ay_0) = 0
\end{aligned}$$

perpendicular foot = foot of the perpendicular  $P'$

$$\begin{aligned}
P' \in (L_\perp \cap L) &= \begin{cases} L = Ax + By + C = 0 \\ L_\perp = Bx - Ay - (Bx_0 - Ay_0) = 0 \end{cases} \\
&= \begin{cases} Ax + By = -C \\ Bx - Ay = Bx_0 - Ay_0 \end{cases} \\
P' = P'(x, y) &= \left( \frac{\begin{vmatrix} -C & B \\ Bx_0 - Ay_0 & -A \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A & B \\ B & -A \end{vmatrix}}, \frac{\begin{vmatrix} A & -C \\ B & Bx_0 - Ay_0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A & B \\ B & -A \end{vmatrix}} \right) \\
&= \left( \frac{\begin{vmatrix} C & B \\ -Bx_0 + Ay_0 & -A \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix}}, \frac{\begin{vmatrix} A & C \\ B & -Bx_0 + Ay_0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix}} \right) \\
&= \left( \frac{B^2x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2}, \frac{-ABx_0 + A^2y_0 - BC}{A^2 + B^2} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d(P, L) &= \overline{PP'} \\
&= \left\| (x_0, y_0) - \left( \frac{B^2 x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2}, \frac{-AB x_0 + A^2 y_0 - BC}{A^2 + B^2} \right) \right\| \\
&= \sqrt{\left( x_0 - \frac{B^2 x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2} \right)^2 + \left( y_0 - \frac{-AB x_0 + A^2 y_0 - BC}{A^2 + B^2} \right)^2} \\
&= \sqrt{\left( \frac{A^2 x_0 + AB y_0 + AC}{A^2 + B^2} \right)^2 + \left( \frac{AB x_0 + B^2 y_0 + BC}{A^2 + B^2} \right)^2} \\
&= \sqrt{\frac{A^2 (Ax_0 + By_0 + C)^2 + B^2 (Ax_0 + By_0 + C)^2}{(A^2 + B^2)^2}} = \sqrt{\frac{(Ax_0 + By_0 + C)^2}{A^2 + B^2}} \\
&= \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}
\end{aligned}$$

by normal vector

$$\begin{cases} \vec{n} = (A, B) \perp L = Ax + By + C = 0 \\ \vec{PP'} = P' - P = (x - x_0, y - y_0) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\vec{PP'} \cdot \vec{n} &= \left\| \vec{PP'} \right\| \left\| \vec{n} \right\| \cos \theta \\
\left| \vec{PP'} \cdot \vec{n} \right| &= \left\| \vec{PP'} \right\| \left\| \vec{n} \right\| |\cos \theta| \\
\left\| \vec{PP'} \right\| |\cos \theta| &= \left| \vec{PP'} \cdot \hat{n} \right| = \frac{\left| \vec{PP'} \cdot \vec{n} \right|}{\left\| \vec{n} \right\|} = \frac{|(x - x_0, y - y_0) \cdot (A, B)|}{\|(A, B)\|} \\
&= \frac{|A(x - x_0) + B(y - y_0)|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|-Ax_0 - By_0 + Ax + By|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\
&\stackrel{Ax+By+C=0}{\stackrel{Ax+By=-C}{=}} \frac{|-Ax_0 - By_0 - C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}
\end{aligned}$$

by Cauchy inequality

$$\begin{aligned}
Ax + By + C &= 0 \\
Ax + By &= -C \\
(Ax + By) - (Ax_0 + By_0) &= -C - (Ax_0 + By_0) \\
A(x - x_0) + B(y - y_0) &= -(Ax_0 + By_0 + C)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{PP'}^2 &= (x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 \\
[A^2 + B^2] \overline{PP'}^2 &= [A^2 + B^2] \left[ (x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 \right] \\
&\geq [A(x - x_0) + B(y - y_0)]^2 \\
&= [- (Ax_0 + By_0 + C)]^2 = (Ax_0 + By_0 + C)^2 \\
\overline{PP'}^2 &\geq \frac{(Ax_0 + By_0 + C)^2}{A^2 + B^2} \\
\overline{PP'} &\geq \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}
\end{aligned}$$

quadratic form

$$\begin{aligned}
ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f &= 0 \\
\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ax + (b/2)y \\ (b/2)x + cy \end{pmatrix} = ax^2 + bxy + cy^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
0 &= (x \ y) \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (d \ e) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + f \\
&= \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} + \mathbf{b}^\top \mathbf{x} + f, \begin{cases} A = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix} \quad A \text{ real symmetric} \\ \mathbf{b} = \begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix} \\ \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{cases}
\end{aligned}$$

homogeneous coordinate

$$(x \ y) \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x \ y \ 1) \begin{pmatrix} a & b/2 & 0 \\ b/2 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = (x \ y \ 1) \begin{pmatrix} a & b/2 & 0 \\ b/2 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
(d \ e) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= (x \ y \ 1) \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \delta & \epsilon & \zeta \\ \eta & \theta & \kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = (x \ y \ 1) \begin{pmatrix} \alpha x + \beta y + \gamma \\ \delta x + \epsilon y + \zeta \\ \eta x + \theta y + \kappa \end{pmatrix}, \begin{cases} \gamma + \eta = d \\ \zeta + \theta = e \end{cases} \\
&= (x \ y \ 1) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \gamma \\ 0 & 0 & \zeta \\ \eta & \theta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = (x \ y \ 1) \begin{pmatrix} 0 & 0 & d/2 \\ 0 & 0 & e/2 \\ d/2 & e/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
0 &= ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f \\
&= (x \ y) \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (d \ e) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + f = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} + \mathbf{b}^\top \mathbf{x} + f \\
&= (x \ y \ 1) \begin{pmatrix} a & b/2 & d/2 \\ b/2 & c & e/2 \\ d/2 & e/2 & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = (\mathbf{x}^\top \ 1) M \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, M = \begin{pmatrix} a & b/2 & d/2 \\ b/2 & c & e/2 \\ d/2 & e/2 & f \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
0 &= Q = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F \\
&= [x \ y \ 1] \begin{bmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{x}_h^\top A_Q \mathbf{x}_h \\
&= [x \ y] \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + [D \ E] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + F = \mathbf{x}^\top A_{Q,33} \mathbf{x} + \mathbf{b}^\top \mathbf{x} + F
\end{aligned}$$

standard form

$$\left(\frac{y-k}{a}\right)^2 + \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$$

$$\left(\frac{y-k}{b}\right)^2 + \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$$

$$(y-k) = 4c(x-h)^2$$

$$\left(\frac{y-k}{b}\right)^2 - \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$$

$$\left(\frac{y-k}{a}\right)^2 + \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$$

$$\left(\frac{y-k}{b}\right)^2 + \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$$

$$(y-k) - 4c(x-h)^2 = 0$$

$$\left(\frac{y-k}{b}\right)^2 - \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$$

circle	$\left(\frac{y-k}{a}\right)^2 + \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$		$b = a$
ellipse	$\left(\frac{y-k}{b}\right)^2 + \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$	vertical	$b > a$
	$\left(\frac{y-k}{b}\right)^2 + \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$	horizontal	$a > b$
parabola	$(y-k) - 4c(x-h)^2 = 0$	vertical	
	$-4c(y-k)^2 + (x-h) = 0$	horizontal	
hyperbola	$\left(\frac{y-k}{b}\right)^2 - \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$	vertical	$\frac{x-h}{a} = 0 \Rightarrow \frac{y-k}{b} = \pm 1$
	$-\left(\frac{y-k}{b}\right)^2 + \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$	horizontal	$\frac{y-k}{b} = 0 \Rightarrow \frac{x-h}{a} = \pm 1$

parametric equation

circle	$\left(\frac{y-k}{a}\right)^2 + \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \\ a \sin t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \\ a \sin t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \\ a \sin t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \\ a \sin t \\ 1 \end{pmatrix}$
ellipse	$\left(\frac{y-k}{b}\right)^2 + \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \\ b \sin t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \\ b \sin t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \\ b \sin t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \\ b \sin t \\ 1 \end{pmatrix}$
parabola	$(y-k) - 4c(x-h)^2 = 0$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
	$-4c(y-k)^2 + (x-h) = 0$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4c \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4c \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4c \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4c \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
hyperbola	$\left(\frac{y-k}{b}\right)^2 - \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cosh t \\ b \sinh t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cosh t \\ b \sinh t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cosh t \\ b \sinh t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cosh t \\ b \sinh t \\ 1 \end{pmatrix}$
	$-\left(\frac{y-k}{b}\right)^2 + \left(\frac{x-h}{a}\right)^2 = 1$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \sinh t \\ b \cosh t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \sinh t \\ b \cosh t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \sinh t \\ b \cosh t \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \sinh t \\ b \cosh t \\ 1 \end{pmatrix}$

eccentricity

$$\begin{cases} F = (0, y_F) \\ L = y - y_L = 0 \\ \epsilon = \frac{\overline{PF}}{d(P, L)} = \frac{\|(x, y) - (0, y_F)\|}{\|y - y_L\|} \end{cases} \quad \begin{cases} F : \text{focus} \\ L : \text{directrix} \\ \epsilon : \text{eccentricity} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
0 \leq \epsilon &= \frac{\overline{PF}}{d(P, L)} = \frac{\overline{PF}}{\overline{PP'}} = \frac{\|(x, y) - (0, y_F)\|}{\|(x, y) - (x, y_L)\|} = \frac{\|(x, y - y_F)\|}{\|(0, y - y_L)\|} = \frac{\sqrt{x^2 + (y - y_F)^2}}{\sqrt{(y - y_L)^2}} \\
\epsilon^2 &= \frac{x^2 + (y - y_F)^2}{(y - y_L)^2} = \frac{x^2 + y^2 - 2y_F y + y_F^2}{y^2 - 2y_L y + y_L^2} \\
0 &= x^2 + (1 - \epsilon^2) y^2 - 2(y_F - \epsilon^2 y_L) y + (y_F^2 - \epsilon^2 y_L^2) \\
&\stackrel{\epsilon \neq 1}{=} x^2 + (1 - \epsilon^2) \left[ y^2 - \frac{2(y_F - \epsilon^2 y_L)}{1 - \epsilon^2} y + \frac{y_F^2 - \epsilon^2 y_L^2}{1 - \epsilon^2} \right] \\
&= x^2 + (1 - \epsilon^2) \left[ y^2 - \frac{2(y_F - \epsilon^2 y_L)}{1 - \epsilon^2} y + \left( \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} \right)^2 - \left( \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} \right)^2 + \frac{y_F^2 - \epsilon^2 y_L^2}{1 - \epsilon^2} \right] \\
&= x^2 + (1 - \epsilon^2) \left[ \left( y - \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} \right)^2 + \frac{(y_F^2 - \epsilon^2 y_L^2)(1 - \epsilon^2) - (y_F - \epsilon^2 y_L)^2}{(1 - \epsilon^2)^2} \right] \\
&= x^2 + (1 - \epsilon^2) \left( y - \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} \right)^2 + \frac{(y_F^2 - \epsilon^2 y_L^2)(1 - \epsilon^2) - (y_F - \epsilon^2 y_L)^2}{1 - \epsilon^2} \\
&\quad \frac{(y_F^2 - \epsilon^2 y_L^2)(1 - \epsilon^2) - (y_F - \epsilon^2 y_L)^2}{1 - \epsilon^2} \\
&= (1 - \epsilon^2) y_F^2 - (\epsilon^2 - \epsilon^4) y_L^2 - y_F^2 + 2\epsilon^2 y_F y_L - \epsilon^4 y_L^2 \\
&= -\epsilon^2 y_F^2 - \epsilon^2 y_L^2 + 2\epsilon^2 y_F y_L = -\epsilon^2 (y_F - y_L)^2 \\
&\quad \frac{(y_F^2 - \epsilon^2 y_L^2)(1 - \epsilon^2) - (y_F - \epsilon^2 y_L)^2}{1 - \epsilon^2} \\
&= (1 - \epsilon^2) y_F^2 - (\epsilon^2 - \epsilon^4) y_L^2 - y_F^2 + 2\epsilon^2 y_F y_L - \epsilon^4 y_L^2 \\
&= -\epsilon^2 y_F^2 - \epsilon^2 y_L^2 + 2\epsilon^2 y_F y_L = -\epsilon^2 (y_F - y_L)^2 \\
&\quad \frac{\epsilon^2 (y_F - y_L)^2}{1 - \epsilon^2} \stackrel{\epsilon \neq 1}{=} x^2 + (1 - \epsilon^2) \left( y - \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} \right)^2 \\
&\quad 1 \stackrel{\epsilon \neq 0, 1}{=} \begin{cases} \left( \frac{x - 0}{\frac{\epsilon (y_F - y_L)}{\sqrt{1 - \epsilon^2}}} \right)^2 + \left( \frac{y - \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2}}{\frac{\epsilon (y_F - y_L)}{1 - \epsilon^2}} \right)^2 & 1 - \epsilon^2 > 0 \stackrel{\epsilon \geq 0}{\Rightarrow} 0 < \epsilon < 1 \\ - \left( \frac{x - 0}{\frac{\epsilon (y_F - y_L)}{\sqrt{\epsilon^2 - 1}}} \right)^2 + \left( \frac{y - \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2}}{\frac{\epsilon (y_F - y_L)}{1 - \epsilon^2}} \right)^2 & 1 - \epsilon^2 < 0 \stackrel{\epsilon \geq 0}{\Rightarrow} \epsilon > 1 \end{cases} \\
y &= \begin{cases} \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} \pm \frac{\epsilon (y_F - y_L)}{1 - \epsilon^2} \sqrt{1 - \left( \frac{x}{\frac{\epsilon (y_F - y_L)}{\sqrt{1 - \epsilon^2}}} \right)^2} & 0 < \epsilon < 1 \\ \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} \pm \frac{\epsilon (y_F - y_L)}{1 - \epsilon^2} \sqrt{1 + \left( \frac{x}{\frac{\epsilon (y_F - y_L)}{\sqrt{\epsilon^2 - 1}}} \right)^2} & \epsilon > 1 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$x = 0$$

$$\begin{aligned} y - \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} &= \pm \frac{\epsilon (y_F - y_L)}{1 - \epsilon^2} \\ y &= \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} \pm \frac{\epsilon (y_F - y_L)}{1 - \epsilon^2} \\ &= \frac{(1 \pm \epsilon) y_F - \epsilon (\epsilon \pm 1) y_L}{1 - \epsilon^2} \\ &= \begin{cases} \frac{(1 + \epsilon) y_F - \epsilon (\epsilon + 1) y_L}{1 - \epsilon^2} & y_+ \\ \frac{(1 - \epsilon) y_F - \epsilon (\epsilon - 1) y_L}{1 - \epsilon^2} & y_- \end{cases} \end{aligned}$$

$$\frac{y_+ + y_-}{2} - y_F = \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} - y_F = \frac{\epsilon^2 (y_F - y_L)}{1 - \epsilon^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{y_F + y_{F'}}{2} &= \frac{y_+ + y_-}{2} \\ y_{F'} &= y_+ + y_- - y_F = 2 \cdot \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} - y_F \\ &= \frac{y_F - \epsilon^2 (2y_L - y_F)}{1 - \epsilon^2} = \frac{(1 + \epsilon^2) y_F - 2\epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2} \end{aligned}$$

$$\epsilon = 0 \text{ or } \lim_{|y_L| \rightarrow \infty} \epsilon = 0$$

$$r = \overline{PF} = \|(x, y) - (0, y_F)\| = \|(x, y - y_F)\| = \sqrt{x^2 + (y - y_F)^2}$$

$$\epsilon = \frac{r}{d(P, L)} = \frac{\overline{PF}}{\overline{PP'}} = \frac{\|(x, y) - (0, y_F)\|}{\|(x, y) - (x, y_L)\|} = \frac{\|(x, y - y_F)\|}{\|(0, y - y_L)\|} = \frac{\sqrt{x^2 + (y - y_F)^2}}{|y - y_L|}$$

$$\lim_{|y_L| \rightarrow \infty} \epsilon = \lim_{|y_L| \rightarrow \infty} \frac{r}{\overline{PL}} = \lim_{|y_L| \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + (y - y_F)^2}}{|y - y_L|} = 0$$

$$\epsilon = 1$$

$$\begin{aligned} 0 &= x^2 + (1 - \epsilon^2) y^2 - 2 (y_F - \epsilon^2 y_L) y + (y_F^2 - \epsilon^2 y_L^2) \\ &\stackrel{\epsilon=1}{=} x^2 + (1 - 1^2) y^2 - 2 (y_F - 1^2 y_L) y + (y_F^2 - 1^2 y_L^2) \\ &= x^2 - 2 (y_F - y_L) y + (y_F^2 - y_L^2) \\ &= x^2 - 2 (y_F - y_L) y + (y_F + y_L) (y_F - y_L) \\ x^2 &= 2 (y_F - y_L) \left( y - \frac{y_F + y_L}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\epsilon \neq 1$$

$$\begin{aligned} 1 \stackrel{P(x,y) \equiv V(0,0)}{=} 0 + \left( \frac{0 - \frac{y_F - \epsilon^2 y_L}{1 - \epsilon^2}}{\frac{\epsilon (y_F - y_L)}{1 - \epsilon^2}} \right)^2 \\ \Rightarrow y_F - \epsilon^2 y_L = \pm \epsilon (y_F - y_L) \\ \Rightarrow \begin{cases} (1 - \epsilon) y_F = \epsilon (\epsilon - 1) y_L & + \\ (1 + \epsilon) y_F = \epsilon (\epsilon + 1) y_L & - \end{cases} \\ \Rightarrow y_F = \begin{cases} -\epsilon y_L & + \\ \epsilon y_L & - \end{cases} \end{aligned}$$



$$\epsilon = 1$$

$$\begin{aligned} x^2 &= 2(y_F - y_L) \left( y - \frac{y_F + y_L}{2} \right) \\ P(x,y) \stackrel{V(0,0)}{\Rightarrow} 0^2 &= 2(y_F - y_L) \left( 0 - \frac{y_F + y_L}{2} \right) \\ \Rightarrow 0 &= (y_F - y_L)(y_F + y_L) \\ \Rightarrow y_F &= \mp y_L \end{aligned}$$

or by definition of eccentricity

$$\begin{aligned} 0 \leq \epsilon &= \frac{\overline{PF}}{d(P, L)} = \frac{\overline{PF}}{\overline{PP'}} = \frac{\|(x, y) - (0, y_F)\|}{\|(x, y) - (x, y_L)\|} = \frac{\|(x, y - y_F)\|}{\|(0, y - y_L)\|} = \frac{\sqrt{x^2 + (y - y_F)^2}}{\sqrt{(y - y_L)^2}} \\ P(x,y) \stackrel{V(0,0)}{=} &\frac{\sqrt{0^2 + (0 - y_F)^2}}{\sqrt{(0 - y_L)^2}} = \sqrt{\left(\frac{y_F}{y_L}\right)^2} \\ \epsilon^2 &= \left(\frac{y_F}{y_L}\right)^2 \Rightarrow y_F = \mp \epsilon y_L \end{aligned}$$

actually,

$$y_F = -\epsilon y_L$$

$$0 < \epsilon < 1$$

$$c^2 = a^2 - b^2 \text{ or } c^2 = b^2 - a^2$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\epsilon(y_F - y_L)}{1 - \epsilon^2}\right)^2 - \left(\frac{\epsilon(y_F - y_L)}{\sqrt{1 - \epsilon^2}}\right)^2 &= \frac{\epsilon^2(y_F - y_L)^2}{(1 - \epsilon^2)^2} - \frac{\epsilon^2(y_F - y_L)^2}{1 - \epsilon^2} \\ &= \frac{\epsilon^2(y_F - y_L)^2}{1 - \epsilon^2} \left(\frac{1}{1 - \epsilon^2} - 1\right) = \frac{\epsilon^4(y_F - y_L)^2}{(1 - \epsilon^2)^2} = \left(\frac{\epsilon^2(y_F - y_L)}{1 - \epsilon^2}\right)^2 = \left(\frac{y_+ + y_-}{2} - y_F\right)^2 \end{aligned}$$

$$\epsilon > 1$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\epsilon(y_F - y_L)}{\epsilon^2 - 1}\right)^2 + \left(\frac{\epsilon(y_F - y_L)}{\sqrt{\epsilon^2 - 1}}\right)^2 &= \frac{\epsilon^2(y_F - y_L)^2}{(\epsilon^2 - 1)^2} + \frac{\epsilon^2(y_F - y_L)^2}{\epsilon^2 - 1} \\ &= \frac{\epsilon^2(y_F - y_L)^2}{\epsilon^2 - 1} \left(\frac{1}{\epsilon^2 - 1} + 1\right) = \frac{\epsilon^4(y_F - y_L)^2}{(\epsilon^2 - 1)^2} = \left(\frac{\epsilon^2(y_F - y_L)}{\epsilon^2 - 1}\right)^2 = \left(\frac{y_+ + y_-}{2} - y_F\right)^2 \end{aligned}$$

$$\left(\frac{c}{a}\right)^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{\left(\frac{\epsilon^2(y_F - y_L)}{\epsilon^2 - 1}\right)^2}{\left(\frac{\epsilon(y_F - y_L)}{1 - \epsilon^2}\right)^2} = \epsilon^2$$

two definition equivalence of ellipse and hyperbola

$$\begin{cases} P = (x, y) \\ F = (x_F, y_F) = (\alpha, \varphi) & F' = (x_{F'}, y_{F'}) = (\chi, \psi) \\ L = A'x + B'y + C' = 0 \end{cases}$$

$$0 \leq \epsilon = \frac{\overline{PF}}{d(P, L)} = \frac{\sqrt{(x - x_F)^2 + (y - y_F)^2}}{\frac{|A'x + B'y + C'|}{\sqrt{A'^2 + B'^2}}} = \frac{\sqrt{(x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2}}{|Ax + By + C|}, \begin{cases} A = \frac{A'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} \\ B = \frac{B'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} \\ C = \frac{C'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} \end{cases}$$

$$\epsilon^2 = \frac{(x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2}{(Ax + By + C)^2} = \frac{(x - x_F)^2 + (y - y_F)^2}{\frac{(A'x + B'y + C')^2}{A'^2 + B'^2}}$$

$$(x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 = [\epsilon(Ax + By + C)]^2$$

$$\begin{aligned} 2c = \overline{FF'} &= \|(x_F, y_F) - (x_{F'}, y_{F'})\| = \|(\alpha, \varphi) - (\chi, \psi)\| \\ &= \sqrt{(\alpha - \chi)^2 + (\varphi - \psi)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= \begin{cases} \sqrt{(x - x_F)^2 + (y - y_F)^2} + \sqrt{(x - x_{F'})^2 + (y - y_{F'})^2} & \text{ellipse} \\ \sqrt{(x - x_F)^2 + (y - y_F)^2} - \sqrt{(x - x_{F'})^2 + (y - y_{F'})^2} & \text{hyperbola} \end{cases} \\ &= \sqrt{(x - x_F)^2 + (y - y_F)^2} \pm \sqrt{(x - x_{F'})^2 + (y - y_{F'})^2} \\ &= \sqrt{(x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2} \pm \sqrt{(x - \chi)^2 + (y - \psi)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 &= \left( D \mp \sqrt{(x - \chi)^2 + (y - \psi)^2} \right)^2 \\ &= D^2 \mp 2D\sqrt{(x - \chi)^2 + (y - \psi)^2} \\ &\quad + (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D^2 &= (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 + (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \\
&\quad \pm 2\sqrt{[(x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2][(x - \chi)^2 + (y - \psi)^2]} \\
&\quad (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 + (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 - D^2 \\
&= \mp 2\sqrt{[(x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2][(x - \chi)^2 + (y - \psi)^2]} \\
&\quad \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 + (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right]^2 + D^4 \\
&\quad - 2D^2 \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 + (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] \\
&= 4 \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right] \left[ (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] \\
&\quad \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right]^2 + \left[ (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right]^2 \\
&\quad + 2 \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right] \left[ (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] + D^4 \\
&\quad - 2D^2 \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 + (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] \\
&= 4 \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right] \left[ (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] \\
0 &= \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right]^2 + \left[ (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right]^2 \\
&\quad - 2 \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right] \left[ (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] + D^4 \\
&\quad - 2D^2 \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 + (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] \\
0 &= \left\{ \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right] - \left[ (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] \right\}^2 + D^4 \\
&\quad - 2D^2 \left\{ \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right] + \left[ (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] \right\} \\
0 &= \left\{ \left[ (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] - \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right] \right\}^2 + D^4 \\
&\quad - 2D^2 \left\{ \left[ (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] - \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right] \right\} \\
&\quad - 4D^2 \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right] \\
&\quad (2D)^2 \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right] \\
&= \left\{ \left[ (x - \chi)^2 + (y - \psi)^2 \right] - \left[ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \right] - D^2 \right\}^2 \\
&= \left\{ \left[ (x - \chi)^2 - (x - \alpha)^2 \right] + \left[ (y - \psi)^2 - (y - \varphi)^2 \right] - D^2 \right\}^2 \\
&= \left\{ (2x - \chi - \alpha)(\alpha - \chi) + (2y - \psi - \varphi)(\varphi - \psi) - D^2 \right\}^2 \\
&= \left\{ 2(\alpha - \chi)x - (\alpha^2 - \chi^2) + 2(\varphi - \psi)y - (\varphi^2 - \psi^2) - D^2 \right\}^2 \\
&= \left\{ 2(\alpha - \chi)x + 2(\varphi - \psi)y - [(\alpha^2 - \chi^2) + (\varphi^2 - \psi^2) + D^2] \right\}^2 \\
D &\neq 0 \\
&\quad (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 \\
&= \left[ \frac{\alpha - \chi}{D}x + \frac{\varphi - \psi}{D}y - \left( \frac{\alpha^2 - \chi^2}{2D} + \frac{\varphi^2 - \psi^2}{2D} + \frac{D}{2} \right) \right]^2 \\
&\quad \begin{cases} (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 = [\epsilon(Ax + By + C)]^2 \\ (x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 = \left[ \frac{\alpha - \chi}{D}x + \frac{\varphi - \psi}{D}y - \left( \frac{\alpha^2 - \chi^2}{2D} + \frac{\varphi^2 - \psi^2}{2D} + \frac{D}{2} \right) \right]^2 \end{cases} \\
&\quad (A, B, C) \rightleftharpoons (\chi, \psi, D)
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} \epsilon A = \pm \frac{\alpha - \chi}{D} & \chi \pm \epsilon AD = \alpha \\ \epsilon B = \pm \frac{\varphi - \psi}{D} & \psi \pm \epsilon BD = \varphi \\ \epsilon C = \mp \left( \frac{\alpha^2 - \chi^2}{2D} + \frac{\varphi^2 - \psi^2}{2D} + \frac{D}{2} \right) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 2\epsilon C &= \mp \left( \frac{\alpha - \chi}{D} (\alpha + \chi) + \frac{\varphi - \psi}{D} (\varphi + \psi) + D \right) \\ &= \mp (\pm \epsilon A (\alpha + \chi) \pm \epsilon B (\varphi + \psi) + D) \\ \mp \epsilon (A\alpha + B\varphi + 2C) &= \pm \epsilon A\chi \pm \epsilon B\psi + D \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \pm \epsilon A \\ 0 & 1 & \pm \epsilon B \\ \pm \epsilon A & \pm \epsilon B & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi \\ \psi \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \varphi \\ \mp \epsilon (A\alpha + B\varphi + 2C) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \pm \epsilon A & \alpha \\ 0 & 1 & \pm \epsilon B & \varphi \\ 0 & \pm \epsilon B & 1 \mp \epsilon^2 A^2 & \mp \epsilon (2A\alpha + B\varphi + 2C) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \pm \epsilon A & \alpha \\ 0 & 1 & \pm \epsilon B & \varphi \\ 0 & 0 & 1 \mp \epsilon^2 A^2 \mp \epsilon^2 B^2 & \mp \epsilon (2A\alpha + 2B\varphi + 2C) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \pm \epsilon A & \alpha \\ 0 & 1 & \pm \epsilon B & \varphi \\ 0 & 0 & 1 & \frac{\mp 2\epsilon (A\alpha + B\varphi + C)}{1 \mp \epsilon^2 (A^2 + B^2)} \end{pmatrix}$$

$$A^2 + B^2 = \left( \frac{A'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} \right)^2 + \left( \frac{B'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} \right)^2 = 1$$

$$\begin{cases} \chi = \alpha \mp \epsilon AD = \alpha \mp \epsilon \frac{A'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} D \\ \psi = \varphi \mp \epsilon BD = \varphi \mp \epsilon \frac{B'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} D \\ D = \frac{\mp 2\epsilon (A\alpha + B\varphi + C)}{1 \mp \epsilon^2 (A^2 + B^2)} = \frac{\mp 2\epsilon}{1 \mp \epsilon^2} \frac{A'\alpha + B'\varphi + C'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} \quad A^2 + B^2 = 1 \end{cases}$$

actually only one solution is true

$$\begin{cases} \chi = \alpha - \epsilon AD = \alpha - \epsilon \frac{A'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} D = \alpha - \frac{2\epsilon^2}{\epsilon^2 - 1} \frac{A'^2 \alpha + A'B'\varphi + A'C'}{A'^2 + B'^2} \\ \psi = \varphi - \epsilon BD = \varphi - \epsilon \frac{B'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} D = \varphi - \frac{2\epsilon^2}{\epsilon^2 - 1} \frac{A'B'\alpha + B'^2 \varphi + B'C'}{A'^2 + B'^2} \\ D = \frac{-2\epsilon (A\alpha + B\varphi + C)}{1 - \epsilon^2 (A^2 + B^2)} = \frac{-2\epsilon}{1 - \epsilon^2} \frac{A'\alpha + B'\varphi + C'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} = \frac{2\epsilon}{\epsilon^2 - 1} \frac{A'\alpha + B'\varphi + C'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \chi = \frac{(\epsilon^2 - 1) (A'^2 + B'^2) \alpha - 2\epsilon^2 (A'^2 \alpha + A'B'\varphi + A'C')}{(\epsilon^2 - 1) (A'^2 + B'^2)} \\ \psi = \frac{(\epsilon^2 - 1) (A'^2 + B'^2) \varphi - 2\epsilon^2 (A'B'\alpha + B'^2 \varphi + B'C')}{(\epsilon^2 - 1) (A'^2 + B'^2)} \\ \left| \frac{D}{d(F, L)} \right| = \left| \frac{2\epsilon}{1 - \epsilon^2} \right| \Rightarrow \left( \frac{D}{d(F, L)} \right)^2 = \left( \frac{2\epsilon}{1 - \epsilon^2} \right)^2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & (\epsilon^2 - 1) (A'^2 + B'^2) \alpha - 2\epsilon^2 (A'^2 \alpha + A'B'\varphi + A'C') \\ &= (- (\epsilon^2 + 1) A'^2 + (\epsilon^2 - 1) B'^2) \alpha - 2\epsilon^2 (A'B'\varphi + A'C') \\ &= (- (\epsilon^2 + 1) A'^2 + (\epsilon^2 - 1) B'^2) \alpha - 2\epsilon^2 (A'B'\varphi + A'C') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{FF'}^2 &= (\alpha - \chi)^2 + (\varphi - \psi)^2 \\
&= (\alpha - (\alpha - \epsilon AD))^2 + (\varphi - (\varphi - \epsilon BD))^2 \\
&= (\epsilon D)^2 (A^2 + B^2) \\
&= (\epsilon D)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left(\frac{c}{a}\right)^2 &= \left(\frac{\overline{PF}}{d(P, L)}\right)^2 = \epsilon^2 = \left(\frac{\overline{FF'}}{D}\right)^2 = \left(\frac{2c}{D}\right)^2 \Rightarrow D = 2a \\
\left(\frac{D}{d(F, L)}\right)^2 &= \left(\frac{2\epsilon}{1 - \epsilon^2}\right)^2
\end{aligned}$$

polar coordinate

$$(x - \alpha)^2 + (y - \varphi)^2 = [\epsilon(Ax + By + C)]^2$$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

$$(r \cos \theta - \alpha)^2 + (r \sin \theta - \varphi)^2 = [\epsilon(Ar \cos \theta + Br \sin \theta + C)]^2$$

$$\text{If } \begin{cases} F = (x_F, y_F) = (\alpha, \varphi) = (0, 0) \\ L = Ax + By + C = x + p = 0 \end{cases},$$

$$(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2 = [\epsilon(r \cos \theta + p)]^2$$

$$r^2 =$$

$$r = \pm \epsilon(r \cos \theta + p)$$

$$= \pm (r\epsilon \cos \theta + \epsilon p)$$

$$r(1 \mp \epsilon \cos \theta) = \epsilon p$$

$$r = \frac{\epsilon p}{1 \mp \epsilon \cos \theta}$$

$r = \frac{\epsilon p}{1 - \epsilon \cos \theta}$  will not cross  $L = x + p = 0$  on graphs, so maybe it is a more correct solution

$$r = \frac{\epsilon p}{1 - \epsilon \cos \theta}$$

$$\epsilon = \pm \frac{r}{r \cos \theta + p}$$

partition

$\{A_i\}_{i \in I} = \{A_i | i \in I\}$  is a partition of a set  $A$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \forall i \in I (A_i \neq \emptyset) \\ A = \bigcup_{i \in I} A_i \\ \forall i, j \in I (i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset) \end{cases}$$