

```
def derivatives_in_spherical_coordinates():
    Print_Function()
    coords = (r,th,phi) = symbols('r theta phi', real=True)
    (sp3d,er,eth,ephi) = Ga.build('e_r e_theta e_phi',g=[1,r**2,r**2*sin(th)**2],coords=coords)
    grad = sp3d.grad
    f = sp3d.mv('f','scalar',f=True)
    A = sp3d.mv('A','vector',f=True)
    B = sp3d.mv('B','bivector',f=True)
    print 'f =',f
    print 'A =',A
    print 'B =',B
    print 'grad*f =',grad*f
    print 'grad|A =',grad|A
    print 'grad\\times A = -I*(grad^A) =',-sp3d.i*(grad^A)
    print '%\\nabla^{\{2\}}f =',grad|(grad*f)
    print 'grad^B =',grad^B
    """
    print '( \\nabla\\W\\nabla )\\bm{e}_{r} =',((grad^grad)*er).trigsimp()
    print '( \\nabla\\W\\nabla )\\bm{e}_{\\theta} =',((grad^grad)*eth).trigsimp()
    print '( \\nabla\\W\\nabla )\\bm{e}_{\\phi} =',((grad^grad)*ephi).trigsimp()
    """
    return
```

Code Output:

$$f = f$$
$$A = A^r \boldsymbol{e_r} + A^\theta \boldsymbol{e_\theta} + A^\phi \boldsymbol{e_\phi}$$
$$B = B^{r\theta} \boldsymbol{e_r} \wedge \boldsymbol{e_\theta} + B^{r\phi} \boldsymbol{e_r} \wedge \boldsymbol{e_\phi} + B^{\phi\theta} \boldsymbol{e_\theta} \wedge \boldsymbol{e_\phi}$$
$$\boldsymbol{\nabla} f = \partial_r f \boldsymbol{e_r} + \frac{1}{r^2} \partial_\theta f \boldsymbol{e_\theta} + \frac{\partial_\phi f}{r^2 \sin^2(\theta)} \boldsymbol{e_\phi}$$
$$\boldsymbol{\nabla} \cdot A = \frac{A^\theta}{\tan(\theta)} + \partial_\phi A^\phi + \partial_r A^r + \partial_\theta A^\theta + \frac{2A^r}{r}$$
$$\boldsymbol{\nabla} \times A = -I(\boldsymbol{\nabla} \wedge A) = r^2 \left( \left( -\frac{1}{2} \cos(2\theta) + \frac{1}{2} \right) \partial_\theta A^\phi + A^\phi \sin(2\theta) - \partial_\phi A^\theta \right) \boldsymbol{e_r} + \left( (-r^2 \partial_r A^\phi - 2r A^\phi) \sin^2(\theta) + \partial_\phi A^r \right) \boldsymbol{e_\theta} + \left( r^2 \partial_r A^\theta + 2r A^\theta - \partial_\theta A^r \right) \boldsymbol{e_\phi}$$
$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \left( r^2 \partial_r^2 f + 2r \partial_r f + \partial_\theta^2 f + \frac{\partial_\theta f}{\tan(\theta)} + \frac{\partial_\phi^2 f}{\sin^2(\theta)} \right)$$
$$\boldsymbol{\nabla} \wedge B = \frac{1}{r^2} \left( r^2 \partial_r B^{\phi\phi} + 4r B^{\phi\phi} - \frac{2B^{r\phi}}{\tan(\theta)} - \partial_\theta B^{r\phi} + \frac{\partial_\phi B^{r\theta}}{\sin^2(\theta)} \right) \boldsymbol{e_r} \wedge \boldsymbol{e_\theta} \wedge \boldsymbol{e_\phi}$$

```
def derivatives_in_paraboloidal_coordinates():
    Print_Function()
    coords = (u,v,phi) = symbols('u v phi', real=True)
    (par3d,er,eth,ephi) = Ga.build('e_u e_v e_phi',X=[u*v*cos(phi),u*v*sin(phi),(u**2-v**2)/2],coords=coords,norm=True)
    grad = par3d.grad
    f = par3d.mv('f','scalar',f=True)
    A = par3d.mv('A','vector',f=True)
    B = par3d.mv('B','bivector',f=True)
    print '#Derivatives in Paraboloidal Coordinates'
    print 'f =',f
    print 'A =',A
    print 'B =',B
    print 'grad*f =',grad*f
    print 'grad|A =',grad|A
    (-par3d.i*(grad^A)).Fmt(3,'grad\\times A = -I*(grad^A)')
    print 'grad^B =',grad^B
    return
```

Code Output: Derivatives in Paraboloidal Coordinates

$$f=f$$
$$A=A^u\boldsymbol{e_u}+A^v\boldsymbol{e_v}+A^\phi\boldsymbol{e_\phi}$$
$$B=B^{uv}\boldsymbol{e_u}\wedge\boldsymbol{e_v}+B^{u\phi}\boldsymbol{e_u}\wedge\boldsymbol{e_\phi}+B^{v\phi}\boldsymbol{e_v}\wedge\boldsymbol{e_\phi}$$
$$\boldsymbol{\nabla}f=\frac{\partial_u f}{\sqrt{u^2+v^2}}\boldsymbol{e_u}+\frac{\partial_v f}{\sqrt{u^2+v^2}}\boldsymbol{e_v}+\frac{\partial_\phi f}{uv}\boldsymbol{e_\phi}$$
$$\boldsymbol{\nabla}\cdot A=\left(\frac{u}{(u^2+v^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{1}{u\sqrt{u^2+v^2}}\right)A^u+\left(\frac{v}{(u^2+v^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{1}{v\sqrt{u^2+v^2}}\right)A^v+\frac{\partial_u A^u}{\sqrt{u^2+v^2}}+\frac{\partial_v A^v}{\sqrt{u^2+v^2}}+\frac{\partial_\phi A^\phi}{uv}$$
$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\times A=-I(\boldsymbol{\nabla}\wedge A)=&\frac{1}{uv(u^2+v^2)}\left(uv\sqrt{u^2+v^2}\partial_v A^\phi+u\sqrt{u^2+v^2}A^\phi+(-u^2-v^2)\partial_\phi A^v\right)\boldsymbol{e_u}\\&+\frac{1}{uv(u^2+v^2)}\left(-uv\sqrt{u^2+v^2}\partial_u A^\phi-v\sqrt{u^2+v^2}A^\phi+(u^2+v^2)\partial_\phi A^u\right)\boldsymbol{e_v}\\&+\frac{1}{(u^2+v^2)^{\frac{3}{2}}}(uA^v-vA^u+(u^2+v^2)(-\partial_v A^u+\partial_u A^v))\boldsymbol{e_\phi}\end{aligned}$$
$$\boldsymbol{\nabla}\wedge B=\left(\left(\frac{u}{(u^2+v^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{1}{u\sqrt{u^2+v^2}}\right)B^{v\phi}+\left(-\frac{v}{(u^2+v^2)^{\frac{3}{2}}}-\frac{1}{v\sqrt{u^2+v^2}}\right)B^{u\phi}-\frac{\partial_v B^{u\phi}}{\sqrt{u^2+v^2}}+\frac{\partial_u B^{v\phi}}{\sqrt{u^2+v^2}}+\frac{\partial_\phi B^{uv}}{uv}\right)\boldsymbol{e_u}\wedge\boldsymbol{e_v}\wedge\boldsymbol{e_\phi}$$

```
def derivatives_in_elliptic_cylindrical_coordinates():
    Print_Function()
    a = symbols('a', real=True)
    coords = (u,v,z) = symbols('u v z', real=True)
    (elip3d,er,eth,ephi) = Ga.build('e_u e_v e_z',X=[a*cosh(u)*cos(v),a*sinh(u)*sin(v),z], coords=coords ,norm=True)
    grad = elip3d.grad
    f = elip3d.mv('f','scalar',f=True)
    A = elip3d.mv('A','vector',f=True)
    B = elip3d.mv('B','bivector',f=True)
    print 'f =',f
    print 'A =',A
    print 'B =',B
    print 'grad*f =',grad*f
    print 'grad|A =',grad|A
    print '-I*(grad^A) =',-elip3d.i*(grad^A)
    print 'grad^B =',grad^B
    return
```

Code Output:

$$f=f$$
$$A=A^u\boldsymbol{e_u}+A^v\boldsymbol{e_v}+A^z\boldsymbol{e_z}$$
$$B=B^{uv}\boldsymbol{e_u}\wedge\boldsymbol{e_v}+B^{uz}\boldsymbol{e_u}\wedge\boldsymbol{e_z}+B^{vz}\boldsymbol{e_v}\wedge\boldsymbol{e_z}$$
$$\boldsymbol{\nabla}f=\frac{\partial_u f}{\sqrt{\sin^2(v)\cosh^2(u)+\cos^2(v)\sinh^2(u)}|a|}\boldsymbol{e_u}+\frac{\partial_v f}{\sqrt{\sin^2(v)\cosh^2(u)+\cos^2(v)\sinh^2(u)}|a|}\boldsymbol{e_v}+\partial_z f\boldsymbol{e_z}$$
$$\boldsymbol{\nabla}\cdot A=\frac{|a|}{2\left((\cos^2(v)\cos(2v)-\cos^2(v)\cosh(2u))\sinh^2(u)+(\cos(2v)\cosh^2(u)-\cosh^2(u)\cosh(2u))\sin^2(v)\right)\left(\sin^2(v)\cosh^2(u)+\cos^2(v)\sinh^2(u)\right)^{\frac{5}{2}}}\left((A^u\sinh(2u)+A^v\sin(2v))\left(\sin^2(v)\cosh^2(u)+\cos^2(v)\sinh^2(u)\right)\left(\sin^2(v)\cos(2v)\cosh^2(u)-\sin^2(v)\cosh^2(u)\cosh(2u)+\cos^2(v)\cos(2v)\sinh^2(u)-\cos^2(v)\sinh^2(u)\cosh(2u)\right)+\right.\\ \left.-I(\boldsymbol{\nabla}\wedge A)=\left(-\partial_z A^v+\frac{\partial_v A^z}{\sqrt{\sin^2(v)+\sinh^2(u)}|a|}\right)\boldsymbol{e_u}+\left(\partial_z A^u-\frac{\partial_u A^z}{\sqrt{\sin^2(v)+\sinh^2(u)}|a|}\right)\boldsymbol{e_v}-\frac{\sqrt{2}|a|}{2(-\cos(2v)+\cosh(2u))^{\frac{5}{2}}}\left(\left(-2(\cosh(2u)-1)^2+2\right)\partial_u A^v+\left(2(\cosh(2u)-1)^2-2\right)\partial_v A^u+(2\partial_v A^u-2\partial_u A^v)\cos^2(2v)+(2A^u\sin(2v)-4\cos(2v)\partial_v A^u+4\cos(2v)\partial_u A^v+4\partial_v A^u-4\partial_u A^v)\cosh(2u)-A^u\sin(4v)+2A^v\cos(2v)\right)\right)\boldsymbol{e_u}\wedge\boldsymbol{e_v}+\\ \boldsymbol{\nabla}\wedge B=-\frac{|a|}{2\left((\cos^2(v)\cos(2v)-\cos^2(v)\cosh(2u))\sinh^2(u)+(\cos(2v)\cosh^2(u)-\cosh^2(u)\cosh(2u))\sin^2(v)\right)\left(\sin^2(v)\cosh^2(u)+\cos^2(v)\sinh^2(u)\right)^{\frac{5}{2}}}\left((B^{uz}\sin(2v)-B^{vz}\sinh(2u))\left(\sin^2(v)\cosh^2(u)+\cos^2(v)\sinh^2(u)\right)\left(\sin^2(v)\cos(2v)\cosh^2(u)-\sin^2(v)\cosh^2(u)\cosh(2u)+\cos^2(v)\cos(2v)\sinh^2(u)-\cos^2(v)\sinh^2(u)\cosh(2u)\right)+\right.\\ \left.-I(\boldsymbol{\nabla}\wedge B)=\left(-\partial_z B^v+\frac{\partial_v B^z}{\sqrt{\sin^2(v)+\sinh^2(u)}|a|}\right)\boldsymbol{e_u}+\left(\partial_z B^u-\frac{\partial_u B^z}{\sqrt{\sin^2(v)+\sinh^2(u)}|a|}\right)\boldsymbol{e_v}-\frac{\sqrt{2}|a|}{2(-\cos(2v)+\cosh(2u))^{\frac{5}{2}}}\left(\left(-2(\cosh(2u)-1)^2+2\right)\partial_u B^v+\left(2(\cosh(2u)-1)^2-2\right)\partial_v B^u+(2\partial_v B^u-2\partial_u B^v)\cos^2(2v)+(2B^u\sin(2v)-4\cos(2v)\partial_v B^u+4\cos(2v)\partial_u B^v+4\partial_v B^u-4\partial_u B^v)\cosh(2u)-B^u\sin(4v)+2B^v\cos(2v)\right)\right)\boldsymbol{e_u}\wedge\boldsymbol{e_v}+\\ \boldsymbol{\nabla}\cdot B=\frac{|a|}{2\left((\cos^2(v)\cos(2v)-\cos^2(v)\cosh(2u))\sinh^2(u)+(\cos(2v)\cosh^2(u)-\cosh^2(u)\cosh(2u))\sin^2(v)\right)\left(\sin^2(v)\cosh^2(u)+\cos^2(v)\sinh^2(u)\right)^{\frac{5}{2}}}\left((B^{uv}\sinh(2u)+B^{uz}\sin(2v))\left(\sin^2(v)\cosh^2(u)+\cos^2(v)\sinh^2(u)\right)\left(\sin^2(v)\cos(2v)\cosh^2(u)-\sin^2(v)\cosh^2(u)\cosh(2u)+\cos^2(v)\cos(2v)\sinh^2(u)-\cos^2(v)\sinh^2(u)\cosh(2u)\right)+\right.\\ \left.-I(\boldsymbol{\nabla}\wedge B)=\left(-\partial_z B^v+\frac{\partial_v B^z}{\sqrt{\sin^2(v)+\sinh^2(u)}|a|}\right)\boldsymbol{e_u}+\left(\partial_z B^u-\frac{\partial_u B^z}{\sqrt{\sin^2(v)+\sinh^2(u)}|a|}\right)\boldsymbol{e_v}-\frac{\sqrt{2}|a|}{2(-\cos(2v)+\cosh(2u))^{\frac{5}{2}}}\left(\left(-2(\cosh(2u)-1)^2+2\right)\partial_u B^v+\left(2(\cosh(2u)-1)^2-2\right)\partial_v B^u+(2\partial_v B^u-2\partial_u B^v)\cos^2(2v)+(2B^u\sin(2v)-4\cos(2v)\partial_v B^u+4\cos(2v)\partial_u B^v+4\partial_v B^u-4\partial_u B^v)\cosh(2u)-B^u\sin(4v)+2B^v\cos(2v)\right)\right)\boldsymbol{e_u}\wedge\boldsymbol{e_v}+\\ \boldsymbol{\nabla}\wedge B=\left(\left(\frac{u}{(u^2+v^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{1}{u\sqrt{u^2+v^2}}\right)B^{v\phi}+\left(-\frac{v}{(u^2+v^2)^{\frac{3}{2}}}-\frac{1}{v\sqrt{u^2+v^2}}\right)B^{u\phi}-\frac{\partial_v B^{u\phi}}{\sqrt{u^2+v^2}}+\frac{\partial_u B^{v\phi}}{\sqrt{u^2+v^2}}+\frac{\partial_\phi B^{uv}}{uv}\right)\boldsymbol{e_u}\wedge\boldsymbol{e_v}\wedge\boldsymbol{e_\phi}$$

```
def derivatives_in_prolate_spheroidal_coordinates():
    Print_Function()
    a = symbols('a', real=True)
    coords = (xi,eta,phi) = symbols('xi eta phi', real=True)
    (ps3d,er,eth,ephi) = Ga.build('e_xi e_eta e_phi',X=[a*sinh(xi)*sin(eta)*cos(phi),a*sinh(xi)*sin(eta)*sin(phi),
                                                         a*cosh(xi)*cos(eta)], coords=coords,norm=True)

    grad = ps3d.grad
    f = ps3d.mv('f','scalar',f=True)
    A = ps3d.mv('A','vector',f=True)
    B = ps3d.mv('B','bivector',f=True)
    print 'f =',f
    print 'A =',A
    print 'B =',B
    print 'grad*f =',grad*f
    print 'grad|A =',grad|A
    (-ps3d.i*(grad^A)).Fmt(3,'-I*(grad^A)')
    (grad^B).Fmt(3,'grad^B')
    return
```

Code Output:

$$\begin{aligned} f &= f \\ A &= A^\xi \boldsymbol{e}_\xi + A^\eta \boldsymbol{e}_\eta + A^\phi \boldsymbol{e}_\phi \\ B &= B^{\xi\xi} \boldsymbol{e}_\xi \wedge \boldsymbol{e}_\eta + B^{\xi\xi} \boldsymbol{e}_\xi \wedge \boldsymbol{e}_\phi + B^{\phi\phi} \boldsymbol{e}_\eta \wedge \boldsymbol{e}_\phi \\ \boldsymbol{\nabla} f &= \frac{\partial_\xi f}{\sqrt{\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)} |a|} \boldsymbol{e}_\xi + \frac{\partial_\eta f}{\sqrt{\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)} |a|} \boldsymbol{e}_\eta + \frac{\partial_\phi f}{a \sin(\eta) \sinh(\xi)} \boldsymbol{e}_\phi \\ \boldsymbol{\nabla} \cdot A &= \frac{1}{a^2 \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^3 \sin(\eta) \sinh(\xi)} \left( a \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^3 \partial_\phi A^\phi + \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^{\frac{5}{2}} A^\eta \cos(\eta) \sinh(\xi) |a| + \left(\frac{1}{2} \left(A^\eta \sin(2\eta) + A^\xi \sinh(2\xi)\right) \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^{\frac{3}{2}} \sin(\eta) \sinh(\xi) + \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^{\frac{5}{2}} \left(\partial_\eta A^\eta + \partial_\xi A^\xi\right) \sin(\eta) \sinh(\xi) + \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^{\frac{5}{2}} A^\xi \sin(\eta) \cosh(\xi) \right) |a| \Big) \\ -I(\boldsymbol{\nabla} \wedge A) &= \frac{1}{a^2 \sin(\eta)} \left( -\frac{a \partial_\phi A^\eta}{\sinh(\xi)} + \left( \frac{A^\phi \cos(\eta)}{\sqrt{\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)}} + \frac{\sin(\eta) \partial_\eta A^\phi}{\sqrt{\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)}} \right) |a| \right) \boldsymbol{e}_\xi \\ &\quad - \frac{1}{a^2 \sinh(\xi)} \left( -\frac{a \partial_\phi A^\xi}{\sin(\eta)} + \left( \frac{A^\phi \cosh(\xi)}{\sqrt{\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)}} + \frac{\sinh(\xi) \partial_\xi A^\phi}{\sqrt{\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)}} \right) |a| \right) \boldsymbol{e}_\eta \\ &\quad + \frac{1}{2 \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^{\frac{3}{2}} |a|} \left( \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right) \left(2 \partial_\xi A^\eta - 2 \partial_\eta A^\xi\right) + A^\eta \sinh(2\xi) - A^\xi \sin(2\eta) \right) \boldsymbol{e}_\phi \\ \boldsymbol{\nabla} \wedge B &= \frac{1}{a^2 \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^3 \sin(\eta) \sinh(\xi)} \left( a \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^3 \partial_\phi B^{\xi\xi} + \left(\frac{1}{2} \left(B^{\phi\phi} \sinh(2\xi) - B^{\xi\xi} \sin(2\eta)\right) \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^{\frac{3}{2}} \sin(\eta) \sinh(\xi) + \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^{\frac{5}{2}} \left(\partial_\xi B^{\phi\phi} - \partial_\eta B^{\xi\xi}\right) \sin(\eta) \sinh(\xi) + \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^{\frac{5}{2}} B^{\phi\phi} \sin(\eta) \cosh(\xi) - \left(\sin^2(\eta) + \sinh^2(\xi)\right)^{\frac{5}{2}} B^{\xi\xi} \cos(\eta) \sinh(\xi) \right) |a| \Big) \boldsymbol{e}_\xi \wedge \boldsymbol{e}_\eta \wedge \boldsymbol{e}_\phi \end{aligned}$$