Siz3r — średnie różnice pomiarów

Porównanie 1 zdjęcia i 2 zdjęć | 4 osoby | po 6 prób na wariant

1 ZDJĘCIE — ŚREDNIA POMYŁKA

8,77 cm

101 dostępnych porównań

2 ZDJĘCIA — ŚREDNIA POMYŁKA

9,66 cm

101 dostępnych porównań

EFEKT DODANIA 2. ZDJĘCIA

0,89 cm gorzej

Większa średnia pomyłka w tych plikach

Średnia pomyłka: o ile cm wynik odbiega od rzeczywistego pomiaru, niezależnie od tego, czy jest większy, czy mniejszy.
Zawyżenie / zaniżenie: + oznacza wynik za duży, − za mały. Zawyżenia i zaniżenia mogą się znosić w średniej.
Licznik obejmuje tylko pola z obiema wartościami: Siz3r i rzeczywistą. 4 (2 + 2) = po 2 kompletne pola w każdym wariancie.

Mierzony wymiar	Średnio o ile Siz3r się myli [cm]		Co daje 2. zdjęcie?	Średnie zawyżenie lub zaniżenie [cm]		Liczba pomiarów z pełnymi danymi
	1 zdjęcie	2 zdjęcia		1 zdjęcie	2 zdjęcia	
Wzrost	0,00	0,00	Bez zmiany	0,00	0,00	12 (6 + 6)
Obwód szyi	4,33	3,33	1,00 cm lepiej	+4,17	+3,00	12 (6 + 6)
Szerokość ramion	1,75	1,75	Bez zmiany	+1,75	+0,25	8 (4 + 4)
Obwód klatki piersiowej	4,50	5,33	0,83 cm gorzej	-0,50	+0,67	12 (6 + 6)
Obwód biustu	4,67	5,50	0,83 cm gorzej	-0,33	+0,83	12 (6 + 6)
Obwód pod biustem	5,50	5,17	0,33 cm lepiej	+2,83	+3,50	12 (6 + 6)
Długość ramienia	1,00	3,75	2,75 cm gorzej	+1,00	+3,25	8 (4 + 4)
Obwód ramienia	6,17	1,67	4,50 cm lepiej	-4,50	+0,33	12 (6 + 6)
Obwód nadgarstka	2,33	3,67	1,33 cm gorzej	-1,33	+3,67	12 (6 + 6)
Długość tułowia	21,00	20,33	0,67 cm lepiej	+21,00	+20,33	6 (3 + 3)
Długość przodu	5,00	5,00	Bez zmiany	+5,00	+5,00	4 (2 + 2)
Długość pleców	1,50	1,50	Bez zmiany	+1,50	+1,50	4 (2 + 2)
Długość pleców do bioder	10,00	10,00	Bez zmiany	+10,00	+10,00	4 (2 + 2)
Obwód talii	19,00	21,83	2,83 cm gorzej	+19,00	+21,83	12 (6 + 6)
Obwód bioder	25,17	23,33	1,83 cm lepiej	+25,17	+23,33	12 (6 + 6)
Wysokość stanu	18,00	19,00	1,00 cm gorzej	+18,00	+19,00	6 (3 + 3)
Obwód uda	8,17	15,83	7,67 cm gorzej	+5,17	+12,83	12 (6 + 6)
Długość nogawki po wewnętrznej	8,00	8,00	Bez zmiany	-3,33	-4,00	6 (3 + 3)
Obwód kolana	16,67	25,50	8,83 cm gorzej	+16,33	+25,50	12 (6 + 6)
Obwód łydki	10,00	8,83	1,17 cm lepiej	-6,67	+7,83	12 (6 + 6)
Obwód kostki	10,33	9,83	0,50 cm lepiej	-0,67	+9,83	12 (6 + 6)

2 zdjęcia: 7 wymiarów dokładniej, 8 mniej dokładnie, 6 bez zmiany. Braki pominięto; każda próba ma jednakową wagę.

Osoby, kolejne próby i sposób liczenia

Średnia pomyłka poniżej obejmuje dostępne pomiary danej osoby lub próby.

Osoba	Liczba prób 1 zdjęcie	Liczba prób 2 zdjęcia	Średnia pomyłka [cm] 1 zdjęcie	Średnia pomyłka [cm] 2 zdjęcia	Co daje 2. zdjęcie?
BB	1	1	5,82	8,65	2,82 cm gorzej
JB	2	2	11,17	11,64	0,48 cm gorzej
PF	2	2	6,96	7,58	0,62 cm gorzej
RF	1	1	8,56	8,94	0,38 cm gorzej

Wyniki poszczególnych prób

Plik	Osoba	Liczba zdjęć	Numer próby	Brakujące rzeczywiste pomiary	Średnia pomyłka [cm]	Zawyżenie / zaniżenie [cm]
BB-1photo-1.pdf	BB	1	1	4	5,82	+3,24
BB-2photos-1.pdf	BB	2	1	4	8,65	+6,53
JB-1photo-1.pdf	JB	1	1	0	10,50	+7,40
JB-1photo-2.pdf	JB	1	2	0	11,83	+7,36
JB-2photos-1.pdf	JB	2	1	0	11,45	+11,31
JB-2photos-2.pdf	JB	2	2	0	11,83	+11,79
PF-1photo-1.pdf	PF	1	1	8	6,38	-1,62
PF-1photo-2.pdf	PF	1	2	8	7,54	+4,31
PF-2photos-1.pdf	PF	2	1	8	7,23	+3,08
PF-2photos-2.pdf	PF	2	2	8	7,92	+6,38
RF-1photo-1.pdf	RF	1	1	5	8,56	+6,44
RF-2photos-1.pdf	RF	2	1	5	8,94	+7,06

Metoda i zakres

- Liczbę zdjęć i numer próby odczytano z nazw plików. Kolumn „Poprzednie” i „Zmiana” w PDF nie dodano jako prób.
- Odczytano 252 pozycje: 202 z pomiarem rzeczywistym i 50 bez niego. Wszystkie dostępne różnice przeliczono i sprawdzono.
- Główna tabela waży próby jednakowo. Excel zawiera także rozbicie na osoby i wymiary oraz wariant z równą wagą osób.
- Łączny błąd jest średnią po dostępnych pozycjach. Klatkę i biust zachowano osobno; wzrost uwzględniono (wszędzie błąd 0).
- PDF źródłowe przypisują wartości rzeczywiste do nazw według kolejności wierszy. W tym raporcie zachowano te przypisania.
- Licznik sprawdza każde pole osobno. Pole bez wartości Siz3r lub pomiaru rzeczywistego jest pominięte w średniej i liczniku.