Grafiks I=f(U)

```
clc, clear;
Phi = [400 100 44.444 25 11.111];

phi = linspace(11, 400);

i_11 =  [242 170 85 47 19];
i_25 =  [161 124 75 44 18];
i_44 =  [78 62 42 29 15];
i_100 = [50 40 27 19 10];
i_400 = [26 20 13 8 5];

figure;
hold on;
plot(Phi, i_11, '-', 'DisplayName', 'Φ = 11,11 m^{-2}');
plot(Phi, i_25, '-', 'DisplayName', 'Φ = 25 m^{-2}');
plot(Phi, i_44, '-', 'DisplayName', 'Φ = 44,44 m^{-2}');
plot(Phi, i_100, '-', 'DisplayName', 'Φ = 100 m^{-2}');
plot(Phi, i_400, '-', 'DisplayName', 'Φ = 400 m^{-2}');
hold off;
xlabel('U (V)');
ylabel('I (\mu A)');
title('I=f(U)');
legend('Location','northwest')
grid on;
xlim([0 410]);
ylim([0 250]);
```



Grafiks I=f(Φ)

```
U = [5 10 15 30 50];

u = linspace(5,50);

I_5  = [26 50 78 161 242];
I_10 = [20 40 62 124 170];
I_15 = [13 27 42 75 85];
I_30 = [8 19 29 44 47];
I_50 = [5 10 15 18 19];

p_5 = polyfit(U, I_5, 2);
p_10 = polyfit(U, I_10, 2);
p_15 = polyfit(U, I_15, 2);
p_30 = polyfit(U, I_30, 2);
p_50 = polyfit(U, I_50, 2);

I_fit_5  = polyval(p_5, u);
I_fit_10 = polyval(p_10, u);
I_fit_15 = polyval(p_15, u);
I_fit_30 = polyval(p_30, u);
I_fit_50 = polyval(p_50, u);

figure;
hold on;
plot(u, I_fit_5, '-', 'DisplayName', 'U = 5 V');
plot(u, I_fit_10, '-', 'DisplayName', 'U = 10 V');
plot(u, I_fit_15, '-', 'DisplayName', 'U = 15 V');
plot(u, I_fit_30, '-', 'DisplayName', 'U = 30 V');
plot(u, I_fit_50, '-', 'DisplayName', 'U = 50 V');
plot(U, I_5, 'o', 'HandleVisibility', 'off');
plot(U, I_10, 'o', 'HandleVisibility', 'off');
plot(U, I_15, 'o', 'HandleVisibility', 'off');
plot(U, I_30, 'o', 'HandleVisibility', 'off');
plot(U, I_50, 'o', 'HandleVisibility', 'off');
hold off;
xlabel('Φ (1/m^2)');
ylabel('I (\mu A)');
title('I=f(Φ) polinomiālā aproksimācija');
legend('Location','northwest')
grid on;
xlim([5 50]);
ylim([0 250]);
```



Published with MATLAB® R2025b