

2020 年上海市普通高中学业水平等级性考试

生物试卷

考生注意：

1. 本试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟。

2. 本考试设试卷和答题纸两部分，试卷包括试题与答题要求；所有答题必须涂（选择题）或写（综合题）在答题纸上；做在试卷上一律不得分。

3. 答题前，考生务必在答题纸上用钢笔或圆珠笔清楚填写姓名、准考证号，并将核对后的条形码贴在指定位置上。

4. 答题纸与试卷在试题编号上是一一对应的，答题时应特别注意，不能错位。

一、选择题（共 40 分，每小题 2 分，每小题只有一个正确答案）

1. “芳林新叶催陈叶，流水前波让后波”，新叶中叶绿素的合成必须含有的离子是()

A. Mg^{2+} B. Fe^{2+} C. Zn^{+} D. Ca^{2+}

2. 观察 1000 个酵母菌有丝分裂，根据表格分析时间最长的是()

G1	S 期
440	303

A. G1 期 B. G2 期 C. S 期 D. M 期

3. B 淋巴细胞分化形成浆细胞和记忆 B 淋巴细胞，他们相同的是()

A. 细胞形态相同 B. 蛋白质相同 C. 遗传物质相同 D. mRNA 相同

4. HIV 通过 cd4 受体主要感染 T 淋巴细胞，主要阻断了人体的()


A. 细胞免疫 B. 体液免疫 C. 非特异性免疫 D. 特异性免疫

5. 根据表格检测的结果，被检测的物质含有的成分有()

双缩脲	蓝色
苏丹Ⅲ染液	橘红色
班氏试剂	砖红色

A. 脂肪、还原性糖 B. 蛋白质、脂肪 C. 蛋白质、还原性糖 D. 蛋白质、淀粉

6. 据图有丝分裂后，产生的子代的基因型为()



A. DE 和 de B. DdEe C. DDEE D. ddee


7. 长期在夜间摄入过多营养物质，更容易引起肥胖，主要是因为这种生活习惯会导致()

A. 胰高血糖素长期偏高 B. 胰岛素长期偏高
C. 胰高血糖素长期不变 D. 胰岛素长期不变

8. A（抗病）对 a（不抗病），B（高秆）对 b（矮秆），亲本为 AAbb 与 aaBB，杂交后得到 F_1 ，对 F_1 测交，子代中，矮秆抗病的个体的基因型为()

A. AaBb B. Aabb C. AAbb D. aabb

9. 图为人类卵细胞形成过程示意图, I~V 表示卵细胞形成过程中不同的细胞名称, 阿拉伯数字代表染色体数, 细胞内 DNA 含量与卵原细胞相同的是细胞()



A. I

B. II III

C. I II III

D. I II III V IV

10. 炎热的夏天, 人剧烈运动大汗淋漓, 此时会导致人低血压的是()

A. 血容量上升 B. 心输出量上升 C. 心率下降 D. 血管管壁舒张

11. H_2O_2 溶液的盖子开, 测定其是否变质, 可以加入的物质是()

①生鸡肝 ②生土豆片 ③熟鸡肝 ④炸薯条

A. ①②

B. ①②③

C. ①②④

D. ②③④

12. 向冷却的糯米饭上倒酵母菌的酒曲, 盖上盖子并戳几个小孔, 放置 5 天后产生大量水, 10 天后产生酒精, 期间的过程是()

A. 有氧

B. 无氧

C. 先有氧后无氧

D. 先无氧后有氧

13. 对除去顶芽的植物侧芽施加浓度为 a 生长素生长出果实的时间为 10 天, 当保留顶芽时, 再施加浓度为 a 的生长素, 侧芽生长出果实的时间为()

①6 天

②8 天

③12 天

④14 天

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

14. 将胆固醇由肝脏运进组织细胞的脂蛋白是()





A. CM

B. VLDL

C. LDL

D. HDL

15. 互花千草入侵某湿地, 欲调查其入侵程度, 所用样方正确的是()



16.2017年11月,中国科学家首创的猴无性繁殖程序如图,并培育出“中中”。据图回答 培育“中中”所涉及的生物技术是()




图 5

- A.转基因技 B.细胞融合技术 C.干细胞技术 D.细胞核移植技术


17.1927年,200多只东方铃蟾被科研人从北京市移入山东地区,经过百余年的进化,相比北京市的蟾蜍()

- A.基因库相同 B.都没发生基因突变 C.具有地理隔离 D.基因都定向改变

18.新冠病毒刚刚爆发时检测病患并及时隔离的措施属于()

- A.注射疫苗 B.控制传染源 C.切断传播途径 D.保护易感人群

19.下列四幅图中,最能与抗原 X 发生反应的抗体是()



- A.抗体 X B.抗体 Y C.抗体 Z D.抗体 W

20.S₁、S₂、S₃ 是烟草花上的复等位基因,已知同种配子传粉子代不育,则“?”的基因型为()


	S ₁ S ₃	S ₂ S ₃
S ₁ S ₃	S ₁ S ₃	S ₁ S ₂ 、S ₁ S ₃ 、S ₂ S ₃
S ₁ S ₂	?	S ₁ S ₂ 、S ₁ S ₃ 、S ₂ S ₃

- A.S₁S₂、S₂S₃、S₁S₃ B.S₁S₁、S₂S₃、S₁S₃
C.S₂S₃、S₁S₃、S₃S₂ D.S₁S₂、S₁S₃

二、综合题（五大题，共 60 分）

（一）微生物与饮食安全（12 分）

兴趣小组通过研究“使用公筷对餐后菜品细菌数量的影响”图为,实验选用4道菜,每道菜分为3盘,一盘取样冷藏,一盘使用公筷,一盘不用公筷.实验者分别使用公筷和不使用公筷吃4道菜,同一实验者吃同一道菜的次数必须相同。



21. (3 分) 实验使用的餐具、筷子及取样工具需经过_____处理,接种方法是_____。

22. (2 分) 培养基 X 应使用_____。

A. 不加碳源的选择培养基

B. 牛肉膏蛋白胨通用培养基

C. 不加氮源的选择培养基

D. 以菜品为碳源的通用培养基

23. (2 分) 为达到实验目的,同一菜品不同组间的取样方法是_____。

A. 第一次取样质量可以不同

B. 第一次取样位置可以不同

C. 第二次取样量等于第一次

D. 第二次取样位置可以不同

菜名	结果 (cfu/g)			
	餐前	餐后		
		公筷	非公筷	未食用
凉拌黄瓜	14000	16000	45000	-
盐水虾	160	150	220	-
炒芦笋	30	30	530	-
干锅茶树菇	1100	4600	79000	-

24. (3 分) 微生物的来源是()(多选)

A. 口腔

B. 菜肴

C. 筷子

D. 空气

25. (2 分) 使用公筷可以防止传染病传播的原理是()

A. 抑制微生物繁殖

B. 抑制微生物的传播

C. 减少微生物的生长

D. 促进微生物繁殖

(二) 人类遗传病的防治 (12 分)

人通过视锥细胞的视蛋白来分别感受红、绿、蓝三种颜色，其中红视蛋白异常导致红色盲，绿视蛋白异常导致绿色盲，这两个蛋白的基因在 X 染色体上紧密连锁，且会发生如图所示的交换。




26. (2 分) 该变异发生在减数第一次分裂_____期。

27. (2 分) 图 8 可能导致的变异是()

- A. 碱基对缺失
B. 染色体结构变异
C. 碱基对替换
D. 染色体数量变异

28. (2 分) 含有图中染色体 4 的男性表现型为_____。

下图为某红色盲的家系图



29. (2 分) 据图判断遗传病属于_____ (显性/隐性) 遗传病。

30. (3 分) III-8 与表现型正常的男性婚配，生出红色盲的概率为_____，患者性别一定为_____。

31. (1 分) 对一个患有该病的男性，想要生育正常的孩子，应采取_____的措施后再生育。

- A. 基因检测
B. 基因治疗
C. 遗传咨询
D. 染色体分析


(三) 生物工程与受损神经修复 (12 分)

利用转基因技术研究小鼠 OPN 蛋白在修复小鼠受损神经中的作用机制, 研究主要经过以下阶段

I. 使用运载体 1 与小鼠 OPN 基因构建重组 DNA 分子 (如图) 并导入大肠杆菌中进行大量复制

II. 再利用 EcoRI 和 BamH I 酶从重组 DNA 分子中切取目的基因, 将目的基因与经 EcoRI 和 BamH I 酶切割的运载体 2 连接

III. 连接形成的重组 DNA 分子 2 导入小鼠受损细胞并表达, 以检测 OPN 蛋白的作用



32. (4 分) 已知 OPN 是编码 294 个氨基酸长度的 DNA 片段, 则其长度为_____个碱基对
EcoRI 酶识别序列可在重组 DNA 分子 1 到 4 上的_____

33. (2 分) 阶段 I 是为了得到大量的目的基因, 为此所选择的运载体 1 最好是
下列可以作为运载体的是()

- A. 随大肠杆菌拟核 DNA 同步复制的单链线状 DNA
- B. 随大肠杆菌拟核 DNA 同步复制的双链线状 DNA
- C. 独立于大肠杆菌拟核 DNA 能多次自主复制的双链环状 DNA
- D. 独立于目的基因整合到大肠杆菌拟核 DNA 上的双链环状 DNA

34. (2 分) 从 I~III 阶段, 至少需要筛选_____次, 发生在 I~III 过程中的_____。


35. (2 分) 筛选所得到的受体细胞中必须含有()

- A. 运载体
- B. 含 OPN 基因的重组 DNA 分子
- C. 游离的 OPN 基因
- D. 游离的 EcoRI 酶的识别序列

36. (2 分) 根据实验目的, 阐述没有选用大肠杆菌表达 OPN 蛋白的两个原因

(四) 消化道平滑肌活动的调节 (12 分)

消化道平滑肌活动异常会致腹泻或便秘，图为巨噬细胞调节消化道平滑肌活动的两条途径，其中黑色箭头表示促进途径。



37. (2 分) 据图 BMP2 使内脏神经元兴奋后，S 处的膜电位变为_____。电位变化引起物质 X 的释放，则物质 X 是_____。

38. (2 分) 据图分析 TRPV4 将膜外 Ca^{2+} 离子转运到细胞内的方式为()

A. 主动运输 B. 自由扩散 C. 协助扩散 D. 胞吞

39. (1 分) 少量的 PCE2 与平滑肌细胞膜上的受体结合，能使平滑肌剧烈收缩，这体现了这种调节的特点是_____


40. (2 分) 若 TRPV4 的功能被抑制，所受到的影响与下列哪些情况类似_____(多选)

A. 交感神经兴奋性增加 B. 交感神经兴奋性减弱
C. 副交感神经兴奋性增加 D. 副交感神经兴奋性减弱

41. (5 分) 据图，过度使用抗生素易引起便秘，分析原理

（五）光合作用（12分）

牡丹喜阳，花大色艳，但花期较短。为明确遮光对“洛阳红”牡丹花期与花色的影响，做了下列研究。图为不同遮光条件下“洛阳红”牡丹净光合速率（指光合作用合成有机物速率减去呼吸作用消耗有机物的速率）变化



42.（2分）7：30-9：00，与全光照相比，遮光条件下叶绿体中发生的变化是（ ）

- A.光合色素种类减少
- B.ATP 的量增加
- C.O₂ 的产生速率降低
- D.NADPH 的量增加

43.（4分）据图，16：30时，50光照下，“洛阳红”产生ATP的场所有___；7：30-13：30有机物积累量最少的光照条件是_____

色素含量高的花色越浓，下表显示向叶片喷施蔗糖后“洛阳红”还原性糖的含量

		还原性糖	花苷素
全光照	清水	0.5	0.66
	0.7mol/L 蔗糖溶液	0.75*	0.68
75%光照	清水	0.55	0.69
	0.7mol/L 蔗糖溶液	0.80*	0.71
50%光照	清水	0.58	0.72
	0.7mol/L 蔗糖溶液	0.88*	0.90*

44.（1分）依表五，下列关于花瓣中还原性糖的说法正确的是（ ）

- A.可以由光反应产生
- B.光照越强含量越高
- C.可以由暗反应产生
- D.蔗糖含量越高其含量越高

45.（5分）已知遮光可使洛阳红花期延长，在50%遮光条件下洛阳红的花期更长，请你设计实验在何种条件下保证洛阳红自然花色不受影响下，花期更长，并阐述实验设计思路。

2020 年上海市普通高中学业水平等级性考试

生物试卷(根据学生回整理,以官方发布为准)

考生注意:

1.本试卷满分 100 分,考试时间 60 分钟。

2.本考试设试卷和答题纸两部分,试卷包括试题与答题要求;所有答题必须涂(选择题)或写(综合题)在答题纸上;做在试卷上一律不得分。

3.答题前,考生务必在答题纸上用钢笔或圆珠笔清楚填写姓名、准考证号,并将核对后的条形码贴在指定位置上。

4.答题纸与试卷在试题编号上是一一对应的,答题时应特别注意,不能错位。

一、选择题(共 40 分,每小题 2 分,每小题只有一个正确答案)

1.“芳林新叶催陈叶,流水前波让后波”,新叶中叶绿素的合成必须含有的离子是()A

A. Mg^{2+} B. Fe^{2+} C. Zn^{+} D. Ca^{2+}

2.观察 1000 个酵母菌有丝分裂,根据表格分析时间最长的是()A

G1	S 期
440	303

A.G1 期 B.G2 期 C.S 期 D.M 期

3.B 淋巴细胞分化形成浆细胞和记忆 B 淋巴细胞,他们相同的是()C

A.细胞形态相同 B.蛋白质相同 C.遗传物质相同 D.mRNA 相同

4.HIV 通过 cd4 受体主要感染 T 淋巴细胞,主要阻断了人体的()A


A.细胞免疫 B.体液免疫 C.非特异性免疫 D.特异性免疫

5.根据表格检测的结果,被检测的物质含有的成分有()A

双缩脲	蓝色
苏丹III染液	橘红色
班氏试剂	砖红色

A.脂肪、还原性糖 B.蛋白质、脂肪 C.蛋白质、还原性糖 D.蛋白质、淀粉

6.据图有丝分裂后,产生的子代的基因型为()B



A.DE 和 de B.DdEe C.DDEE D.ddee

7.长期在夜间摄入过多营养物质,更容易引起肥胖,主要是因为这种生活习惯会导致()B

A.胰高血糖素长期偏高 B.胰岛素长期偏高

C.胰高血糖素长期不变 D.胰岛素长期不变

8.A(抗病)对 a(不抗病),B(高杆)对 b(矮杆),亲本为 AAbb 与 aaBB,杂交后得到 F_1 ,对 F_1 测交,子代中,矮杆抗病的个体的基因型为()B

A.AaBb B.Aabb C.AAbb D.aabb

9.图为人类卵细胞形成过程示意图,I~V 表示卵细胞形成过程中不同的细胞名称,阿拉伯数字代表染色体数,细胞内 DNA 含量与卵原细胞相同的是细胞()B




图 4

- A. I
B. II III
C. I II III
D. I II III V IV

10. 炎热的夏天，人剧烈运动大汗淋漓，此时会导致人低血压的是()
A. 血容量上升 B. 心输出量上升 C. 心率下降 D. 血管管壁舒张



11. H_2O_2 溶液的盖子开，测定其是否变质，可以加入的物质是()
①生鸡肝 ②生土豆片 ③熟鸡肝 ④炸薯条
A. ①② B. ①②③ C. ①②④ D. ②③④

12. 向冷却的糯米饭上倒酵母菌的酒曲，盖上盖子并戳几个小孔，放置 5 天后产生大量水，10 天后产生酒精，期间的过程是()
A. 有氧 B. 无氧 C. 先有氧后无氧 D. 先无氧后有氧

13. 对除去顶芽的植物侧芽施加浓度为 a 生长素生长出果实的时间为 10 天，当保留顶芽时，再施加浓度为 a 的生长素，侧芽生长出果实的时间为()
①6 天 ②8 天 ③12 天 ④14 天
A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

14. 将胆固醇由肝脏运进组织细胞的脂蛋白是()
A. CM B. VLDL C. LDL D. HDL

15. 互花干草入侵某湿地，欲调查其入侵程度，所用样方正确的是()



16. 2017 年 11 月，中国科学家首创的猴无性繁殖程序如图，并培育出“中中”。据图回答 培育“中中”所涉及的生物技术是()




图 5

A.转基因技 B.细胞融合技术 C.干细胞技术 D.细胞核移植技术


17.1927 年,200 多只东方铃蟾被科研人从北京市移入山东地区,经过百余年的进化,相比北京市的蟾蜍()C

A.基因库相同 B.都没发生基因突变 C.具有地理隔离 D.基因都定向改变

18.新冠病毒刚刚爆发时检测病患并及时隔离的措施属于()B

A.注射疫苗 B.控制传染源 C.切断传播途径 D.保护易感人群

19.下列四幅图中,最能与抗原 X 发生反应的抗体是()A



A.抗体 X B.抗体 Y C.抗体 Z D.抗体 W

20.S1、S2、S3 是烟草花上的复等位基因,已知同种配子传粉子代不育,则“?”的基因型为()A


	S1S3	S2S3
S1S3	S1S3	S1S2、S1S3、S2S3
S1S2	?	S1S2、S1S3、S2S3

A.S1S2、S2S3、S1S3 B.S1S1、S2S3、S1S3
C.S2S3、S1S3、S3S3 D.S1S2、S1S3

二、综合题（五大题，共 60 分）

（一）微生物与饮食安全（12 分）

兴趣小组通过研究“使用公筷对餐后菜品细菌数量的影响”图为,实验选用 4 道菜,每道菜分为 3 盘,一盘取样冷藏,一盘使用公筷,一盘不用公筷.实验者分别使用公筷和不使用公筷吃 4 道菜,同一实验者吃同一道菜次数必须相同。



21. (3 分) 实验使用的餐具、筷子及取样工具需经过_____处理,接种方法是_____。

高压蒸汽灭菌 稀释平板涂布法

22. (2 分) 培养基 X 应使用_____。B

A.不加碳源的选择培养基

B.牛肉膏蛋白胨通用培养基

C.不加氮源的选择培养基

D.以菜品为碳源的通用培养基

23. (2 分) 为达到实验目的,同一菜品不同组间的取样方法是_____。C

A.第一次取样质量可以不同

B.第一次取样位置可以不同

C.第二次取样量等于第一次

D.第二次取样位置可以不同

菜名	结果 (cfu/g)			
	餐前	餐后		
		公筷	非公筷	未食用
凉拌黄瓜	14000	16000	45000	-
盐水虾	160	150	220	-
炒芦笋	30	30	530	-
干锅茶树菇	1100	4600	79000	-

24. (3 分) 微生物的来源是() (多选)ABD

A.口腔

B.菜肴

C.筷子

D.空气

25. (2 分) 使用公筷可以防止传染病传播的原理是()B

A.抑制微生物繁殖

B.抑制微生物的传播

C.减少微生物的生长

D.促进微生物繁殖

(二) 人类遗传病的防治 (12 分)

人通过视锥细胞的视蛋白来分别感受红、绿、蓝三种颜色,其中红视蛋白异常导致红色盲,绿视蛋白异常导致绿色盲,这两个蛋白的基因在 X 染色体上紧密连锁,且会发生如图所示的交换。



26. (2 分) 该变异发生在减数第一次分裂_____期。前

27. (2 分) 图 8 可能导致的变异是()B

A.碱基对缺失


B.染色体结构变异

C.碱基对替换

D.染色体数量变异

28. (2 分) 含有图中染色体 4 的男性表现型为_____。绿色盲

下图为某红色盲的家系图



29. (2分) 据图判断遗传病属于_____ (显性/隐性) 遗传病。**隐性**
 30. (3分) III-8 与表现型正常的男性婚配, 生出红色盲的概率为_____,
 患者性别一定为_____ **1/8、男性**
 31. (1分) 对一个患有该病的男性, 想要生育正常的孩子, 应采取_____的措施后再生育。

B

- A. 基因检测 B. 基因治疗 C. 遗传咨询 D. 染色体分析


(三) 生物工程与受损神经修复 (12分)

利用转基因技术研究小鼠 PON 蛋白在修复小鼠受损神经中的作用机制, 研究主要经过以下阶段

I. 使用运载体 1 与小鼠 OPN 基因构建重组 DNA 分子 (如图) 并导入大肠杆菌中进行大量复制

II. 再利用 EcoRI 和 BamH I 酶从重组 DNA 分子中切取目的基因, 将目的基因与经 EcoRI 和 BamH I 酶切割的运载体 2 连接

III. 连接形成的重组 DNA 分子 2 导入小鼠受损细胞并表达, 以检测 OPN 蛋白的作用



32. (4分) 已知 OPN 是编码 294 个氨基酸长度的 DNA 片段, 则其长度为_____ 个碱基对
 EcoRI 酶识别序列可在重组 DNA 分子 1 到 4 上的_____ **885; 2 或 4**

33. (2分) 阶段 I 是为了得到大量的目的基因, 为此所选择的运载体 1 最好是下列可以作为运载体的是() **C**

- A. 随大肠杆菌拟核 DNA 同步复制的单链线状 DNA
 B. 随大肠杆菌拟核 DNA 同步复制的双链线状 DNA
 C. 独立于大肠杆菌拟核 DNA 能多次自主复制的双链环状 DNA
 D. 独立于目的基因整合到大肠杆菌拟核 DNA 上的双链环状 DNA

34. (2分) 从 I~III 阶段, 至少需要筛选_____ 次, 发生在 I~III 过程中的。 **2; I、III**

35. (2分) 筛选所得到的受体细胞中必须含有() **B**

- A. 运载体
 B. 含 OPN 基因的重组 DNA 分子
 C. 游离的 OPN 基因
 D. 游离的 EcoRI 酶的识别序列


36. (2分) 根据实验目的, 阐述没有选用大肠杆菌表达 OPN 蛋白的两个原因

(1) 两者复制目的基因的能力不同,小鼠的神经细胞为不增殖细胞,不能复制 OPN 基因,大肠杆菌可以分裂增殖,可以复制 OPN 基因 (1 分)

(2) 两者含有不同的细胞结构,小鼠的神经细胞中含有内质网与高尔基体,对表达出的 OPN 蛋白进行再加工,使其功能更加完善,有利于研究 PON 蛋白在修复小鼠受损神经中的作用机制,而大肠杆菌只有核糖体无法加工 OPN 蛋白 (1 分)

(四) 消化道平滑肌活动的调节 (12 分)

消化道平滑肌活动异常会致腹泻或便秘,图为巨噬细胞调节消化道平滑肌活动的两条途径,其中黑色箭头表示促进途径。



37. (2 分) 据图 BMP2 使内脏神经元兴奋后, S 处的膜电位变为_____。电位变化引起物质 X 的释放, 则物质 X 是_____。

外负内正、神经递质

38. (2 分) 据图分析 TRPV4 将膜外 Ca^{2+} 离子转运到细胞内的方式为()C

A. 主动运输 B. 自由扩散 C. 协助扩散 D. 胞吞

39. (1 分) 少量的 PCE2 与平滑肌细胞膜上的受体结合, 能使平滑肌剧烈收缩, 这体现了这种调节的特点是_____高效性

40. (2 分) 若 TRPV4 的功能被抑制, 所受到的影响与下列哪些情况类似_____(多选)AD


A. 交感神经兴奋性增加 B. 交感神经兴奋性减弱
C. 副交感神经兴奋性增加 D. 副交感神经兴奋性减弱

41. (5 分) 据图, 过度使用抗生素易引起便秘, 分析原理

过度使用抗生素会大量杀死肠道内正常的菌群(1分),导致其无法正常刺激巨噬细胞,巨噬细胞产生 BMPR2 的量减少(1分),从而对副交感神经元的刺激减弱,神经递质 X 含量低(1分),平滑肌细胞内流的 Ca^{2+} 离子减少(1分),平滑肌细胞收缩性减弱,内环境自稳态被打乱,肠胃蠕动减慢,引起便秘(1分)

(五) 光合作用 (12分)

牡丹喜阳，花大色艳，但花期较短。为明确遮光对“洛阳红”牡丹花期与花色的影响，做了下列研究。图为不同遮光条件下“洛阳红”牡丹净光合速率（指光合作用合成有机物速率减去呼吸作用消耗有机物的速率）变化



42. (2分) 7: 30-9: 00，与全光照相比，遮光条件下叶绿体中发生的变化是()C

- A.光合色素种类减少
B.ATP 的量增加
C.O₂ 的产生速率降低
D.NADPH 的量增加

43. (4分) 据图，16: 30 时，50 光照下，“洛阳红”产生 ATP 的场所有___;7: 30-13: 30 有机物积累量最少的光照条件是___叶绿体、线粒体、细胞质基质(2分) 50%光照(2分)
色素含量高的花色越浓，下表显示向叶片喷施蔗糖后“洛阳红”还原性糖的含量

		还原性糖	花苷素
全光照	清水	0.5	0.66
	0.7mol/L 蔗糖溶液	0.75*	0.68
75%光照	清水	0.55	0.69
	0.7mol/L 蔗糖溶液	0.80*	0.71
50%光照	清水	0.58	0.72
	0.7mol/L 蔗糖溶液	0.88*	0.90*

44. (1分) 依表五，下列关于花瓣中还原性糖的说法正确的是()C

- A.可以由光反应产生
B.光照越强含量越高
C.可以由暗反应产生
D.蔗糖含量越高其含量越高

45. (5分) 已知遮光可使洛阳红花期延长，在 50%遮光条件下洛阳红的花期更长，请你设计实验在何种条件下保证洛阳红自然花色不受影响下，花期更长，并阐述实验设计思路。

在 50%遮光左右设置不同的遮光比例梯度若干组,施加 70%浓度的蔗糖溶液，其他条件保持一致，选取花期最长的遮光比例(2分);在 70%蔗糖溶液浓度左右设置不同的蔗糖浓度梯度若干组,施加 50%遮光，其他条件保持一致，选取花期最长的蔗糖浓度(2分);同时施加选取的遮光

比例和蔗糖浓度,验证其花期是否最长,若低于单独条件施加的花期长度则需进一步选取不同的遮光比例与蔗糖浓度组合,重复实验进行验证(1 分)。