


2012 年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标）


一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给同的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- （5 分）已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 < 0\}$ ， $B = \{x \mid -1 < x < 1\}$ ，则（ ）
A. $A \subseteq B$ B. $B \subseteq A$ C. $A = B$ D. $A \cap B = \emptyset$
- （5 分）复数 $z = \frac{-3+i}{2+i}$ 的共轭复数是（ ）
A. $2+i$ B. $2-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$
- （5 分）在一组样本数据 (x_1, y_1) ， (x_2, y_2) ， \dots ， (x_n, y_n) ($n \geq 2$ ， x_1, x_2, \dots, x_n 不全相等) 的散点图中，若所有样本点 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, n$) 都在直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 上，则这组样本数据的样本相关系数为（ ）
A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. 1
- （5 分）设 F_1, F_2 是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点， P 为直线 $x = \frac{3a}{2}$ 上一点， $\triangle F_2PF_1$ 是底角为 30° 的等腰三角形，则 E 的离心率为（ ）
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$
- （5 分）已知正三角形 ABC 的顶点 $A(1, 1)$ ， $B(1, 3)$ ，顶点 C 在第一象限，若点 (x, y) 在 $\triangle ABC$ 内部，则 $z = -x + y$ 的取值范围是（ ）
A. $(1 - \sqrt{3}, 2)$ B. $(0, 2)$ C. $(\sqrt{3} - 1, 2)$ D. $(0, 1 + \sqrt{3})$
- （5 分）如果执行下边的程序框图，输入正整数 N ($N \geq 2$) 和实数 a_1, a_2, \dots, a_n ，输出 A, B ，则（ ）



- A. $A+B$ 为 a_1, a_2, \dots, a_n 的和
- B. $\frac{A+B}{2}$ 为 a_1, a_2, \dots, a_n 的算术平均数
- C. A 和 B 分别是 a_1, a_2, \dots, a_n 中最大的数和最小的数
- D. A 和 B 分别是 a_1, a_2, \dots, a_n 中最小的数和最大的数

7. (5 分) 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗线画出的是某几何体的三视图, 则此几何体的体积为 ()



- A. 6 B. 9 C. 12 D. 18

8. (5 分) 平面 α 截球 O 的球面所得圆的半径为 1, 球心 O 到平面 α 的距离为 $\sqrt{2}$

，则此球的体积为（ ）

- A. $\sqrt{6}\pi$ B. $4\sqrt{3}\pi$ C. $4\sqrt{6}\pi$ D. $6\sqrt{3}\pi$

9. (5分) 已知 $\omega > 0$, $0 < \phi < \pi$, 直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 和 $x = \frac{5\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin(\omega x + \phi)$ 图象的两条相邻的对称轴, 则 $\phi =$ ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{3\pi}{4}$

10. (5分) 等轴双曲线 C 的中心在原点, 焦点在 x 轴上, C 与抛物线 $y^2 = 16x$ 的准线交于点 A 和点 B , $|AB| = 4\sqrt{3}$, 则 C 的实轴长为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8

11. (5分) 当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, $4^x < \log_a x$, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ B. $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ C. $(1, \sqrt{2})$ D. $(\sqrt{2}, 2)$

12. (5分) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} + (-1)^n a_n = 2n - 1$, 则 $\{a_n\}$ 的前 60 项和为 ()

- A. 3690 B. 3660 C. 1845 D. 1830

二. 填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分.

13. (5分) 曲线 $y = x(3\ln x + 1)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为_____.

14. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3 + 3S_2 = 0$, 则公比 $q =$ _____.

15. (5分) 已知向量 \vec{a} , \vec{b} 夹角为 45° , 且 $|\vec{a}| = 1$, $|2\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{10}$, 则 $|\vec{b}| =$ _____.

16. (5分) 设函数 $f(x) = \frac{(x+1)^2 + \sin x}{x^2 + 1}$ 的最大值为 M , 最小值为 m , 则 $M + m =$ _____.

三. 解答题: 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

17. (12分) 已知 a , b , c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A , B , C 的对边,

$$c = \sqrt{3}a \sin C - c \cos A.$$

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 2$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 求 b , c .

18. (12 分) 某花店每天以每枝 5 元的价格从农场购进若干枝玫瑰花, 然后以每枝 10 元的价格出售. 如果当天卖不完, 剩下的玫瑰花做垃圾处理.

(I) 若花店一天购进 17 枝玫瑰花, 求当天的利润 y (单位: 元) 关于当天需求量 n (单位: 枝, $n \in \mathbb{N}$) 的函数解析式.

(II) 花店记录了 100 天玫瑰花的日需求量 (单位: 枝), 整理得如表:

日需求量 n	14	15	16	17	18	19	20
频数	10	20	16	16	15	13	10


(i) 假设花店在这 100 天内每天购进 17 枝玫瑰花, 求这 100 天的日利润 (单位: 元) 的平均数;

(ii) 若花店一天购进 17 枝玫瑰花, 以 100 天记录的各需求量的频率作为各需求量发生的概率, 求当天的利润不少于 75 元的概率.

19. (12 分) 如图, 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧棱垂直底面, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=BC=\frac{1}{2}AA_1$, D 是棱 AA_1 的中点.

(I) 证明: 平面 $BDC_1 \perp$ 平面 BDC

(II) 平面 BDC_1 分此棱柱为两部分, 求这两部分体积的比.



20. (12 分) 设抛物线 $C: x^2=2py$ ($p>0$) 的焦点为 F , 准线为 l , $A \in C$, 已知以 F 为圆心, FA 为半径的圆 F 交 l 于 B, D 两点;

(1) 若 $\angle BFD=90^\circ$, $\triangle ABD$ 的面积为 $4\sqrt{2}$, 求 p 的值及圆 F 的方程;

(2) 若 A, B, F 三点在同一直线 m 上, 直线 n 与 m 平行, 且 n 与 C 只有一个公共点, 求坐标原点到 m, n 距离的比值.

21. (12 分) 设函数 $f(x) = e^x - ax - 2$.


(I) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(II) 若 $a=1$, k 为整数, 且当 $x>0$ 时, $(x-k)f'(x) + x + 1 > 0$, 求 k 的最大值.

22. (10 分) 如图, D, E 分别为 $\triangle ABC$ 边 AB, AC 的中点, 直线 DE 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 F, G 两点, 若 $CF \parallel AB$, 证明:

(1) $CD=BC$;

(2) $\triangle BCD \sim \triangle GBD$.



23. 选修 4-4: 坐标系与参数方程

已知曲线 C_1 的参数方程是 $\begin{cases} x=2\cos\phi \\ y=3\sin\phi \end{cases}$ (ϕ 为参数), 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立坐标系, 曲线 C_2 的坐标系方程是 $\rho=2$, 正方形 $ABCD$ 的顶点都在 C_2 上, 且 A, B, C, D 依逆时针次序排列, 点 A 的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3})$.

(1) 求点 A, B, C, D 的直角坐标;

(2) 设 P 为 C_1 上任意一点, 求 $|PA|^2 + |PB|^2 + |PC|^2 + |PD|^2$ 的取值范围.

24. 已知函数 $f(x) = |x+a| + |x-2|$

①当 $a=-3$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 3$ 的解集;

② $f(x) \leq |x-4|$ 若的解集包含 $[1, 2]$, 求 a 的取值范围.

2012 年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给同的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | x^2 - x - 2 < 0\}$, $B = \{x | -1 < x < 1\}$, 则 ()

- A. $A \subsetneq B$ B. $B \subsetneq A$ C. $A = B$ D. $A \cap B = \emptyset$

【考点】18: 集合的包含关系判断及应用.

【专题】5J: 集合.

【分析】先求出集合 A, 然后根据集合之间的关系可判断

【解答】解: 由题意可得, $A = \{x | -1 < x < 2\}$,

$$\because B = \{x | -1 < x < 1\},$$

在集合 B 中的元素都属于集合 A, 但是在集合 A 中的元素不一定在集合 B 中, 例

$$\text{如 } x = \frac{3}{2}$$

$$\therefore B \subsetneq A.$$

故选: B.

【点评】本题主要考查了集合之间关系的判断, 属于基础试题.

2. (5 分) 复数 $z = \frac{-3+i}{2+i}$ 的共轭复数是 ()

- A. $2+i$ B. $2-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

【考点】A1: 虚数单位 i、复数; A5: 复数的运算.

【专题】11: 计算题.

【分析】利用复数的分子、分母同乘分母的共轭复数, 把复数化为 $a+bi$ 的形式, 然后求法共轭复数即可.

【解答】解：复数 $z = \frac{-3+i}{2+i} = \frac{(-3+i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{-5+5i}{5} = -1+i$.

所以复数的共轭复数为： $-1-i$.

故选：D.

【点评】本题考查复数的代数形式的混合运算，复数的基本概念，考查计算能力.

3. (5分) 在一组样本数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ($n \geq 2, x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等) 的散点图中，若所有样本点 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, n$) 都在直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 上，则这组样本数据的样本相关系数为 ()

- A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【考点】BS：相关系数.

【专题】29：规律型.

【分析】所有样本点 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, n$) 都在直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 上，故这组样本数据完全正相关，故其相关系数为 1.

【解答】解 由题设知，所有样本点 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, n$) 都在直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 上，

\therefore 这组样本数据完全正相关，故其相关系数为 1，

故选：D.

【点评】本题主要考查样本的相关系数，是简单题.

4. (5分) 设 F_1, F_2 是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点，P 为直线 $x =$

$\frac{3a}{2}$ 上一点， $\triangle F_2PF_1$ 是底角为 30° 的等腰三角形，则 E 的离心率为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$

【考点】K4：椭圆的性质.

【专题】11：计算题.

【分析】利用 $\triangle F_2PF_1$ 是底角为 30° 的等腰三角形，可得 $|PF_2|=|F_2F_1|$ ，根据P为直线 $x=\frac{3a}{2}$ 上一点，可建立方程，由此可求椭圆的离心率.

【解答】解： $\because \triangle F_2PF_1$ 是底角为 30° 的等腰三角形，


$$\therefore |PF_2|=|F_2F_1|$$

$$\because P \text{ 为直线 } x=\frac{3a}{2} \text{ 上一点}$$

$$\therefore 2\left(\frac{3}{2}a-c\right)=2c$$

$$\therefore e=\frac{c}{a}=\frac{3}{4}$$

故选：C.



【点评】本题考查椭圆的几何性质，解题的关键是确定几何量之间的关系，属于基础题.

5. (5分) 已知正三角形ABC的顶点A(1, 1)，B(1, 3)，顶点C在第一象限，若点(x, y)在 $\triangle ABC$ 内部，则 $z=-x+y$ 的取值范围是()

- A. $(1-\sqrt{3}, 2)$ B. $(0, 2)$ C. $(\sqrt{3}-1, 2)$ D. $(0, 1+\sqrt{3})$

【考点】7C：简单线性规划.

【专题】11：计算题.

【分析】由A, B及 $\triangle ABC$ 为正三角形可得，可求C的坐标，然后把三角形的各

顶点代入可求 z 的值，进而判断最大与最小值，即可求解范围

【解答】解：设 $C(a, b)$ ， $(a > 0, b > 0)$

由 $A(1, 1)$ ， $B(1, 3)$ ，及 $\triangle ABC$ 为正三角形可得， $AB=AC=BC=2$

$$\text{即 } (a-1)^2 + (b-1)^2 = (a-1)^2 + (b-3)^2 = 4$$

$$\therefore b=2, a=1+\sqrt{3} \text{ 即 } C(1+\sqrt{3}, 2)$$

则此时直线 AB 的方程 $x=1$ ， AC 的方程为 $y-1=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-1)$ ，


直线 BC 的方程为 $y-3=-\frac{\sqrt{3}}{3}(x-1)$

当直线 $x-y+z=0$ 经过点 $A(1, 1)$ 时， $z=0$ ，经过点 $B(1, 3)$ $z=2$ ，经过点 $C(1+$

$\sqrt{3}, 2)$ 时， $z=1-\sqrt{3}$


$$\therefore z_{\max}=2, z_{\min}=1-\sqrt{3}$$

故选：A.



【点评】考查学生线性规划的理解和认识，考查学生的数形结合思想．属于基本题型．

6. (5 分) 如果执行右边的程序框图，输入正整数 N ($N \geq 2$) 和实数 a_1, a_2, \dots, a_n ，输出 A, B ，则 ()



- A. $A+B$ 为 a_1, a_2, \dots, a_n 的和
- B. $\frac{A+B}{2}$ 为 a_1, a_2, \dots, a_n 的算术平均数
- C. A 和 B 分别是 a_1, a_2, \dots, a_n 中最大的数和最小的数
- D. A 和 B 分别是 a_1, a_2, \dots, a_n 中最小的数和最大的数

【考点】E7：循环结构.

【专题】5K：算法和程序框图.

【分析】分析程序中各变量、各语句的作用，再根据流程图所示的顺序，可知：

该程序的作用是求出 a_1, a_2, \dots, a_n 中最大的数和最小的数.

【解答】解：分析程序中各变量、各语句的作用，

再根据流程图所示的顺序，


可知，该程序的作用是：求出 a_1, a_2, \dots, a_n 中最大的数和最小的数

其中 A 为 a_1, a_2, \dots, a_n 中最大的数， B 为 a_1, a_2, \dots, a_n 中最小的数

故选：C.

【点评】本题主要考查了循环结构，解题的关键是建立数学模型，根据每一步分析的结果，选择恰当的数学模型，属于中档题.

7. (5 分) 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗线画出的是某几何体的三视图，则此几何体的体积为 ()



- A. 6 B. 9 C. 12 D. 18

【考点】L1: 由三视图求面积、体积.

【专题】11: 计算题.

【分析】通过三视图判断几何体的特征，利用三视图的数据求出几何体的体积即可.

【解答】解：该几何体是三棱锥，底面是俯视图，三棱锥的高为 3；
底面三角形斜边长为 6，高为 3 的等腰直角三角形，
此几何体的体积为 $V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 6 \times 3 \times 3 = 9$.

故选：B.

【点评】本题考查三视图与几何体的关系，考查几何体的体积的求法，考查计算能力.

8. (5 分) 平面 α 截球 O 的球面所得圆的半径为 1，球心 O 到平面 α 的距离为 $\sqrt{2}$ ，则此球的体积为 ()

- A. $\sqrt{6}\pi$ B. $4\sqrt{3}\pi$ C. $4\sqrt{6}\pi$ D. $6\sqrt{3}\pi$

【考点】LG：球的体积和表面积.

【专题】11：计算题.

【分析】利用平面 α 截球 O 的球面所得圆的半径为 1，球心 O 到平面 α 的距离为 $\sqrt{2}$ ，求出球的半径，然后求解球的体积.

【解答】解：因为平面 α 截球 O 的球面所得圆的半径为 1，球心 O 到平面 α 的距离为 $\sqrt{2}$ ，

所以球的半径为： $\sqrt{(\sqrt{2})^2+1}=\sqrt{3}$.

所以球的体积为： $\frac{4\pi}{3}(\sqrt{3})^3=4\sqrt{3}\pi$.

故选：B.

【点评】本题考查球的体积的求法，考查空间想象能力、计算能力.

9. (5 分) 已知 $\omega > 0$ ， $0 < \phi < \pi$ ，直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 和 $x = \frac{5\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin(\omega x + \phi)$ 图象的两条相邻的对称轴，则 $\phi =$ ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{3\pi}{4}$

【考点】HK：由 $y = A\sin(\omega x + \phi)$ 的部分图象确定其解析式.

【专题】11：计算题.

【分析】通过函数的对称轴求出函数的周期，利用对称轴以及 ϕ 的范围，确定 ϕ 的值即可.

【解答】解：因为直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 和 $x = \frac{5\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin(\omega x + \phi)$ 图象的两条相邻的对称轴，

所以 $T = 2 \times (\frac{5\pi}{4} - \frac{\pi}{4}) = 2\pi$. 所以 $\omega = 1$ ，并且 $\sin(\frac{\pi}{4} + \phi)$ 与 $\sin(\frac{5\pi}{4} + \phi)$ 分别是最大值与最小值， $0 < \phi < \pi$ ，

所以 $\phi = \frac{\pi}{4}$.

故选：A.

【点评】本题考查三角函数的解析式的求法，注意函数的最值的应用，考查计算能力.

10. (5分) 等轴双曲线 C 的中心在原点, 焦点在 x 轴上, C 与抛物线 $y^2=16x$ 的准线交于点 A 和点 B , $|AB|=4\sqrt{3}$, 则 C 的实轴长为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8

【考点】K1: 圆锥曲线的综合.

【专题】11: 计算题; 16: 压轴题.

【分析】设等轴双曲线 $C: x^2 - y^2 = a^2$ ($a > 0$), $y^2 = 16x$ 的准线 $l: x = -4$, 由 C 与抛物线 $y^2 = 16x$ 的准线交于 A, B 两点, $|AB| = 4\sqrt{3}$, 能求出 C 的实轴长.

【解答】解: 设等轴双曲线 $C: x^2 - y^2 = a^2$ ($a > 0$),

$y^2 = 16x$ 的准线 $l: x = -4$,

$\because C$ 与抛物线 $y^2 = 16x$ 的准线 $l: x = -4$ 交于 A, B 两点, $|AB| = 4\sqrt{3}$

$\therefore A(-4, 2\sqrt{3}), B(-4, -2\sqrt{3})$,

将 A 点坐标代入双曲线方程得 $a^2 = (-4)^2 - (2\sqrt{3})^2 = 4$,

$\therefore a = 2, 2a = 4$.

故选: C.

【点评】本题考查双曲线的性质和应用, 解题时要认真审题, 仔细解答, 注意挖掘题设中的隐含条件, 合理地进行等价转化.

11. (5分) 当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, $4^x < \log_a x$, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ B. $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ C. $(1, \sqrt{2})$ D. $(\sqrt{2}, 2)$

【考点】7J: 指、对数不等式的解法.

【专题】11: 计算题; 16: 压轴题.

【分析】由指数函数和对数函数的图象和性质, 将已知不等式转化为不等式恒成立问题加以解决即可

【解答】解：∵ $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时， $1 < 4^x \leq 2$

要使 $4^x < \log_a x$ ，由对数函数的性质可得 $0 < a < 1$ ，

数形结合可知只需 $2 < \log_a x$ ，


$$\therefore \begin{cases} 0 < a < 1 \\ \log_a a^2 < \log_a x \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} 0 < a < 1 \\ a^2 > x \end{cases} \text{对 } 0 < x \leq \frac{1}{2} \text{ 时恒成立}$$

$$\therefore \begin{cases} 0 < a < 1 \\ a^2 > \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{解得 } \frac{\sqrt{2}}{2} < a < 1$$

故选：B.



【点评】本题主要考查了指数函数和对数函数的图象和性质，不等式恒成立问题的一般解法，属基础题

12. (5分) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} + (-1)^n a_n = 2n - 1$ ，则 $\{a_n\}$ 的前 60 项和为 ()

A. 3690

B. 3660

C. 1845

D. 1830

【考点】8E：数列的求和.

【专题】54：等差数列与等比数列.

【分析】由题意可得 $a_2 - a_1 = 1$ ， $a_3 + a_2 = 3$ ， $a_4 - a_3 = 5$ ， $a_5 + a_4 = 7$ ， $a_6 - a_5 = 9$ ， $a_7 + a_6 = 11$

, ... $a_{50} - a_{49} = 97$, 变形可得

$a_3 + a_1 = 2$, $a_4 + a_2 = 8$, $a_7 + a_5 = 2$, $a_8 + a_6 = 24$, $a_9 + a_7 = 2$, $a_{12} + a_{10} = 40$, $a_{13} + a_{11} = 2$, $a_{16} + a_{14} = 56$

, ...利用

数列的结构特征, 求出 $\{a_n\}$ 的前 60 项和.

【解答】解: 由于数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} + (-1)^n a_n = 2n - 1$, 故有 $a_2 - a_1 = 1$, $a_3 + a_2 = 3$

, $a_4 - a_3 = 5$,

$a_5 + a_4 = 7$, $a_6 - a_5 = 9$, $a_7 + a_6 = 11$, ... $a_{50} - a_{49} = 97$.

从而可得 $a_3 + a_1 = 2$, $a_4 + a_2 = 8$, $a_7 + a_5 = 2$, $a_8 + a_6 = 24$, $a_{11} + a_9 = 2$, $a_{12} + a_{10} = 40$, $a_{15} + a_{13} = 2$

, $a_{16} + a_{14} = 56$, ...

从第一项开始, 依次取 2 个相邻奇数项的和都等于 2,

从第二项开始, 依次取 2 个相邻偶数项的和构成以 8 为首项, 以 16 为公差的等差数列.

$\{a_n\}$ 的前 60 项和为 $15 \times 2 + (15 \times 8 + \frac{15 \times 14}{2} \times 16) = 1830$,

故选: D.

【点评】本题主要考查数列求和的方法, 等差数列的求和公式, 注意利用数列的结构特征, 属于中档题.

二. 填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分.

13. (5 分) 曲线 $y = x(3\ln x + 1)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 $y = 4x - 3$.

【考点】6H: 利用导数研究曲线上某点切线方程.

【专题】11: 计算题.

【分析】先求导函数, 求出切线的斜率, 再求切线的方程.

【解答】解: 求导函数, 可得 $y' = 3\ln x + 4$,

当 $x = 1$ 时, $y' = 4$,

\therefore 曲线 $y = x(3\ln x + 1)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 $y - 1 = 4(x - 1)$, 即 $y = 4x - 3$

.

故答案为: $y=4x-3$.

【点评】 本题考查导数的几何意义, 考查点斜式求直线的方程, 属于基础题.

14. (5 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3+3S_2=0$, 则公比 $q=\underline{-2}$.

【考点】 89: 等比数列的前 n 项和.

【专题】 11: 计算题.

【分析】 由题意可得, $q \neq 1$, 由 $S_3+3S_2=0$, 代入等比数列的求和公式可求 q

【解答】 解: 由题意可得, $q \neq 1$

$$\because S_3+3S_2=0$$

$$\therefore \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} + \frac{3a_1(1-q^2)}{1-q} = 0$$

$$\therefore q^3+3q^2-4=0$$

$$\therefore (q-1)(q+2)^2=0$$

$$\because q \neq 1$$

$$\therefore q = -2$$

故答案为: -2

【点评】 本题主要考查了等比数列的求和公式的应用, 解题中要注意公比 q 是否为 1

15. (5 分) 已知向量 \vec{a} , \vec{b} 夹角为 45° , 且 $|\vec{a}|=1$, $|2\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{10}$, 则 $|\vec{b}|=\underline{3\sqrt{2}}$.

【考点】 90: 平面向量数量积的性质及其运算; 9S: 数量积表示两个向量的夹角.

【专题】 11: 计算题; 16: 压轴题.

【分析】 由已知可得, $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} |\vec{b}|$, 代入

$$|2\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{(2\vec{a}-\vec{b})^2}=\sqrt{4\vec{a}^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2}=\sqrt{4-2\sqrt{2}|\vec{b}|+|\vec{b}|^2}=\sqrt{10} \text{ 可求}$$

【解答】解：∵ $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 45^\circ$ ， $|\vec{a}|=1$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} |\vec{b}|$$

$$\therefore |2\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{(2\vec{a}-\vec{b})^2}=\sqrt{4\vec{a}^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2}=\sqrt{4-2\sqrt{2}|\vec{b}|+|\vec{b}|^2}=\sqrt{10}$$

解得 $|\vec{b}|=3\sqrt{2}$

故答案为： $3\sqrt{2}$

【点评】本题主要考查了向量的数量积 定义的应用，向量的数量积性质 $|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}^2}$ 是求解向量的模常用的方法

16. (5 分) 设函数 $f(x) = \frac{(x+1)^2 + \sin x}{x^2 + 1}$ 的最大值为 M，最小值为 m，则 $M+m=$

2.

【考点】3N：奇偶性与单调性的综合.

【专题】15：综合题；16：压轴题.

【分析】函数可化为 $f(x) = \frac{(x+1)^2 + \sin x}{x^2 + 1} = 1 + \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$ ，令 $g(x) = \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$ ，则

$g(x) = \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$ 为奇函数，从而函数 $g(x) = \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$ 的最大值与最小值的和为 0

，由此可得函数 $f(x) = \frac{(x+1)^2 + \sin x}{x^2 + 1}$ 的最大值与最小值的和.

【解答】解：函数可化为 $f(x) = \frac{(x+1)^2 + \sin x}{x^2 + 1} = 1 + \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$ ，

令 $g(x) = \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$ ，则 $g(x) = \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$ 为奇函数，

∴ $g(x) = \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$ 的最大值与最小值的和为 0.

∴ 函数 $f(x) = \frac{(x+1)^2 + \sin x}{x^2 + 1}$ 的最大值与最小值的和为 $1+1+0=2$.

即 $M+m=2$.

故答案为: 2.

【点评】本题考查函数的最值, 考查函数的奇偶性, 解题的关键是将函数化简, 转化为利用函数的奇偶性解题.

三、解答题: 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

17. (12 分) 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边,

$$c = \sqrt{3}a \sin C - c \cos A.$$

(1) 求 A ;

(2) 若 $a=2$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 求 b, c .

【考点】HU: 解三角形.

【专题】11: 计算题.

【分析】(1) 由正弦定理有: $\sqrt{3}a \sin C - \sin C \cos A - \sin C = 0$, 可以求出 A ;

(2) 有三角形面积以及余弦定理, 可以求出 b, c .

【解答】解: (1) $c = \sqrt{3}a \sin C - c \cos A$, 由正弦定理有:

$$\sqrt{3} \sin A \sin C - \sin C \cos A - \sin C = 0, \text{ 即 } \sin C \cdot (\sqrt{3} \sin A - \cos A - 1) = 0,$$

又, $\sin C \neq 0$,

$$\text{所以 } \sqrt{3} \sin A - \cos A - 1 = 0, \text{ 即 } 2 \sin \left(A - \frac{\pi}{6} \right) = 1,$$

$$\text{所以 } A = \frac{\pi}{3};$$

$$(2) S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A = \sqrt{3}, \text{ 所以 } bc = 4,$$

$$a = 2, \text{ 由余弦定理得: } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \text{ 即 } 4 = b^2 + c^2 - bc,$$

$$\text{即有 } \begin{cases} bc = 4 \\ b^2 + c^2 - bc = 4 \end{cases},$$

解得 $b = c = 2$.

【点评】本题综合考查了三角公式中的正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式的综合应用, 诱导公式与辅助角公式在三角函数化简中的应用是求解的基础,

解题的关键是熟练掌握基本公式

18. (12 分) 某花店每天以每枝 5 元的价格从农场购进若干枝玫瑰花, 然后以每枝 10 元的价格出售. 如果当天卖不完, 剩下的玫瑰花做垃圾处理.

(I) 若花店一天购进 17 枝玫瑰花, 求当天的利润 y (单位: 元) 关于当天需求量 n (单位: 枝, $n \in \mathbb{N}$) 的函数解析式.

(II) 花店记录了 100 天玫瑰花的日需求量 (单位: 枝), 整理得如表:

日需求量 n	14	15	16	17	18	19	20
频数	10	20	16	16	15	13	10

(i) 假设花店在这 100 天内每天购进 17 枝玫瑰花, 求这 100 天的日利润 (单位: 元) 的平均数;

(ii) 若花店一天购进 17 枝玫瑰花, 以 100 天记录的各需求量的频率作为各需求量发生的概率, 求当天的利润不少于 75 元的概率.

【考点】36: 函数解析式的求解及常用方法; BB: 众数、中位数、平均数; CS: 概率的应用.

【专题】15: 综合题; 5I: 概率与统计.

【分析】(I) 根据卖出一枝可得利润 5 元, 卖不出一枝可得赔本 5 元, 即可建立分段函数;

(II) (i) 这 100 天的日利润的平均数, 利用 100 天的销售量除以 100 即可得到结论;

(ii) 当天的利润不少于 75 元, 当且仅当日需求量不少于 16 枝, 故可求当天的利润不少于 75 元的概率.

【解答】解: (I) 当日需求量 $n \geq 17$ 时, 利润 $y=85$; 当日需求量 $n < 17$ 时, 利润 $y=10n-85$; (4 分)

\therefore 利润 y 关于当天需求量 n 的函数解析式 $y = \begin{cases} 10n-85, & n < 17 \\ 85, & n \geq 17 \end{cases} (n \in \mathbb{N}^*)$ (6 分)

(II) (i) 这 100 天的日利润的平均数为 $\frac{55 \times 10 + 65 \times 20 + 75 \times 16 + 85 \times 54}{100} = 76.4$ 元; (9 分)


(ii) 当天的利润不少于 75 元，当且仅当日需求量不少于 16 枝，故当天的利润不少于 75 元的概率为 $P=0.16+0.16+0.15+0.13+0.1=0.7$. (12 分)

【点评】本题考查函数解析式的确定，考查概率知识，考查利用数学知识解决实际问题，属于中档题.

19. (12 分) 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧棱垂直底面， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AC=BC=\frac{1}{2}AA_1$ ，D 是棱 AA_1 的中点.

(I) 证明：平面 $BDC_1 \perp$ 平面 BDC

(II) 平面 BDC_1 分此棱柱为两部分，求这两部分体积的比.



【考点】L2：棱柱的结构特征；LF：棱柱、棱锥、棱台的体积；LY：平面与平面垂直.

【专题】11：计算题；14：证明题.

【分析】(I) 由题意易证 $DC_1 \perp$ 平面 BDC ，再由面面垂直的判定定理即可证得平面 $BDC_1 \perp$ 平面 BDC ；

(II) 设棱锥 $B-DACC_1$ 的体积为 V_1 ， $AC=1$ ，易求 $V_1=\frac{1}{3} \times \frac{1+2}{2} \times 1 \times 1=\frac{1}{2}$ ，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积 $V=1$ ，于是可得 $(V-V_1):V_1=1:1$ ，从而可得答案.

【解答】证明：(1) 由题意知 $BC \perp CC_1$ ， $BC \perp AC$ ， $CC_1 \cap AC=C$ ，

$\therefore BC \perp$ 平面 ACC_1A_1 ，又 $DC_1 \subset$ 平面 ACC_1A_1 ，

$\therefore DC_1 \perp BC$.

由题设知 $\angle A_1DC_1=\angle ADC=45^\circ$ ，

$\therefore \angle CDC_1 = 90^\circ$, 即 $DC_1 \perp DC$, 又 $DC \cap BC = C$,

$\therefore DC_1 \perp$ 平面 BDC , 又 $DC_1 \subset$ 平面 BDC_1 ,

\therefore 平面 $BDC_1 \perp$ 平面 BDC ;

(2) 设棱锥 $B-DACC_1$ 的体积为 V_1 , $AC=1$, 由题意得 $V_1 = \frac{1}{3} \times \frac{1+2}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$,

又三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积 $V=1$,

$\therefore (V - V_1) : V_1 = 1 : 1$,

\therefore 平面 BDC_1 分此棱柱两部分体积的比为 $1 : 1$.

【点评】 本题考查平面与平面垂直的判定, 着重考查线面垂直的判定定理的应用与棱柱、棱锥的体积, 考查分析, 表达与运算能力, 属于中档题.

20. (12 分) 设抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l , $A \in C$, 已知以 F 为圆心, FA 为半径的圆 F 交 l 于 B, D 两点;

(1) 若 $\angle BFD = 90^\circ$, $\triangle ABD$ 的面积为 $4\sqrt{2}$, 求 p 的值及圆 F 的方程;

(2) 若 A, B, F 三点在同一直线 m 上, 直线 n 与 m 平行, 且 n 与 C 只有一个公共点, 求坐标原点到 m, n 距离的比值.

【考点】 J1: 圆的标准方程; K8: 抛物线的性质; K1: 圆锥曲线的综合.

【专题】 15: 综合题; 16: 压轴题.

【分析】 (1) 由对称性知: $\triangle BFD$ 是等腰直角 \triangle , 斜边 $|BD| = 2p$ 点 A 到准线 l 的距离 $d = |FA| = |FB| = \sqrt{2}p$, 由 $\triangle ABD$ 的面积 $S_{\triangle ABD} = 4\sqrt{2}$, 知 $\frac{1}{2} \times BD \times d = \frac{1}{2} \times 2p \times \sqrt{2}p = 4\sqrt{2}$, 由此能求出圆 F 的方程.

(2) 由对称性设 $A(x_0, \frac{x_0^2}{2p})$ ($x_0 > 0$), 则 $F(0, \frac{p}{2})$ 点 A, B 关于点 F 对称得:

$$B(-x_0, p - \frac{x_0^2}{2p}) \Rightarrow p - \frac{x_0^2}{2p} = -\frac{p}{2} \Leftrightarrow x_0^2 = 3p^2, \text{ 得 } A(\sqrt{3}p, \frac{3p}{2}), \text{ 由此能求出坐标}$$

原点到 m, n 距离的比值.

【解答】 解: (1) 由对称性知: $\triangle BFD$ 是等腰直角 \triangle , 斜边 $|BD| = 2p$ 点 A 到准线 l 的距离 $d = |FA| = |FB| = \sqrt{2}p$,

$\because \triangle ABD$ 的面积 $S_{\triangle ABD} = 4\sqrt{2}$,

$$\therefore \frac{1}{2} \times BD \times d = \frac{1}{2} \times 2p \times \sqrt{2}p = 4\sqrt{2},$$

解得 $p=2$, 所以 F 坐标为 $(0, 1)$,

\therefore 圆 F 的方程为 $x^2 + (y-1)^2 = 8$.

(2) 由题设 $A(x_0, \frac{x_0^2}{2p})$ ($x_0 > 0$), 则 $F(0, \frac{p}{2})$,

$\because A, B, F$ 三点在同一直线 m 上,

又 AB 为圆 F 的直径, 故 A, B 关于点 F 对称.

由点 A, B 关于点 F 对称得: $B(-x_0, p - \frac{x_0^2}{2p}) \Rightarrow p - \frac{x_0^2}{2p} = \frac{p}{2} \Leftrightarrow x_0^2 = 3p^2$

得: $A(\sqrt{3}p, \frac{3p}{2})$, 直线 $m: y = \frac{\frac{3p}{2} - \frac{p}{2}}{\sqrt{3}p}x + \frac{p}{2} \Leftrightarrow x - \sqrt{3}y + \frac{\sqrt{3}p}{2} = 0$,

$$x^2 = 2py \Leftrightarrow y = \frac{x^2}{2p} \Rightarrow y' = \frac{x}{p} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{3}p \Rightarrow \text{切点 } P(\frac{\sqrt{3}p}{3}, \frac{p}{6})$$

$$\text{直线 } n: y - \frac{p}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - \frac{\sqrt{3}p}{3}) \Leftrightarrow x - \sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{6}p = 0$$

坐标原点到 m, n 距离的比值为 $\frac{\frac{\sqrt{3}p}{2}}{\frac{\sqrt{3}p}{6}} = 3$.

【点评】 本题考查抛物线与直线的位置关系的综合应用, 具体涉及到抛物线的简单性质、圆的性质、导数的应用, 解题时要认真审题, 仔细解答, 注意合理地进行等价转化.

21. (12 分) 设函数 $f(x) = e^x - ax - 2$.

(I) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(II) 若 $a=1$, k 为整数, 且当 $x > 0$ 时, $(x-k)f'(x) + x + 1 > 0$, 求 k 的最大值.

【考点】 6B: 利用导数研究函数的单调性; 6E: 利用导数研究函数的最值.

【专题】 15: 综合题; 16: 压轴题; 32: 分类讨论; 35: 转化思想.

【分析】 (I) 求函数的单调区间, 可先求出函数的导数, 由于函数中含有字母

a, 故应按 a 的取值范围进行分类讨论研究函数的单调性, 给出单调区间;

(II) 由题设条件结合 (I), 将不等式, $(x-k) f'(x) + x + 1 > 0$ 在 $x > 0$ 时成

立转化为 $k < \frac{x+1}{e^x-1} + x$ ($x > 0$) 成立, 由此问题转化为求 $g(x) = \frac{x+1}{e^x-1} + x$ 在 $x >$

0 上的最小值问题, 求导, 确定出函数的最小值, 即可得出 k 的最大值;

【解答】解: (I) 函数 $f(x) = e^x - ax - 2$ 的定义域是 \mathbb{R} , $f'(x) = e^x - a$,

若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) = e^x - a \geq 0$, 所以函数 $f(x) = e^x - ax - 2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.

若 $a > 0$, 则当 $x \in (-\infty, \ln a)$ 时, $f'(x) = e^x - a < 0$;

当 $x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) = e^x - a > 0$;

所以, $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增.

(II) 由于 $a=1$, 所以, $(x-k) f'(x) + x + 1 = (x-k)(e^x - 1) + x + 1$

故当 $x > 0$ 时, $(x-k) f'(x) + x + 1 > 0$ 等价于 $k < \frac{x+1}{e^x-1} + x$ ($x > 0$) ①

令 $g(x) = \frac{x+1}{e^x-1} + x$, 则 $g'(x) = \frac{-xe^x-1}{(e^x-1)^2} + 1 = \frac{e^x(e^x-x-2)}{(e^x-1)^2}$

由 (I) 知, 当 $a=1$ 时, 函数 $h(x) = e^x - x - 2$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

而 $h(1) < 0$, $h(2) > 0$,

所以 $h(x) = e^x - x - 2$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一的零点,

故 $g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一的零点, 设此零点为 α , 则有 $\alpha \in (1, 2)$

当 $x \in (0, \alpha)$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x \in (\alpha, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$;

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值为 $g(\alpha)$.

又由 $g'(\alpha) = 0$, 可得 $e^\alpha = \alpha + 2$ 所以 $g(\alpha) = \alpha + 1 \in (2, 3)$

由于①式等价于 $k < g(\alpha)$, 故整数 k 的最大值为 2.


【点评】 本题考查利用导数求函数的最值及利用导数研究函数的单调性, 解题的关键是第一小题应用分类的讨论的方法, 第二小题将问题转化为求函数的最小值问题, 本题考查了转化的思想, 分类讨论的思想, 考查计算能力及推理判断的能力, 综合性强, 是高考的重点题型, 难度大, 计算量也大, 极易出

错.

22. (10分) 如图, D, E 分别为 $\triangle ABC$ 边 AB, AC 的中点, 直线 DE 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 F, G 两点, 若 $CF \parallel AB$, 证明:

(1) $CD=BC$;

(2) $\triangle BCD \sim \triangle GBD$.



【考点】N4: 相似三角形的判定.

【专题】14: 证明题.

【分析】(1) 根据 D, E 分别为 $\triangle ABC$ 边 AB, AC 的中点, 可得 $DE \parallel BC$, 证明四边形 ADCF 是平行四边形, 即可得到结论;

(2) 证明两组对应角相等, 即可证得 $\triangle BCD \sim \triangle GBD$.

【解答】证明: (1) \because D, E 分别为 $\triangle ABC$ 边 AB, AC 的中点

$\therefore DE \parallel BC, AD=DB$

$\because AB \parallel CF, \therefore$ 四边形 BDFC 是平行四边形

$\therefore CF \parallel BD, CF=BD$

$\therefore CF \parallel AD, CF=AD$

\therefore 四边形 ADCF 是平行四边形

$\therefore AF=CD$


$\because \widehat{BC} = \widehat{AF}, \therefore BC=AF, \therefore CD=BC.$

(2) 由 (1) 知 $\widehat{BC} = \widehat{AF}$, 所以 $\widehat{BF} = \widehat{AC}$.

所以 $\angle BGD = \angle DBC$.

因为 $GF \parallel BC$, 所以 $\angle BDG = \angle ADF = \angle DBC = \angle BDC$.

所以 $\triangle BCD \sim \triangle GBD$.



【点评】 本题考查几何证明选讲，考查平行四边形的证明，考查三角形的相似，属于基础题.

23. 选修 4-4：坐标系与参数方程

已知曲线 C_1 的参数方程是 $\begin{cases} x=2\cos\phi \\ y=3\sin\phi \end{cases}$ (ϕ 为参数)，以坐标原点为极点， x 轴的正半轴为极轴建立坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程是 $\rho=2$ ，正方形 $ABCD$ 的顶点都在 C_2 上，且 A, B, C, D 依逆时针次序排列，点 A 的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3})$.

(1) 求点 A, B, C, D 的直角坐标；

(2) 设 P 为 C_1 上任意一点，求 $|PA|^2 + |PB|^2 + |PC|^2 + |PD|^2$ 的取值范围.

【考点】Q4：简单曲线的极坐标方程；Q8：点的极坐标和直角坐标的互化；QL：椭圆的参数方程.

【专题】15：综合题；16：压轴题.

【分析】(1) 确定点 A, B, C, D 的极坐标，即可得点 A, B, C, D 的直角坐标；

(2) 利用参数方程设出 P 的坐标，借助于三角函数，即可求得 $|PA|^2 + |PB|^2 + |PC|^2 + |PD|^2$ 的取值范围.

【解答】解：(1) 点 A, B, C, D 的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3}), (2, \frac{5\pi}{6}), (2, \frac{4\pi}{3}), (2, \frac{11\pi}{6})$

点 A, B, C, D 的直角坐标为 $(1, \sqrt{3}), (-\sqrt{3}, 1), (-1, -\sqrt{3}), (\sqrt{3}, -1)$

(2) 设 $P(x_0, y_0)$ ，则 $\begin{cases} x_0=2\cos\phi \\ y_0=3\sin\phi \end{cases}$ (ϕ 为参数)

$$t = |PA|^2 + |PB|^2 + |PC|^2 + |PD|^2 = 4x^2 + 4y^2 + 16 = 32 + 20\sin^2\phi$$

$$\because \sin^2\phi \in [0, 1]$$

$$\therefore t \in [32, 52]$$

【点评】本题考查极坐标与直角坐标的互化，考查圆的参数方程的运用，属于中档题.

24. 已知函数 $f(x) = |x+a| + |x-2|$

①当 $a = -3$ 时，求不等式 $f(x) \geq 3$ 的解集；

② $f(x) \leq |x-4|$ 若的解集包含 $[1, 2]$ ，求 a 的取值范围.

【考点】R5：绝对值不等式的解法.

【专题】17：选作题；59：不等式的解法及应用；5T：不等式.

【分析】①不等式等价于 $\begin{cases} x \leq 2 \\ 3-x+2-x \geq 3 \end{cases}$ ；或 $\begin{cases} 2 < x < 3 \\ 3-x+x-2 \geq 3 \end{cases}$ ，或 $\begin{cases} x \geq 3 \\ x-3+x-2 \geq 3 \end{cases}$ ，

求出每个不等式组的解集，再取并集即得所求.

②原命题等价于 $-2-x \leq a \leq 2-x$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立，由此求得求 a 的取值范围.

【解答】解：（1）当 $a = -3$ 时， $f(x) \geq 3$ 即 $|x-3| + |x-2| \geq 3$ ，即

$$\begin{cases} x \leq 2 \\ 3-x+2-x \geq 3 \end{cases}, \text{ 可得 } x \leq 1;$$

$$\begin{cases} 2 < x < 3 \\ 3-x+x-2 \geq 3 \end{cases}, \text{ 可得 } x \in \emptyset;$$

$$\begin{cases} x \geq 3 \\ x-3+x-2 \geq 3 \end{cases}, \text{ 可得 } x \geq 4.$$

取并集可得不等式的解集为 $\{x | x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 4\}$.

（2）原命题即 $f(x) \leq |x-4|$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立，等价于 $|x+a| + 2-x \leq 4-x$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立，

等价于 $|x+a| \leq 2$ ，等价于 $-2 \leq x+a \leq 2$ ， $-2-x \leq a \leq 2-x$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立.

故当 $1 \leq x \leq 2$ 时， $-2-x$ 的最大值为 $-2-1 = -3$ ， $2-x$ 的最小值为 0 ，

故 a 的取值范围为 $[-3, 0]$.

【点评】本题主要考查绝对值不等式的解法，关键是去掉绝对值，化为与之等价的不等式组来解，体现了分类讨论的数学思想，属于中档题.