

# 算法基础 HW6

PB18111697 王章瀚

2020 年 12 月 8 日

## 1

假定我们对一个数据结构执行一个由  $n$  个操作组成的操作序列, 当  $i$  严格为 2 的幂时, 第  $i$  个操作的代价为  $i$ , 否则代价为 1. 使用聚合分析确定每个操作的摊还代价.

可以考虑,  $n$  次执行需要代价为

$$\begin{aligned} n - \lfloor \log_2 n \rfloor - 1 + \sum_{k=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} 2^k &= n - \lfloor \log_2 n \rfloor - 1 + \frac{2^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \times (2^{\lfloor \log_2 n \rfloor} + 1)}{2} \\ &= n - \lfloor \log_2 n \rfloor - 1 + \frac{n \times (n + 1)}{2} \\ &= O(n^2) \end{aligned}$$

因此, 平均下来代价为:

$$O(n^2)/n = O(n)$$

## 2

用核算法重做第一题

则此时需要赋予费用, 可以这样赋予:

第 $i$ 个操作	实际代价	摊还代价
$i$ 不严格为 2 的幂	1	3
$i = 2^k$	$i$	2

其意为: 每次执行一个非严格为2的幂的操作时, 除了自己的代价 1 外, 需要额外付出一个代价. 这样后面每当操作严格为 2 的幂的操作时, 前面必然已经累积了相应的摊还代价.

具体而言, 假设第  $2^k$  个操作完成后, 信用余额为2(包含了该操作的摊还代价),

那么从第  $2^k + 1$  到第  $2^{k+1} - 1$  共有  $(2^{k+1} - 1) - (2^k + 1) + 1 = 2^k - 1$  个实际代价为1的操作

其总共需要支付  $2^{k+1} - 2$  的摊还代价, 加上第  $2^{k+1}$  个本身需要的2个代价单位, 总共就完成了对  $2^{k+1}$  个实际代价的支付

因此总有摊还代价为实际代价的上界.

这样一来, 总的代价就是  $O(3n) = O(n)$  的.

### 3

用势能法重做第一题

定义第  $i$  次操作后势能为  $\Phi(D_i) = i - \lfloor i/2 \rfloor$ , 那么必然有  $\Phi(D_n) \geq \Phi(D_0)$

此时若  $i$  不严格为 2 的幂, 则总代价为

$$\hat{c}_i = c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) \leq 1 + 1 = 2$$

此时若  $i$  严格为 2 的幂, 则总代价为

$$\hat{c}_i = c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) \leq i + (-i + 1) = 1$$

从而有

$$\sum_{i=0}^n c_i = \sum_{i=0}^n \hat{c}_i - \Phi(D_n) + \Phi(D_0) \leq \sum_{i=0}^n \hat{c}_i \leq 2n$$

因此, 摊还代价为  $O(n)$

### 4

我们将一维离散傅里叶变换推广到  $d$  维上. 这时输入是一个  $d$  维的数组  $A = (a_{j_1, j_2, \dots, j_d})$ , 维数分别为  $n_1, n_2, \dots, n_d$ , 其中  $n_1 n_2 \dots n_d = n$ , 定义  $d$  维离散傅里叶变换如下:

$$y_{k_1, k_2, \dots, k_d} = \sum_{j_1=0}^{n_1-1} \sum_{j_2=0}^{n_2-1} \dots \sum_{j_d=0}^{n_d-1} a_{j_1, j_2, \dots, j_d} \omega_{n_1}^{j_1 k_1} \omega_{n_2}^{j_2 k_2} \dots \omega_{n_d}^{j_d k_d}$$

其中  $0 \leq k_1 < n_1, 0 \leq k_2 < n_2, \dots, 0 \leq k_d < n_d$

**a**

证明: 我们可以依次在每个维度上计算一维的 DFT 来计算一个  $d$  维的 DFT. 也就是说, 首先沿着第 1 维  $n/n_1$  个独立的一维 DFT. 然后, 把沿着第 1 维的 DFT 结果作为输入, 我们计算沿着第 2 维的  $n/n_2$  个独立的一维 DFT. 利用这个结果作为输入, 我们计算沿着第 3 维的  $n/n_3$  个独立的一维 DFT. 如此下去直到第  $d$  维.

考虑恒等变换:

$$\begin{aligned} y_{k_1, k_2, \dots, k_d} &= \sum_{j_d=0}^{n_d-1} \sum_{j_{d-1}=0}^{n_{d-1}-1} \dots \sum_{j_1=0}^{n_1-1} a_{j_1, j_2, \dots, j_d} \omega_{n_d}^{j_d k_d} \omega_{n_{d-1}}^{j_{d-1} k_{d-1}} \dots \omega_{n_1}^{j_1 k_1} \\ &= \sum_{j_d=0}^{n_d-1} \sum_{j_{d-1}=0}^{n_{d-1}-1} \dots \sum_{j_2=0}^{n_2-1} \omega_{n_d}^{j_d k_d} \omega_{n_{d-1}}^{j_{d-1} k_{d-1}} \dots \omega_{n_2}^{j_2 k_2} \sum_{j_1=0}^{n_1-1} a_{j_1, j_2, \dots, j_d} \omega_{n_1}^{j_1 k_1} \\ &= \dots \\ &= \sum_{j_d=0}^{n_d-1} \omega_{n_d}^{j_d k_d} \sum_{j_{d-1}=0}^{n_{d-1}-1} \omega_{n_{d-1}}^{j_{d-1} k_{d-1}} \dots \sum_{j_2=0}^{n_2-1} \omega_{n_2}^{j_2 k_2} \sum_{j_1=0}^{n_1-1} a_{j_1, j_2, \dots, j_d} \omega_{n_1}^{j_1 k_1} \end{aligned}$$

因此按上式来看, 我们确实可以按照题述方法来依次计算各维而得到最终  $d$  维离散傅里叶变换的结果.

**b**

证明: 维度的次序并无影响. 于是可以通过在  $d$  个维度的任意顺序中计算一维 DFT 来计算一个  $d$  维的 DFT

按照原式, 由于求和号的上下界之间相互无依赖(如上题第一步), 因此可以互换顺序, 然后再按照第一题的拆解变换方法就能够得到不同顺序的计算方法, 因此维度的次序并无影响.

**c**

证明: 如果采用计算快速傅里叶变换计算每一个一维的 DFT, 那么计算一个  $d$  维的 DFT 的总时间是  $O(n \lg n)$ , 与  $d$  无关.

每一个维度都是

$$\Theta(n_i \log n_i)$$

故总的为

$$\Theta\left(\sum_{i=0}^d n_i \log n_i\right)$$

其中有

$$\sum_{i=1}^d n_i \log n_i \leq n \log n_i \leq n \log \prod_{i=1}^d = n \log n$$

因此总时间为  $O(n \log n)$ , 与  $d$  无关