

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

B. Mencapai Keseimbangan

Batas waktu: 1 detik

Batas memori: 256 MB

Pak Mada memiliki sebuah barisan yang terdiri dari N buah bilangan bulat, yaitu $A_1, A_2, \dots, A_N$. Sebuah barisan adalah **seimbang** jika barisan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian (sebut bagian kiri dan kanan) sedemikian rupa sehingga jumlah elemen di bagian kiri sama dengan jumlah elemen di bagian kanan. Dengan kata lain, terdapat suatu indeks pemisah k (dengan $1 \leq k < N$) sehingga:

$$\sum_{m=1}^k A_m = \sum_{m=k+1}^N A_m$$

Pak Mada ingin melakukan tepat satu kali operasi pemindahan. Operasi ini dilakukan dengan cara memilih satu posisi awal i ($1 \leq i \leq N$) dan satu posisi tujuan j ($1 \leq j \leq N$), lalu memindahkan elemen A_i ke posisi j dengan cara menghapus A_i dari barisan, kemudian menyisipkannya kembali sehingga berada pada posisi j di barisan yang baru.

Sebagai gambaran, misalkan barisan awalnya adalah $[A_1, A_2, A_3, A_4, A_5]$:

- Memilih $(i, j) = (2, 4)$ ($i < j$) menghasilkan barisan $[A_1, A_3, A_4, A_2, A_5]$.
- Memilih $(i, j) = (4, 2)$ ($i > j$) menghasilkan barisan $[A_1, A_4, A_2, A_3, A_5]$.
- Memilih $(i, j) = (3, 3)$ ($i = j$) tidak mengubah urutan barisan, yaitu $[A_1, A_2, A_3, A_4, A_5]$.

Bantulah Pak Mada menghitung banyaknya pasangan posisi (i, j) yang valid sehingga barisan yang dihasilkan setelah pemindahan menjadi seimbang!

Format Masukan

Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat N ($2 \leq N \leq 2 \times 10^5$) yang menyatakan banyaknya elemen dalam barisan.

Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($-10^9 \leq A_i \leq 10^9$) yang menyatakan elemen-elemen dari barisan tersebut.

Format Keluaran

Keluarkan satu baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya pasangan posisi (i, j) yang valid sedemikian rupa sehingga barisan yang dihasilkan setelah pemindahan merupakan barisan yang seimbang.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
4 1 -2 3 4	5
2 5 5	4

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

Penjelasan

Pada contoh pertama, terdapat 5 kemungkinan pasangan posisi (i, j) yang memenuhi syarat, yaitu:

- $(3, 1)$ menghasilkan barisan $[3, 1, -2, 4]$ dengan pemisah setelah indeks ke-1 ($3 = 1 + (-2) + 4$),
- $(3, 4)$ menghasilkan barisan $[1, -2, 4, 3]$ dengan pemisah setelah indeks ke-3 ($1 + (-2) + 4 = 3$),
- $(4, 1)$ menghasilkan barisan $[4, 1, -2, 3]$ dengan pemisah setelah indeks ke-3 ($4 + 1 + (-2) = 3$),
- $(4, 2)$ menghasilkan barisan $[1, 4, -2, 3]$ dengan pemisah setelah indeks ke-3 ($1 + 4 + (-2) = 3$), dan
- $(4, 3)$ menghasilkan barisan $[1, -2, 4, 3]$ dengan pemisah setelah indeks ke-3 ($1 + (-2) + 4 = 3$).

Pada contoh kedua, seluruh 4 kemungkinan pasangan posisi (i, j) , yaitu $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, dan $(2, 2)$, menghasilkan barisan $[5, 5]$ yang tetap seimbang.