HOJA DE EVALUACIÓN EVALUAR, CLASIFICAR Y TRATAR ATENCIÓN DEL NIÑO /NIÑA DE 2 MESES A 4 AÑOS DE EDAD

Fecha:	
No.Expediente_	

PURPLICATE AT SURGING DE PLUCIA DE A DELATIO DE LA CITATION DE LA	Nombre: ¿Qué problema tiene el niño/niña?	Edad:()() Sexo:() Peso:kg. Temp Consulta Primera Seguimiento	eratura	°C Talla:
Object to be production of the production o			Control	CLASIFICAR
- Clare L NINO/NINA DIABREA - Clare Clare L NINO/NINA DIABREA - Clare L NINO/NINA DIABREA - Clare L NINO/NINA DIABREA - Clare Clare L NINO/NI	¿No puede beber o tomar el pecho?¿Vomita todo lo que ingiere?	E	NFERMEDAD MUY	
- Clarent part of the property bases of the	_	Contar las respiraciones por minuto respiraciones por minuto. ¿Respiración rápida? Observar si hay tiraje subcostal. Escuchar si hay estridor.	• 1	MUY GRAVE Neumonía. No tiene neumonía.
## Office to got part official to got a hard ordinated and selection of the part of the pa	• ¿Cuanto tiempo hace?días	¿Determinar el estado general del niño/niña. ¿Está. — Letárgico o inconsciente?	• Ti	ene deshidratación.
Cities dout de clad? El Teine sourcino de clado? El Teine sourcino de clado. El Teine sourcino de clado. El Teine sourcino de consideration de consideration de consideration de clado. El Teine dout de garganita? El Teine dout de garganita? El Teine dout de garganita? El Teine sourcino de consideration de consideration de clado. Evudant bismo (pais en la garganita. Evudant bismo (pais en la garganita. El Teine sourcino de consideration consideration de consideration de consideration de consideration consideration de consideration de consideration consideration de consideration de consideration	, ,	 ¿Tiene los ojos hundudidos? Ofrezca líquidos. ¿el niño/niña No puede beber o bebe mal? Bebe ávidamente, con sed? Signos del pilegue cutáneo: La piel vuelve al estado anterior Muy lentamente (mas de 2 segundos). 	• D	GRAVE iarrea persistente.
- CTIENE EL NIÑO/NIÑA FIEBRE? (Determinat la praencia de: - Cadrajos dotroros y crecidos en el cuello En adobt blanco (plus) en la gargariña Procesde o ha estada en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Procesde o ha estada en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Procesde o ha estada en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina? - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina de riesgo de maleina. - Pedestada o en los últimos 5 días en zona de riesgo de maleina de ri	 ¿Tiene dolor de oido? ¿Tiene supuración del oido? En caso afirmativo ¿cuánto tiempo hace? 	Determine si hay: Supuración del oído	• 0	titis media. titis media crónica.
Procede of the actando en los ultimos 5 díase - zona de response de malatira? Observante días. Sise por mas da 7 días: Se por mas da 8 días: Se por mas da 7 días: Se por mas da 8 días: Se por mas	=	Determine la presencia de: Gânglios dolorosos y crecidos en el cuello. Exudado blanco (pus) en la garganta.	e: • F	streptococcica. aringoamigdalitis viral
Ober	 Procede o ha estado en los últimos 5 días en 	• M	MUY GRAVE alaria.	
DETERMINAR SI TIENE ANEMIA DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL (- Internación de l'entre publicar palmar: - L'alterior de l'entre paldez. DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL (- RECIMIENTO) DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL (- Emadación visible o Losantrición aguida ementos pies pies procesa de peso con tendencia inadecuada de longitud o talla. Pola de pecho glinición aguida ementos pies o Losantrición aguida ementos pies pies pies pies pies pies pies pie	días.	 Rigidez de nuca Petequias o equimosis Hemorragias gingivales. 		DENGUE
Cintensar Cint	¿Ha tenido fiebre todos los días?	Tos o coriza, conjuntivitis y linfadenopatías.	• S	ospechoso de sarampión. Itra enfermedad febril eruptiva.
DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL Y CRECIMIENTO DETERMINE EL ESTADO NUTRICIONAL - Emaciación visible ò - Edera me a mabos plas ò - Desnutricón aguda moderada por gráfica - Desnutricón aguda sovera por gráfica - Desnutricón aguda severa por gráfica - Ganancia excesiva de peso con tendencia inadecuada de longitud o talla Ganancia excesiva de peso con tendencia inadecuada de longitud o talla Ganancia excesiva de peso con tendencia inadecuada de longitud o talla Livised le da pecho al niño/a SI	DETERMINAR SI TIENE ANEMIA	- ¿intensa? - ¿Leve?		nemia leve.
EVALUAR LA ALIMENTACION SI TIENE CRECIMIENTO INADECUADO, ANEMIA O ES MENOR DE 2 AÑOS Menor de 6 meses 1. ¿Usted de a pecho al niño/a SI NO NO SI NO	DETERMINE EL ESTADO NUTRICIONAL - Emaciación visible ó - Edema en ambos pies ó - Desnutricón aguda moderada por gráfica - Desnutricón aguda severa por gráfica	INAL Y CRECIMIENTO INTERPRETACION DEL CRECIMIENTO - Tendencia de crecimiento adecuado - En proceso de adelgazamiento o emaciación Tendencia inadecuada de longitud o talla En proceso de adelgazamiento o emaciacióncon tendencia inadecuada de longitud o talla Ganancia excesiva de peso.	Dar Obe Baja Sob Nor Cre (en Cre Cre	io nutricional grave esidad a talla o baja talla sévera rer peso mal cimiento Inadecuado persistente dos controles sucesivos) cimiento inadecuado cimiento adecuado
Determinar una alteración por situación base. Ausencia de un logro que debería estar cumplido. VERIFICAR ANTECEDENTES DE VACUNACIÓN EDAD Nacimiento 2 Meses 4 Meses 6 Meses 12 Meses 18 Meses 1 a 4 años 4 años VACUNA BCG Sabin-1 Sabin-2 Sabin-3 S.R.P D.P.T. S.R. D.P.T. Hepatitis B Pentavalente-1 Pentavalente-2 Pentavalente-2 Pentavalente-3 Sarampión Rubéola Refuerzo En Campaña Refuerzo Vitamina Pediátrico Rotavirus -1 Rotavirus -2 Neumococo- 2 Neumococo- 3 y paperas Refuerzo "A" Determinar una alteración por situación base. Checar las dosis puestas y circular las que se deben poner hoy BCG Sabin-1 Sabin-3 S.R.P D.P.T. S.R. D.P.T. Refuerzo En Campaña Refuerzo Vitamina Sabin-3 Sarampión Rubéola Refuerzo "A" Refuerzo "A" Probable alteración del desarro No tiene alteración del desarro No tie	Menor de 6 meses 1. ¿Usted le da pecho al niño/a SI N' ¿Le da otros alimentos o líquidos? SI N' ¿Le da otros alimentos o líquidos? SI N' ¿S ile da pecho ¿Cuántas veces en 24 horas? 3. ¿Problemas de succión, agarre? SI NO 4. ¿Problemas de posición para el amamantamiento? Mayor de 6 meses 1. ¿Cuáles alimentos le da a su niño? 2. ¿Cuántas veces por día? veces 3. ¿Qué usa para darfe de comer? 4. ¿De qué tamaño son las proporciones que le da? 5. ¿Recibe el niño/a su propia ración? SI NC 6. ¿Quién le da de comer y cómo?	D	No l Bajc lact Da d Prol de e Prol Uso No : Des	actancia materna a frecuencia y poco tiempo de ancia materna otros alimentos olemas de frecuencia y cantidad alimentación olemas de calidad de alimentacion de biberón alimentación Activa gano
EDADNacimiento2 Meses4 Meses6 Meses12 Meses18 Meses1 a 4 años4 añosVACUNABCGSabin-1Sabin-2Sabin-3S.R.P.D.P.T.S.R.D.P.T.Hepatitis BPentavalente-1Pentavalente-2Pentavalente-2Pentavalente-3Sarampión RubéolaRefuerzoEn CampañaRefuerzoVitaminaPediátricoRotavirus -1Rotavirus -2Neumococo-1Neumococo-2Neumococo-3y paperasRefuerzo"A"	EVALUAR EL DESARROLLO Si las co	Determinar una alteración por situación base.	l l	able alteración del desarrollo.
	EDAD Nacimiento 2 Meses VACUNA BCG Sabin-1 Hepatitis B Pentavalente-1 Per Pediátrico Rotavirus -1 Rot	H Meses 6 Meses 12 Meses 18 Meses 1 a 4 años 4 años Sabin-2 Sabin-3 S.R.P D.P.T. S.R. D.P.T. tavalente-2 Pentavalente-3 Sarampión Rubéola Refuerzo En Campaña Refuerzo sabin Sabin	Vitamina	a próxima Vacuna:
Vitallina A Cada o nieses a partir de los seis nieses de edad.	*Pentavalente = DPT + Hep B + Hib	ımococo- 2 Neumococo- 3 y paperas Refuerzo 'Vitamina "A" cada 6 meses a partir de los seis meses de edad.	"A"	

	 Volver para una 	consulta o	de seguimiento	dentro de:
--	-------------------------------------	------------	----------------	------------

[•] Administrar todas las vacunas pendiente para hoy según el esquema de vacunación



