

# **Cálculo Diferencial e Integral II**

Resumo

**Rafael Rodrigues**

LEIC  
Instituto Superior Técnico  
2023/2024

# Contents

<b>1</b>	<b>Limites e Continuidade</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Diferenciabilidade</b>	<b>2</b>
2.1	Gradiente . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Derivada da Função Composta</b>	<b>2</b>
3.1	Matriz Jacobiana . . . . .	2
3.2	Cálculo da derivada . . . . .	2
3.3	Regra da Cadeia . . . . .	2
<b>4</b>	<b>Derivadas de Ordem Superior e Extremos</b>	<b>2</b>
4.1	Pontos de estacionaridade (ou críticos) . . . . .	2
4.2	Matriz Hessiana . . . . .	2
4.3	Teorema de Weierstrass . . . . .	3
<b>5</b>	<b>Função Inversa e Função Implícita</b>	<b>3</b>
5.1	Jacobiano . . . . .	3
<b>6</b>	<b>Extremos Condicionados</b>	<b>3</b>
6.1	Multiplicadores de Lagrange . . . . .	3
<b>7</b>	<b>Teorema de Fubini</b>	<b>3</b>
7.1	Aplicações do Integral . . . . .	3
7.1.1	Volume e Centróide . . . . .	3
7.1.2	Massa de Sólido e Centro de massa . . . . .	3
7.1.3	Momento de Inércia . . . . .	4
<b>8</b>	<b>Mudança de Variáveis de Integração</b>	<b>4</b>
8.1	Coordenadas Polares . . . . .	4
8.2	Coordenadas Cilíndricas . . . . .	4
8.3	Coordenadas Esféricas . . . . .	4
<b>9</b>	<b>Regra de Leibniz</b>	<b>4</b>
<b>10</b>	<b>Integrais de Linha</b>	<b>4</b>
10.1	Campos Escalares . . . . .	4
10.2	Campos Vetoriais . . . . .	4
<b>11</b>	<b>Campos Fechados. Campos Gradientes. Teorema Fundamental do Cálculo</b>	<b>4</b>
11.1	Teorema Fundamental do Cálculo para Integrais de Linha . . . . .	4
11.2	Campos Gradientes e Potenciais Escalares . . . . .	5
11.3	Campos Fechados e Campos Gradientes . . . . .	5
11.4	Condição Necessária e Suficiente para ser Gradiente . . . . .	5
<b>12</b>	<b>Homotopia e Teorema de Green</b>	<b>5</b>

# 1 Limites e Continuidade

TODO

# 2 Diferenciabilidade

TODO

## 2.1 Gradiente

$$\nabla f(x, y) = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

# 3 Derivada da Função Composta

## 3.1 Matriz Jacobiana

Para uma função  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ :

$$D_f(x_1, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

## 3.2 Cálculo da derivada

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \cdot Df(a)$$

## 3.3 Regra da Cadeia

# 4 Derivadas de Ordem Superior e Extremos

## 4.1 Pontos de estacionaridade (ou críticos)

$$\nabla f(x, y) = (0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

## 4.2 Matriz Hessiana

$$H_f(x, y) = \begin{vmatrix} a = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & b = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ c = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & d = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix} = ad - cb$$

Classificação dos pontos críticos:

- $H_f(x, y) < 0 \rightarrow$  ponto em sela (indefinida)
- $H_f(x, y) > 0 \rightarrow$  extremo
  - $a, d > 0 \rightarrow (x, y)$  é um ponto mínimo (definida positiva)
  - $a, d < 0 \rightarrow (x, y)$  é um ponto máximo (definida negativa)
- $H_f(x, y) > 0 \rightarrow$  inconclusivo
  - $a, d \geq 0 \rightarrow (x, y)$  é um ponto mínimo ou ponto de sela (semi-definida positiva)
  - $a, d \leq 0 \rightarrow (x, y)$  é um ponto máximo ou ponto de sela (semi-definida negativa)

### 4.3 Teorema de Weierstrass

TODO Semana 6

Uma função  $f$  num conjunto compacto  $S$  tem máximo e mínimo.

## 5 Função Inversa e Função Implícita

### 5.1 Jacobiano

$$J_f(x, y) = \begin{vmatrix} a = \frac{\partial f_1}{\partial x} & b = \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ c = \frac{\partial f_2}{\partial x} & d = \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{vmatrix} = ad - cb$$

TODO

## 6 Extremos Condicionados

### 6.1 Multiplicadores de Lagrange

TODO

$$\begin{cases} \nabla f = \sum_i^n \lambda_i \nabla F_i \\ F_1 = 0 \\ \vdots \\ F_n = 0 \end{cases}$$

## 7 Teorema de Fubini

### 7.1 Aplicações do Integral

#### 7.1.1 Volume e Centróide

O volume de um sólido é dado por:

$$V_S = \int_S 1$$

O seu **centróide** na coordenada  $x_i$  é dado por:

$$\overline{x_i} = \frac{1}{V_S} \cdot \int_S x_i$$

#### 7.1.2 Massa de Sólido e Centro de massa

Para um sólido  $S$  e uma **função de densidade de massa**  $f$ :

$$M_S = \int_S f$$

O **centro de massa** na coordenada  $x_i$  é dado por:

$$\overline{x_i} = \frac{1}{M_S} \cdot \int_S x_i f$$

### 7.1.3 Momento de Inércia

O momento de inércia em relação a um eixo  $L$  é dado por:

$$I_L = \int_S f \cdot (\text{distância à lateral})^2$$

Por exemplo para o eixo  $xx$  teríamos:

$$I_x = \int_S f \cdot (y^2 + z^2)$$

## 8 Mudança de Variáveis de Integração

### 8.1 Coordenadas Polares

$$\iint f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r \, dr \, d\theta$$

### 8.2 Coordenadas Cilíndricas

$$\iiint f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \cdot r \, dz \, dr \, d\theta$$

### 8.3 Coordenadas Esféricas

$$\iiint f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) \cdot r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

## 9 Regra de Leibniz

TODO Semana 11

## 10 Integrais de Linha

1. Parametrizar em função de  $t$ , ou seja, obter  $g(t)$
2. Obter a derivada de  $g$ , ou seja,  $g'(t) = \langle x'(t), y'(t) \rangle$
3. No caso do campo escalar, calcular  $\|g'(t)\| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}$

### 10.1 Campos Escalares

$$\int_C f \, ds = \int_a^b f(g(t)) \cdot \|g'(t)\| \, dt$$

### 10.2 Campos Vetoriais

$$W = \int_C F \, dg = \int_a^b F(g(t)) \cdot g'(t) \, dt$$

Trocar a orientação da curva troca o sinal do integral.

## 11 Campos Fechados. Campos Gradientes. Teorema Fundamental do Cálculo

### 11.1 Teorema Fundamental do Cálculo para Integrais de Linha

$$\int_C F \, dg = \int_C \nabla \varphi \, dg = \varphi(g(b)) - \varphi(g(a))$$

## 11.2 Campos Gradientes e Potenciais Escalares

Um campo vetorial diz-se gradiente se  $F = \nabla\varphi$ , neste caso a  $\varphi$  chama-se o **potencial escalar** de  $F$ .

$$\int_C \nabla\varphi \, dr = 0, \text{ se a curva é fechada}$$

Para encontrar um potencial escalar:

$$\nabla\varphi = F \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial\varphi}{\partial x_1} = F_1 \\ \vdots \\ \frac{\partial\varphi}{\partial x_n} = F_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi = \int F_1 \, dx_1 \\ \vdots \\ \varphi = \int F_n \, dx_n \end{cases}$$

## 11.3 Campos Fechados e Campos Gradientes

Um campo vetorial diz-se fechado se  $DF$  é simétrica:

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}, \forall i \neq j$$

Se um campo vetorial **é gradiente**, então **também é fechado**.

## 11.4 Condição Necessária e Suficiente para ser Gradiente

## 12 Homotopia e Teorema de Green

TODO Semana 13

$$\int_C P \, dx + Q \, dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \, dA$$