
Aprendizagem Automática

FICHA N. 4

ENUNCIADO

Nome: Rafael Alexandre Besteiro Dias

Número: A50773

ATENÇÃO: Fixa de respostas múltiplas. Só uma única resposta em cada alínea está correta. Cada alínea vale 2 valores. Respostas erradas descontam 0.5 valores.

1. No ficheiro `A50773_Q001_data.p`, encontra-se um conjunto de dados bidimensionais divididos em duas classes $\Omega = \{\varpi_0, \varpi_1\}$ (negativos e positivos). Há duas variáveis num dicionário: $\mathbf{X}$ é uma matriz de dados, e $\mathbf{y}$ é um array com as classes dos dados. Considere o seguinte modelo linear de classificação:
 $\hat{y} = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2$, com $\mathbf{x} \in \varpi_1$ para $\hat{y} \geq 0$, e para $\mathbf{w} = [w_0, w_1, w_2]^\top$ e $\mathbf{x} = [1, x_1, x_2]^\top$.
Considere ainda que o vetor $\mathbf{w}_{\text{MSE}}$ é o vetor de pesos que minimiza o erro quadrático médio deste conjunto: $\mathcal{E} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (y[n] - \hat{y}[n])^2$, onde N é o número total de pontos, e $n = 1, \dots, N$. As saídas desejadas são: $y[n] = -1$ para $\mathbf{x}[n] \in \varpi_0$ e $y[n] = +1$ para $\mathbf{x}[n] \in \varpi_1$.
 - (a) Considere o classificador com vetor de pesos, $\mathbf{w}_{\text{MSE}}$, que minimiza o erro quadrático médio do conjunto.
 - i. O erro absoluto médio é igual a 0.929.
 - ii. O número de acertos na classe ϖ_0 é de 485.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (b) Considere o classificador com o seguinte vetor de pesos $\mathbf{w} = [0.00, 0.96, -0.28]$.
 - i. A taxa de falsos alarmes é de 0.412.
 - ii. O número de acertos na classe ϖ_1 é de 1216.
 - iii. O número total de acertos é de 1549.
 - iv. O número de acertos na classe ϖ_0 é de 338.
2. Considere o conjunto “diabetes” disponível em `sklearn.datasets` (usar a função `load_diabetes()`). Pretende-se estimar e avaliar modelos de regressão polinomial com os dados deste conjunto: use as primeiras 259 amostras para treino e as restantes para teste.
 - (a)
 - i. O número de coeficientes, incluindo w_0 , numa regressão polinomial de ordem 2, é igual a 66.
 - ii. O número de coeficientes, incluindo w_0 , numa regressão polinomial de ordem 3, é igual a 293.
 - iii. Todas as respostas anteriores.

- iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (b) Considere o modelo de regressão polinomial de 2ª ordem que minimiza o erro quadrático médio no conjunto de treino.
 - i. No conjunto de teste, o erro absoluto médio é igual a 45.82.
 - ii. No conjunto de treino, o erro absoluto médio é igual a 65.81.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
3. No ficheiro `A50773_Q003_data.p` encontra-se disponível uma variável independente x e uma variável dependente y . Pretende-se estimar a variável y através de uma regressão polinomial da variável x , minimizando o erro quadrático médio.
- (a) Considere o conjunto de treino composto pelo “fold” 1, e o conjunto de teste composto pelo “fold” 0. Considere ainda que, através da minimização do erro quadrático médio do conjunto de treino, se estimou um modelo regressão polinomial de 4ª ordem: $\hat{y} = w_0 + w_1x + w_2x^2 + w_3x^3 + w_4x^4$.
 - i. Arredondando a zero casas decimais, o valor de w_0 é 10.
 - ii. No conjunto de treino, o coeficiente de determinação, R^2 , é igual a 0.96.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (b) Considere o conjunto de treino composto pelo “fold” 0, e o conjunto de teste composto pelo “fold” 1. Considere ainda que, através da minimização do erro quadrático médio do conjunto de treino, se estimou um modelo regressão polinomial de 3ª ordem: $\hat{y} = w_0 + w_1x + w_2x^2 + w_3x^3$.
 - i. No conjunto de teste, o erro absoluto médio é igual a 0.54.
 - ii. No conjunto de treino, o coeficiente de determinação, R^2 , é igual a 0.59.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.