

推论 6.1 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 则

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1).$$

证明 根据定理 6.2, $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$, $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$, 且相互独立。因此,

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma}{\sqrt{(n-1)S^2/((n-1)\sigma^2)}} \sim t(n-1).$$

推论 6.2 设 X_1, X_2, \dots, X_{n_1} 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本, Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2} 为来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本, 且两样本相互独立。记 \bar{X} 和 \bar{Y} 分别为它们的样本均值, 样本方差分别为

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_2^2 = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2.$$

则

$$F = \frac{S_1^2 \sigma_2^2}{S_2^2 \sigma_1^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

证明 根据定理 6.2 及 F 分布的定义直接得到。

推论 6.3 设 X_1, X_2, \dots, X_{n_1} 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的一个样本, Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2} 为来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的一个样本, 且两样本相互独立。则

$$T = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

证明 由定理 6.2, 有

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) \sigma^2),$$

$$[(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2]/\sigma^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2),$$

且两者相互独立, 再由 t 分布的定义得到结论。

习 题 六

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知, σ^2 已知, X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的一个样本。

问: $X_1 - \mu, \bar{X}, \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \min_{1 \leq i \leq n} X_i$ 中哪些是统计量, 哪些不是统计量?

2. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 $U[0, 1]$ 的样本, 求样本均值 \bar{X} 的期望与方差。

3. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自均值为 μ , 方差为 σ^2 的总体的样本, 证明:

$$(1) S^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right];$$

$$(2) E(S^2) = \sigma^2.$$

4. 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 证明: $E(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n$.

5. 设 X_1, X_2, \dots, X_{10} 是来自正态总体 $N(0, 5)$ 的样本, 试求 $P\left(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 80\right)$.

6. 设 $p_n(x)$ 为自由度为 n 的 t 分布的密度函数, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

7. 设 X_1, X_2, \dots, X_{15} 是来自正态总体 $N(0, 4)$ 的样本, 求 $Y = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 的分布。

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{2n} (n \geq 2)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i, Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$, 求 $E(Y)$ 。

9. 设 X_1, X_2, \dots, X_{n+1} 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 求 $\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 的分布。

10. 设 X_1, X_2, \dots, X_5 是来自正态总体 $N(12, 4)$ 的样本, 试求:

(1) \bar{X} 大于 13 的概率;

(2) $\min_{1 \leq i \leq 5} X_i$ 小于 10 的概率;

(3) $\max_{1 \leq i \leq 5} X_i$ 大于 15 的概率。

11. 设从同一个总体中抽得两组样本, 容量分别为 n_1 与 n_2 , 样本均值, 样本方差分别记为 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 。现将两组样本合并在一起, 试将联合样本的均值和方差用 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 表示出来。

12. 设 X_1, X_2, \dots, X_{n_1} 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2} 是来自正态总体 $N(\mu_2,$

$\sigma^2)$ 的样本, 试求 $\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2}$ 的期望和方差。

于是 $\bar{X} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$ 。利用枢轴变量法可以求出 p 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}\right)。$$

这里的 p 未知, 于是我们用 $\hat{p} = \bar{X}$ 代入上式, 最后得到 p 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间近似为

$$\left(\bar{X} - u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}, \bar{X} + u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}\right)。 \quad (7.19)$$

事实上, 注意到

$$S^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \bar{X}(1-\bar{X}),$$

只需将公式 (7.18) 中的 S 用 S^* 代替就可以得到公式 (7.19)。

习 题 七

1. 设总体 $X \sim B(n, p)$, 其中 n 为已知常数, p 为未知参数。 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的一个样本。试求 p 的矩估计和极大似然估计。

2. 设总体 X 的密度函数为

$$p(x; \alpha) = \begin{cases} (\alpha + 1)x^\alpha & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

其中 $\alpha > -1$ 为未知参数。 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的一个样本。试求参数 α 的矩估计和极大似然估计。

3. 设总体 X 服从对数正态分布, 其密度函数为

$$p(x; \mu, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} x^{-1} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln x - \mu)^2\right\}, \quad x > 0$$

X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的一个样本。试求参数 μ, σ^2 的矩估计和极大似然估计。

4. 设总体 X 的密度函数为

$$p(x; \mu, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta} & x \geq \mu \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

其中 $\theta > 0, \mu, \theta$ 为未知参数。 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的一个样本。试求参数 μ, θ 的矩估计和极大似然估计。

5. 设总体为 $\left[\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}\right]$ 上的均匀分布, X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的一个样本。试求参数 θ 的矩估计和极大似然估计。

6. 设总体为 $[\theta, 2\theta]$ 上的均匀分布, X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的一个样本。试求参数 θ 的矩估计和极大似然估计。

7. 设总体 X 的分布律为

$$X \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & \theta^2 & 1-2\theta \end{bmatrix}$$

其中 $0 < \theta < \frac{1}{2}$ 为未知参数。现有 8 个样本观察值为 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3。试求参数 θ 的矩估计和极大似然估计。

8. 设总体 $X \sim P(\lambda)$, 其中 λ 为未知参数。 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的一个样本。试求 $P(X=0)$ 的极大似然估计。

9. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 其中 μ 为未知参数。 X_1, X_2 是来自总体 X 的一组样本。试验证下列两个估计量:

$$(1) \hat{\mu}_1 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2; \quad (2) \hat{\mu}_2 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$$

均为 μ 的无偏估计, 并比较它们的均方误差。

10. 设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 均为 θ 的无偏估计, 且相互独立。 $D(\hat{\theta}_1) = \sigma_1^2, D(\hat{\theta}_2) = \sigma_2^2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 为已知参数。试求常数 c , 使得 $\hat{\theta} = c\hat{\theta}_1 + (1-c)\hat{\theta}_2$ 的方差达到最小。

11. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本。试选择适当常数 c , 使得 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计。

12. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 μ 已知。试求 σ^2 的极大似然估计, 并与样本方差 S^2 比较它们的均方误差。

13. 对于方差 σ^2 已知的正态总体, 问需抽取容量 n 为多大的样本, 才能使总体均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间的长度不大于 L ?

14. 设某种油漆的 9 个样本, 其干燥时间 (单位: 时) 为

6.0, 5.7, 5.8, 6.5, 7.0, 6.3, 5.6, 6.1, 5.0

假定干燥时间服从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 未知。求 μ 的置信度为 95% 的置信区间。

15. 测量钢筋的直径 X , 得到一组数据 (单位: 厘米) 如下:

5.35, 5.41, 5.32, 5.33, 5.44, 5.36, 5.37, 5.38

设 X 服从正态分布, 求 σ 的置信度为 90% 的置信区间。

16. 甲、乙两组生产同种导线, 现从甲组中随机抽取 4 根, 从乙组中随机抽取 5 根, 它们的电阻 (单位: 欧姆) 分别为

甲组: 0.143, 0.142, 0.143, 0.137

乙组: 0.140, 0.142, 0.136, 0.138, 0.140

假设两组电阻值均服从正态分布, 且方差相同。求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 95% 的置信区间。

17. 设机器 A 和机器 B 生产钢管, 随机抽取机器 A 生产的钢管 18 根, 测得钢管内径的样本方差为 $S_A^2 = 0.34(\text{mm}^2)$ 。抽取机器 B 生产的钢管 13 根, 测得钢管内径的样本方差为 $S_B^2 = 0.29(\text{mm}^2)$ 。假设总体均为正态分布, 求方差比 $\frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}$ 的置信度为 90% 的置信区间。

18. 某市随机抽取 1000 个家庭, 调查知道其中有 228 家拥有彩色电视机。试求该市拥有彩色电视机家庭比例 p 的置信度为 95% 的置信区间。

19. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 $X \sim P(\lambda)$ 的一个样本, 试求 λ 的置信度为 $1-\alpha$ 的近似置信区间。

将其代入 χ^2 检验统计量

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(n_{ij} - n\hat{p}_{i\cdot}\hat{p}_{\cdot j})^2}{n\hat{p}_{i\cdot}\hat{p}_{\cdot j}} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(n_{ij} - n_{i\cdot}n_{\cdot j}/n)^2}{n_{i\cdot}n_{\cdot j}/n}.$$

当原假设成立时, 它的渐进分布为自由度 $rs - (r + s - 2) - 1 = (r - 1)(s - 1)$ 的 χ^2 分布。于是, 在给定显著性水平 α 下, 检验的拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2((r - 1)(s - 1))\}$ 。

例 8.16 我们调查了 520 人研究患高血压与冠心病的关系。数据如下表所示。

表 8-6

	患高血压	无高血压	总计
患冠心病	48	36	84
无冠心病	88	348	436
总计	136	384	520

试问: 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 高血压与冠心病有无关系。

解 因为 $n_{11} = 48, n_{12} = 36, n_{21} = 88, n_{22} = 348$, 又 $n_{1\cdot} = 84, n_{2\cdot} = 436, n_{\cdot 1} = 136, n_{\cdot 2} = 384$ 。于是 χ^2 检验统计量为

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(48 - 84 \times 136/520)^2}{84 \times 136/520} + \frac{(36 - 84 \times 384/520)^2}{84 \times 384/520} \\ &\quad + \frac{(88 - 436 \times 136/520)^2}{436 \times 136/520} + \frac{(348 - 436 \times 384/520)^2}{436 \times 384/520} = 49.8. \end{aligned}$$

查分布表得 $\chi_{0.05}^2(1) = 3.84 < \chi^2 = 49.8$ 。因此, 拒绝原假设, 即认为患高血压与冠心病有关。

习 题 八

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 为未知常数。试问下面的假设哪些是简单假设, 哪些是复合假设:

(1) $H_0: \mu = 0, \sigma = 1$;

(2) $H_0: \mu = 0, \sigma > 1$;

(3) $H_0: \mu < 0, \sigma = 1$;

(4) $H_0: 0 < \mu < 3$ 。

2. 某公司的桶装油的标准质量为 10 公斤。现随机抽取 10 桶, 称得重量为 10.2, 9.7, 10.1, 10.3, 10.1, 9.8, 9.9, 10.4, 10.3, 9.8(公斤)。假定每桶油的重量服从正态分布。试问: 在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 该公司的桶装油重量是否为 10 公斤。

3. 某批矿砂的 5 个样本的锂含量为 (%): 3.25, 3.27, 3.24, 3.26, 3.24。假定总体服从正态分布, 试问在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 能否认为这批矿砂的锂含量的均值为 3.25%。

4. 某厂生产的钢索的断裂强度服从正态分布 $N(\mu, 40^2)$ 。现从这批钢索中抽取 9 根测得其断裂强度的平均值 \bar{x} , 较正常生产的均值 μ 大 20(公斤/厘米²)。试问: 在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 能否认为这批钢索的质量有所提高?

5. 两台车床生产同一类产品。假定产品的某种性能分别服从正态分布 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i=1, 2$ 。且已知 $\sigma_1^2 = 8, \sigma_2^2 = 6$, 两个样本值分别为 (26, 25, 23, 26, 25, 29, 21), (30, 26, 32, 28, 28, 30, 29)。试问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 两台车床生产的产品质量有无显著差异?

6. 比较 A, B 两种小麦品种的蛋白质含量。随机抽取 A 种小麦 10 个样本, 测得 $\bar{X} = 14.3, S_1^2 = 1.62$ 。随机抽取 B 种小麦 5 个样本, 测得 $\bar{Y} = 11.7, S_2^2 = 0.14$ 。假定这两种小麦蛋白质含量均服从正态分布, 且方差相同。试问: 在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 两种小麦的蛋白质含量有无差异?

7. 设 X_1, X_2, \dots, X_{n_1} 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的一个样本, Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2} 为来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的一个样本, 且两样本相互独立, 参数均未知。试构造假设 $H_0: \mu_1 = C\mu_2$ 的双边检验, 其中 C 为非零已知常数。显著性水平为 α 。

8. 设甲、乙两个试验员, 对同样的试验进行分析, 各人的分析数据结果如下:

试验号数	1	2	3	4	5	6	7	8
甲	4.3	3.2	3.8	3.5	3.5	4.8	3.3	3.9
乙	3.7	4.1	3.8	3.8	4.6	3.9	2.8	4.4

试问: 甲乙两人的试验分析有无显著差异 ($\alpha = 0.05$)?

9. 某厂生产的瓶装矿泉水要求标准差 $\sigma = 0.02$ 。随机抽取 20 瓶矿泉水, 发现其样本标准差 $S = 0.03$ 。假定瓶装矿泉水重量服从正态分布。试问: 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 能否认为它们达到了标准差 $\sigma = 0.02$ 的要求?

10. 两台机床加工同一种零件, 测得直径为

机床甲: 20.5 19.8 19.7 20.4 20.1 20.0 19.0 19.9

机床乙: 19.7 20.8 20.5 19.8 19.4 20.6 19.2

假定产品直径均服从正态分布。试问甲乙两台机床加工的精度有无显著差异 ($\alpha = 0.05$)?

11. 在豌豆实验中, 观测到黄色和绿色豆子的数目分别为 70 和 27, 试问: 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验黄色和绿色豆子的数目为 3:1 是否正确。

12. 在孟德尔豌豆试验中, 同时考虑豌豆的颜色与形状, 共有四种组合: (黄, 圆), (黄, 非圆), (绿, 圆), (绿, 非圆)。按照孟德尔理论这四类比例为 9:3:3:1。在一次观察中, 发现这四类观测到的数目分别为 315, 101, 108, 32。试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验孟德尔的理论是否正确。

13. 为检验一个骰子的均匀性, 投掷 60 次, 观测到出现 1, 2, 3, 4, 5, 6 点的次数为 13, 19, 11, 8, 5, 4。试检验这个骰子是均匀的 ($\alpha = 0.05$)。

14. 某修理厂希望知道每天送来修理的汽车数是否服从泊松分布。下表给出了该厂 250 天的送修车数:

送修车数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
天数	2	8	21	31	44	48	39	22	17	13	5

试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验原假设 H_0 : 每天送来修理的车数服从泊松分布。

15. 对某汽车零件制造厂生产的汽缸螺栓口径抽样 100 次, 数据如下:

口径区间	实际频数	口径区间	实际频数
10.93~10.95	5	11.01~11.03	17
10.95~10.97	8	11.03~11.05	6
10.97~10.99	20	11.05~11.07	6
10.99~11.01	34	11.07~11.09	4

试检验螺栓口径是否服从正态分布 ($\alpha = 0.05$)?

16. 调查某市郊区桑场采桑员和辅助人员桑毛虫皮炎发病情况, 数据如下:

	采桑	不采桑	总计
患病	18	12	30
不患病	4	78	82
总计	22	90	112

试问发生皮炎病是否与工种有关 ($\alpha = 0.05$)?

17. 某工厂三种配方商场的产品质量如下表:

	配方 1	配方 2	配方 3	总计
合格品	63	47	65	175
不合格品	16	7	3	26
总计	79	54	68	201

试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验原假设 H_0 : 三种配方生产的产品质量无显著差异?