

# Report15

## 1 Question

设体系的能量为  $H(x, y) = -2(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}(x^4 + y^4) + \frac{1}{2}(x - y)^4$ , 取  $\beta = 0.2, 1, 5$ , 采用 Metropolis 抽样法计算  $\langle x^2 \rangle, \langle y^2 \rangle, \langle x^2 + y^2 \rangle$ 。抽样时在 2 维平面上依次标出 Markov 链点分布, 从而形象地理解 Markov 链

## 2 Analysis

### 2.1 概率密度分布

根据玻尔兹曼分布可知, 体系的概率分布函数正比于

$$F(x, y) = \exp\left(-\frac{H}{kT}\right) = \exp\{-\beta \times [-2(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}(x^4 + y^4) + \frac{1}{2}(x - y)^4]\} \quad (1)$$

其中  $\beta = \frac{1}{kT}$ 。

对  $F(x, y)$  求偏导, 求出其极值点, 得到以下几组解

$$\{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0\}, \{x \rightarrow -\sqrt{2}, y \rightarrow -\sqrt{2}\}, \left\{x \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{3}, y \rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{3}\right\}, \left\{x \rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{3}, y \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{3}\right\}, \{x \rightarrow \sqrt{2}, y \rightarrow \sqrt{2}\}$$

从解的结果来看, 与  $\beta$  的取值无关, 在固定的点处取到极值, 为了使得结果更加形象, 不妨取  $\beta = 1$ , 得到




图1:  $F(x, y)$  图像

### 2.2 建议分布 $T(x', y')$

如图1所示的图像, 可以明显的看到  $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$  和  $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$  处有两组极大峰值, 故选择下列正态分布作为建议分布来抽样, 其中

$$G_1(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2 + (y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$
$$G_2(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x + \mu)^2 + (y + \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

上式中取  $\mu = \sqrt{2}, \sigma = \frac{1}{2\sqrt{\beta}}$

$\mu$  是固定在极大值处的, 而  $\sigma$  与  $\beta$  相关的。这是由于随着  $\beta$  增大, 极值点不改变, 而待抽样的分布会逐渐收敛到极值点附近, 相应图1中极值点附近的弥散度下降, 峰变得尖锐, 这可以在后续报告中的图3, 图5, 图7中可以看出, 故随着  $\beta$  增大, 标准差  $\sigma$  要逐渐减小

设建议分布  $T$  为

$$T(x \rightarrow x', y \rightarrow y') = T(x', y') = \frac{1}{2}(G_1(x', y') + G_2(x', y'))$$

则建议分布的图像如下所示




图2:  $T(x, y)$  图像

## 2.3 抽样算法

那么根据 **Metropolis-Hasting 抽样方法** 可以得到以下算法:

设初始点为  $(x_0, y_0) = (0, 0)$

1. 设  $M$  为 Markov 链集合  $\{(x_k, y_k)\}$ , 取最后一个点为  $(x_n, y_n)$
2. 在二维正态分布  $T(x', y')$  下抽样得到试探点  $(x', y')$
3. 根据 Metropolis-Hasting 方法, 令

$$r_1 = \frac{p_j T_{ji}}{p_i T_{ij}} = \frac{F(x', y') T(x_n, y_n)}{F(x_n, y_n) T(x', y')}$$

4. 在  $[0, 1]$  均匀分布中抽样出随机点  $\xi$ , 若  $\xi < \min(1, r)$ , 取  $(x_{n+1}, y_{n+1}) = (x', y')$ ; 若  $\xi > \min(1, r)$ , 取  $(x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_n, y_n)$
5. 将  $x_{n+1}$  加入到  $M$  集合, 循环到步骤1, 直到集合总数大于  $N$

当得到有  $N$  个点的 Markov 链集合后, 将序列中热化过程的前  $M$  个构型舍去, 那么对应的平均值如下所示

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \frac{1}{N-M} \sum_{i=M+1}^N x_i^2 \\ \langle y^2 \rangle &= \frac{1}{N-M} \sum_{i=M+1}^N y_i^2 \\ \langle x^2 + y^2 \rangle &= \frac{1}{N-M} \sum_{i=M+1}^N x_i^2 + y_i^2 \end{aligned}$$

## 2.4 Markov Chain 形象化展示算法

为了绘制出 Markov Chain 的轨迹, 上述建议分布  $T(x, y)$  会在两个高斯分布间来回跳转, 规避了粒子落入势阱中, 无法逃离的情况, 但是, 无法展示出 Markov Chain 形象的过程, 故在热化过程中, 采取了另一种采样的方式, 算法如下:

设初始点为  $(x_0, y_0) = (5, 5)$

1. 设  $B$  为 Markov 链热化点集合  $\{(x_k, y_k)\}$ , 取最后一个点为  $(x_n, y_n)$
2. 随机向前试探一步:

$$(x_t, y_t) = (x_n + \xi_x * s, y_n + \xi_y * s)$$

其中  $\xi_x, \xi_y$  是[-1,1]上均匀分布分布的随机数,  $s=0.1$ 为固定步长

3. 根据Metropolis抽样规则, 设 能量改变为  $\Delta H$ , 选择概率为  $r_1$

$$\Delta H = H(x_t, y_t) - H(x_n, y_n)$$
$$r_1 = \exp(-\beta \Delta H)$$

4. 在[0,1]均匀分布中抽样出随机点 $\xi$ , 若  $\xi < \min(1, r)$ , 取  $(x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_t, y_t)$ ; 若  $\xi > \min(1, r)$ , 取  $(x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_n, y_n)$

5. 将  $x_{n+1}$ 加入到  $B$ 集合, 循环到步骤1, 直到集合总数大于  $M$

## 3 Experiment

### 3.1 $\beta = 0.2$

此时对应的是高温下的情况。

数值计算可得以下结果

$$\langle x^2 \rangle = 1.556912649927367, \quad \langle y^2 \rangle = 1.559989388948787,$$
$$\langle x^2 + y^2 \rangle = 3.116902038876154$$

理论值计算是:  $\langle x^2 \rangle = 1.56189$ ,  $\langle y^2 \rangle = 1.56189$ , 结果比较准确

由图 3 可见, 分布的极大值处于原点附近, 但是原点和离原点较远的地方分布都比较小, 抽样结果来看, 基本与原分布吻合




图3: 高温分布与抽样图像比较

根据2.4 其热化得到的 Markov Chain如图4所示, 粒子较为均匀在两个势阱间穿梭




图4: 高温热化时的Markov Chain

### 3.2 $\beta = 1$

此时对应的是中等温度下的情况。当 $\beta$ 较大时马尔科夫链开始向分布极值靠近。

数值计算可得以下结果

$$\begin{aligned}\langle x^2 \rangle &= 1.6822846190170353, & \langle y^2 \rangle &= 1.679052276012874, \\ \langle x^2 + y^2 \rangle &= 3.36133689502991\end{aligned}$$

理论计算值是： $\langle x^2 \rangle = 1.68247$ ， $\langle y^2 \rangle = 1.68247$ ，结果比较准确

对应的图像对比与Markov Chain如图5, 6所示




图5：中等温度分布与抽样图像比较




图6：中等温度热化时的Markov Chain

### 3.3 $\beta = 5$

此时对应的是低温的情况。

数值计算可得以下结果

$$\begin{aligned}\langle x^2 \rangle &= 1.9464660730764258, & \langle y^2 \rangle &= 1.950173563246566, \\ \langle x^2 + y^2 \rangle &= 3.896639636322991\end{aligned}$$

理论计算值是： $\langle x^2 \rangle = 1.94783$ ， $\langle y^2 \rangle = 1.94783$ ，结果比较准确

对应的分布与抽样图像对比如图7所示




图7：低温分布与抽样图像比较

为比较2.3与2.4提出的算法，取在  $\beta = 5$  时比较更为形象，因为此时在极值点处是势阱很深，如图7所示，粒子基本只在极值点附近，而极少的有“隧穿”过程，比较结果如下所示




图8：低温热化与抽样时的Markov Chain 对比

当采取2.4中的算法，如图8左所示，在从 (5, 5) 出发的点，当靠近极值点后，基本活动范围只在第一象限内的势阱中，几乎不可能到另一边的势阱，这与图4展现的  $\beta$  较小（高温）时热化的Markov Chain很不一样。

而抽样采取 2.3 中提出的两个高斯分布作为建议抽样分布，可以规避这类情况的发生，如图8右所示，粒子在两个势阱间来回穿梭，不会只局限在一个势阱中，可以遍历全局，抽样出完整的分布。

## 4 Summary

- 利用 Metropolis 方法对玻尔兹曼分布积分。当温度较高的时候马尔科夫链会同时 往远离原点和靠近原点的方向扩散，但是由于离原点较远的点对  $x^2$  贡献远大于靠近原点的点，所以积分值会偏高，随着温度降低，马尔科夫链将收拢与分布极值点，使得积分收敛于一个稳定值。
- 比较了两种 Metropolis 抽样方法，对于普通的Metropolis 方法，粒子在遇到较大势阱时，很容易在一个势阱中无法逃脱。根据Metropolis-Hasting 方法，应当采取与待抽样分布近似的建议分布，使得让粒子有机会挣脱势阱束缚，在全局进行遍历，这样才能采样出完整的分布。
- 在待抽样的Boltzmann分布的参数  $\beta$  在变化时，相应的建议分布  $T(x, y)$ 也要随之改变，在实验中发现，在调整标准差  $\sigma = \frac{1}{2\sqrt{\beta}}$  时，建议分布于待抽样分布比较接近，抽样的结果较好。