

Practical 13

Euler's Method

Euler's Method with subinterval length h as input:-

Q. Using Euler's Method, find approximate solution to the initial value problem

$x'(t) = -2tx^2$, $0 \leq t \leq 1$, $x(0) = 1$ with

(a) $h = 0.2$

(b) $h = 0.1$.

Solution:-

```
EulerMethod[a0_, b0_, h0_, f_, alpha_] :=
Module[{a = a0, b = b0, h = h0, n, ti},
  n = (b - a) / h;
  ti = Table[a + (j - 1) h, {j, 1, n + 1}];
  wi = Table[0, {n + 1}];
  wi[[1]] = alpha;
  OutputDetails = {{0, ti[[1]], alpha}};
  For[i = 1, i ≤ n, i++,
    wi[[i + 1]] = wi[[i]] + h * f[ti[[i]], wi[[i]]];
    OutputDetails = Append[OutputDetails,
      {i, N[ti[[i + 1]]], N[wi[[i + 1]]]}];];
  Print[NumberForm[TableForm[OutputDetails,
    TableHeadings → {None, {"i", "ti", "wi"}}, 6]];
  Print["Subinterval size h used = ", h];
];
f[t_, x_] := -2 t x^2;
h = 0.2;
EulerMethod[0, 1, h, f, 1];
```

i	t _i	w _i
0	0	1
1	0.2	1.
2	0.4	0.92
3	0.6	0.784576
4	0.8	0.636842
5	1.	0.50706

Subinterval size h used = 0.2

h = 0.1;

```
EulerMethod[0, 1, h, f, 1];
```

i	t_i	w_i
0	0	1
1	0.1	1.
2	0.2	0.98
3	0.3	0.941584
4	0.4	0.888389
5	0.5	0.82525
6	0.6	0.757147
7	0.7	0.688354
8	0.8	0.622018
9	0.9	0.560113
10	1.	0.503642

Subinterval size h used = 0.1
