

Inhalt [Lineare Unabhängigkeit](#), [Basis eines Vektorraumes](#), [Dimension eines Vektorraumes](#), [Anwendung auf lineare Gleichungssysteme](#)

Sei V ein Vektorraum über einem Körper K .

1 Lineare Unabhängigkeit

Definition Endlich viele $v_1, \dots, v_m \in V$ ($m \in \mathbb{N}$) heißen *linear unabhängig*, falls für alle $a_1, \dots, a_m \in K$ gilt: Aus $\sum_{i=1}^m a_i v_i = 0$ folgt $a_1 = \dots = a_m = 0$.

Eine Teilmenge M von V heißt *linear unabhängig*, falls M leer ist oder je endlich viele verschiedene Vektoren aus M linear unabhängig sind.

$v_1, \dots, v_m \in V$ heißen *linear abhängig*, wenn $v_1, \dots, v_m \in V$ nicht linear unabhängig sind, d. h. es gibt $a_1, \dots, a_m \in K$, die nicht alle gleich Null sind, mit $\sum_{i=1}^m a_i v_i = 0$.

Lemma 1 $v_1, \dots, v_m \in V$ sind genau dann linear abhängig, wenn ein $i \in \{1, \dots, m\}$ existiert mit $v_i \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_m)$.

Beweis: „ \Rightarrow “: Sind v_1, \dots, v_m linear abhängig, so existieren $a_1, \dots, a_m \in K$ und ein i mit $a_i \neq 0$ und $\sum_{j=1}^m a_j v_j = 0$. Dann ist $v_i = -a_i^{-1} \sum_{j \neq i} a_j v_j \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_m)$.

„ \Leftarrow “: Aus $v_i = \sum_{j \neq i} a_j v_j$ folgt $\sum_{j \neq i} a_j v_j + (-1)v_i = 0$, also sind v_1, \dots, v_m linear abhängig.

2 Basis eines Vektorraumes

Definition Eine Teilmenge B von V heißt *Basis* von V , falls B linear unabhängig und ein Erzeugendensystem von V ist (also B linear unabhängig und $V = \text{Lin}(B)$).

Für paarweise verschiedene $v_1, \dots, v_n \in V$ gilt: $\{v_1, \dots, v_n\}$ ist genau dann eine Basis von V , wenn jedes $v \in V$ *eindeutig* als Linearkombination der v_1, \dots, v_n darstellbar ist.

Z. B. bilden die Einheitsvektoren $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ eine Basis des K^n .

Lemma 2 Sei E ein Erzeugendensystem von V und B eine linear unabhängige Teilmenge von V mit $B \subset E$. Jede Menge B' mit $B \subsetneq B' \subset E$ sei linear abhängig. Dann ist B eine Basis von V .

Beweis: Zu zeigen ist $V = \text{Lin}(B)$. Wegen $V = \text{Lin}(E)$ genügt es, $E \subset \text{Lin}(B)$ zu zeigen. Sei $v \in E$. Für $v \in B$ ist $v \in \text{Lin}(B)$ trivial. Sei also $v \notin B$. Nach Voraussetzung ist dann $B' := B \cup \{v\}$ linear abhängig, also gibt es $v_1, \dots, v_m \in B$ und $a_1, \dots, a_m, a \in K$, die nicht alle Null sind, mit $\sum_{i=1}^m a_i v_i + av = 0$. Dann ist $a \neq 0$ (sonst wären $v_1, \dots, v_m \in B$ linear abhängig). Also ist $v = -a^{-1} \sum_{i=1}^m a_i v_i \in \text{Lin}(B)$.

Satz 1 (Basissatz) V sei endlich erzeugt. Dann gilt:

- a) Sind $M \subset V$ linear unabhängig und E ein Erzeugendensystem von V mit $M \subset E$, so existiert eine Basis B von V mit $M \subset B \subset E$.
Insbesondere (für $M = \emptyset$, $E = V$) folgt: V besitzt eine Basis.
- b) Jede Basis von V ist endlich.
- c) Je zwei beliebige Basen von V haben gleichviele Elemente.

Der Beweis des Basissatzes beruht auf folgenden technischen Sätzen:

Satz 2 (Austauschsatz) Seien E ein Erzeugendensystem von V und M eine endliche linear unabhängige Teilmenge von V . Dann gibt es eine Teilmenge E' von E mit:
 $M \cup E'$ ist ein Erzeugendensystem von V , $M \cap E' = \emptyset$, $|M| = |E \setminus E'|$ und $|M \cup E'| = |E|$.
(Das Erzeugendensystem E wird durch $M \cup E'$ ersetzt; dabei wird $E \setminus E'$ gegen M „ausgetauscht“.)

Korollar 1 Sei E ein endliches Erzeugendensystem von V . Dann hat jede linear unabhängige Teilmenge M von V höchstens $|E|$ Elemente.

Beweis: Es genügt, $|N| \leq |E|$ für jede endliche linear unabhängige Teilmenge N von V zu zeigen. Nach dem Austauschsatz (Satz 2) gibt es ein $E' \subset E$ mit $|N| = |E \setminus E'| \leq |E|$.

Beweis des Basissatzes (Satz 1) mit Hilfe von Korollar 1:

- a) V werde von p Elementen erzeugt. Nach Korollar 1 hat dann jede linear unabhängige Teilmenge von V höchstens p Elemente. Sei B mit $M \subset B \subset E$ eine linear unabhängige Teilmenge mit maximaler Elementezahl. Dann ist jedes B' mit $B \subsetneq B' \subset E$ linear abhängig. Nach Lemma 2 ist B dann eine Basis von V .
- b) Jede Basis von V ist linear unabhängig, hat also (nach Korollar 1) höchstens p Elemente.
- c) Seien B, B' Basen von V mit n bzw. n' Elementen. Dann wird V von n Elementen erzeugt. Nach Korollar 1 folgt $n' \leq n$. Analog folgt $n \leq n'$, also $n = n'$.

3 Die Dimension eines Vektorraumes

Definition Sei V endlich erzeugt. Nach dem Basissatz (Satz 1) besitzt V eine Basis, und die Anzahl der Elemente einer Basis hängt nicht von der gewählten Basis ab. Diese Anzahl heißt die *Dimension* von V , geschrieben $\dim V$.

Ist V nicht endlich erzeugt, so setzt man $\dim V := \infty$.

Beispiele a) $\dim K^n = n$.

b) Es sei

$$U := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \right\}.$$

U ist ein Untervektorraum von \mathbb{R}^3 . Es gilt

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in U \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ -x_1 + 2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ -x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \\ 2x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Die Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in U$ erzeugen damit U und sind offensichtlich linear unabhängig, bilden also eine Basis von U , daher ist $\dim U = 2$.

Satz 3 Sei V endlich-dimensional mit $n = \dim V$. Dann gilt:

- a) Ist B linear unabhängig mit genau n Elementen, so ist B eine Basis von V .
- b) Ist B ein Erzeugendensystem mit genau n Elementen, so ist B eine Basis von V .

Satz 4 Sei V endlich-dimensional und U ein Untervektorraum von V . Dann gilt:

- a) U ist endlich-dimensional mit $\dim U \leq \dim V$.
- b) $\dim U = \dim V$ genau dann, wenn $U = V$.

Beweis: a) Sei $n := \dim V$. Nach Korollar 1 sind je $n + 1$ Vektoren in V linear abhängig, insbesondere sind je $n + 1$ Vektoren in U linear abhängig. Sei

$$m := \min\{k \mid \text{Je } k + 1 \text{ Vektoren in } U \text{ sind linear abhängig}\}.$$

Dann ist $m \leq n$, und es existieren m linear unabhängige Vektoren in U (sonst läge $m - 1$ in $\{k \mid \text{Je } k + 1 \text{ Vektoren in } U \text{ sind linear abhängig}\}$). Sei $B = \{u_1, \dots, u_m\} \subset U$ linear unabhängig. Nach Definition von m ist jede Menge B' mit $B \subsetneq B' \subset U$ linear abhängig. Nach Lemma 2 ist B dann eine Basis von U , also gilt $\dim U = m \leq n = \dim V$.

b) Zu zeigen ist: Aus $\dim U = \dim V$ folgt $U = V$. Sei also $\dim U = \dim V$. Sei B eine Basis von U . Da B linear unabhängig ist, ist (nach a) des Basissatzes (Satz 1)) B in einer Basis B' von V enthalten. Da B, B' wegen $\dim U = \dim V$ gleichviele Elemente haben, ist $B = B'$, also ist B eine Basis von V , also $U = V$.

4 Anwendung auf lineare Gleichungssysteme

Sei V ein endlich-dimensionaler K -Vektorraum.

Definition Für $M \subset V$ heißt $\text{rang } M := \dim \text{Lin}(M)$ der *Rang* von M .

Satz 5 (Rangkriterium für lineare Gleichungssysteme)

Sei $G \sum_{j=1}^n x_j v_j = w$ ein lineares Gleichungssystem mit m Gleichungen in n Unbekannten über K (also $v_1, \dots, v_n, w \in K^m$). Dann sind äquivalent:

- (i) G ist lösbar.
- (ii) $w \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$.
- (iii) $\text{rang}\{v_1, \dots, v_n, w\} = \text{rang}\{v_1, \dots, v_n\}$.

Beweis: G ist lösbar \iff Es gibt $x_1, \dots, x_n \in K$ mit $w = \sum_{j=1}^n x_j v_j \iff w \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$.

Damit ist (i) äquivalent zu (ii).

(ii) \Rightarrow (iii): Ist $w \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$, so ist $\text{Lin}(v_1, \dots, v_n, w) = \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$, also $\text{rang}\{v_1, \dots, v_n, w\} = \text{rang}\{v_1, \dots, v_n\}$.

(iii) \Rightarrow (ii): Aus $\text{rang}\{v_1, \dots, v_n, w\} = \text{rang}\{v_1, \dots, v_n\}$ folgt nach Aussage b) von Satz 4 $\text{Lin}(v_1, \dots, v_n, w) = \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$, insbesondere $w \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$.

Korollar 2 Für das obige Gleichungssystem sind äquivalent:

- (i) G ist universell lösbar, d. h. G ist für jedes $w \in K^m$ lösbar.
- (ii) $\text{rang}\{v_1, \dots, v_n\} = m$.

Beweis: (i) besagt: $K^m = \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$. Nach Aussage b) von Satz 4 ist dies äquivalent zu $m = \dim K^m = \dim \text{Lin}(v_1, \dots, v_n) = \text{rang}\{v_1, \dots, v_n\}$.