

Inhalt Vektorräume, lineare Gleichungssysteme, die lineare Hülle einer Menge von Vektoren, Durchschnitt und Summe von Untervektorräumen

1 Vektorräume

Definition Sei K ein Körper. Ein K -Vektorraum ist eine Menge V mit zwei Operationen $+: V \times V \rightarrow V$, $(v, w) \mapsto v + w$ (Addition) und $\cdot: K \times V \rightarrow V$, $(a, v) \mapsto av$ (skalare Multiplikation), so dass gilt:

V1 $(u + v) + w = u + (v + w)$ und $v + w = w + v$ für alle $u, v, w \in V$.

V2 Es gibt ein $o \in V$ mit $v + o = v$ für alle $v \in V$, zu jedem $v \in V$ existiert ein $v' \in V$ mit $v + v' = o$.

V3 *Distributivgesetze*: $(a + b)v = av + bv$, $a(v + w) = av + aw$ für alle $a, b \in K$, $v, w \in V$.

V4 $(ab)v = a(bv)$ für alle $a, b \in K$, $v \in V$.

V5 $1v = v$ für alle $v \in V$.

Bemerkung Das Element o ist durch V2 (und die Kommutativität der Addition) eindeutig bestimmt, es heißt *Nullvektor* von V und wird auch mit 0_V oder 0 bezeichnet.

Beweis: Erfüllt o' ebenfalls V2, so gilt $o' = o' + o = o + o' = o$.

Für jedes $v \in V$ ist v' mit $v + v' = 0$ eindeutig bestimmt; v' heißt das *Negative* von v und wird mit $-v$ bezeichnet.

Beispiele Sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$. Dann ist $K^n := \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mid a_i \in K \right\}$ mit den komponentenweise definierten Verknüpfungen

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}, \quad a \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} aa_1 \\ \vdots \\ aa_n \end{pmatrix}$$

ein K -Vektorraum; der Nullvektor von K^n ist die Spalte mit lauter Nullen.

Speziell für $n = 1$ folgt: K ist ein Vektorraum über sich selbst.

Definition Sei V ein K -Vektorraum. $U \subset V$ heißt *Untervektorraum* von V , falls gilt:

U1 $U \neq \emptyset$.

U2 Für alle $u, u' \in U$ ist $u + u' \in U$.

U3 Für alle $a \in K$, $u \in U$ ist $au \in U$.

In diesem Fall ist U mit den eingeschränkten Verknüpfungen selbst ein K -Vektorraum; es ist $0_V \in U$ (denn $0_V = 0_K u \in U$ mit einem $u \in U$) und $-u = (-1)u \in U$ für alle $u \in U$.

2 Lineare Gleichungssysteme

Sei $G \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$ ($1 \leq i \leq m$) ein *lineares Gleichungssystem* über K (d.h. $a_{ij}, b_i \in K$) mit m Gleichungen in n Unbekannten x_1, \dots, x_n .

$$L(G) := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n \mid \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \text{ für } 1 \leq i \leq m \right\}$$

heißt *Lösungsmenge* von G .

G heißt *homogen*, falls alle $b_i = 0$ sind, andernfalls *inhomogen*.

Das lineare Gleichungssystem $G^0 \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = 0$ ($1 \leq i \leq m$) heißt *Homogenisierung* von G .

Satz Ist $G \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = 0$ ($1 \leq i \leq m$) ein homogenes lineares Gleichungssystem über K , so ist $L(G)$ ein Untervektorraum von K^n , der Lösungsraum von G .

Beweis: Der Nullvektor liegt in $L(G)$, also ist $L(G)$ nicht leer. Für $a \in K$ und $x, y \in L(G)$ mit den Komponenten x_1, \dots, x_n bzw. y_1, \dots, y_n sind $x + y, ax \in L(G)$ wegen

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}(x_j + y_j) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + \sum_{j=1}^n a_{ij}y_j = 0 + 0 = 0 \quad \text{und} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}(ax_j) = a \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = a \cdot 0 = 0.$$

Also ist $L(G)$ ein Untervektorraum von K^n .

Satz Ist $v \in K^n$ eine spezielle Lösung von $G \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$ ($1 \leq i \leq m$), so ist

$$L(G) = \{v + x \mid x \in L(G^0)\}.$$

Beweis: v habe die Komponenten a_1, \dots, a_n , wegen $v \in L(G)$ gilt $\sum_{j=1}^n a_{ij}a_j = b_i$, $1 \leq i \leq m$. „ \supset “: Liegt x mit den Komponenten x_1, \dots, x_n in $L(G^0)$, so gilt

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}(a_j + x_j) = \sum_{j=1}^n a_{ij}a_j + \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i + 0 = b_i \quad \text{für } 1 \leq i \leq m.$$

Also ist $v + x \in L(G)$.

„ \subset “: Gehört y mit den Komponenten y_1, \dots, y_n zu $L(G)$, so liegt $x := y - v$ in $L(G^0)$ wegen $\sum_{j=1}^n a_{ij}(y_j - a_j) = \sum_{j=1}^n a_{ij}y_j - \sum_{j=1}^n a_{ij}a_j = b_i - b_i = 0$ für $1 \leq i \leq m$, also $y = v + x$, $x \in L(G^0)$.

Korollar G besitze eine Lösung v . Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) G hat genau eine Lösung.
- (ii) G^0 hat nur den Nullvektor als Lösung.

Beweis: (i) \Rightarrow (ii): Ist $x \in L(G^0)$, so ist $v + x \in L(G)$, also $v + x = v$ nach (i), also $x = 0$.

(ii) \Rightarrow (i): Aus $L(G^0) = \{0\}$ folgt $L(G) = \{v + x \mid x \in L(G^0)\} = \{v + 0\} = \{v\}$.

3 Die lineare Hülle einer Menge von Vektoren

Sei V ein Vektorraum über einem Körper K .

Definition Für eine Teilmenge $M \neq \emptyset$ von V definiert man

$$\text{Lin}(M) := \left\{ \sum_{i=1}^m a_i v_i \mid m \in \mathbb{N}, a_i \in K, v_i \in M \text{ für } i = 1, \dots, m \right\}.$$

(Ein Vektor der Form $\sum_{i=1}^m a_i v_i$ mit $a_i \in K$ heißt *Linearkombination* der v_1, \dots, v_m .) Für endliches $M = \{v_1, \dots, v_m\}$ schreibt man $\text{Lin}(v_1, \dots, v_m) := \text{Lin}(\{v_1, \dots, v_m\})$. Für $M = \emptyset$ sei $\text{Lin}(\emptyset) := \{0_V\}$. Dann ist $\text{Lin}(M)$ ein Untervektorraum von V , der M enthält.

Beweis: $\text{Lin}(\emptyset) = \{0\}$ ist sicher ein Untervektorraum von V . Sei nun $M \neq \emptyset$. Für jedes $v \in M$ ist $v = 1v \in \text{Lin}(M)$, also $\emptyset \neq M \subset \text{Lin}(M)$. $\text{Lin}(M)$ ist abgeschlossen unter der Addition (denn die Summe von zwei Linearkombinationen von Vektoren aus M ist wieder eine solche), und für $a \in K$, $\sum_{i=1}^m a_i v_i \in \text{Lin}(M)$, $v_i \in M$ ist $a \sum_{i=1}^m a_i v_i = \sum_{i=1}^m (aa_i) v_i \in \text{Lin}(M)$.


$\text{Lin}(M)$ heißt der von M erzeugte Untervektorraum oder die lineare Hülle von M in V .

Proposition $\text{Lin}(M)$ ist der kleinste Untervektorraum von V , der M enthält.

Beweis: 1. $\text{Lin}(M)$ ist ein Untervektorraum von V , der M enthält.

2. Ist U ein Untervektorraum von V mit $M \subset U$, so enthält U auch alle Vektoren der Form $\sum_{i=1}^m a_i v_i$ mit $v_i \in M$, $a_i \in K$, also gilt $\text{Lin}(M) \subset U$.

Beispiele a) Für einen einzelnen Vektor $v \in V$ ist $\text{Lin}(v) = \{av \mid a \in K\} =: Kv$.



b) Für $v_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 := \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ ist $\text{Lin}(v_1, v_2) = \mathbb{R}^2$, denn für jeden Vektor $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (2x_2 - x_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (x_1 - x_2) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Lin}(v_1, v_2).$$

c) Für $v_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ gilt $\text{Lin}(v_1, v_2) = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 2a_1 - a_2 - a_3 = 0 \right\}$.

Beweis: Die rechte Seite U ist als Lösungsraum der homogenen Gleichung $2a_1 - a_2 - a_3 = 0$ ein Untervektorraum von \mathbb{R}^3 , und es gilt $v_1, v_2 \in U$. Nach der Proposition ist also $\text{Lin}(v_1, v_2) \subset U$. Andererseits gilt

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \in U \Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ 2a_1 - a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ 2a_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ a_2 \\ -a_2 \end{pmatrix} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \text{Lin}(v_1, v_2).$$

Damit ist $U \subset \text{Lin}(v_1, v_2)$, also insgesamt $\text{Lin}(v_1, v_2) = U$.

Definition Ein Erzeugendensystem von V ist eine Teilmenge E von V mit $\text{Lin}(E) = V$, d. h. jedes $v \in V$ ist Linearkombination von Vektoren aus E . Man sagt auch: E erzeugt V . V heißt endlich erzeugt, falls V ein endliches Erzeugendensystem besitzt.

Beispiele a) K^n wird von den Einheitsvektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ erzeugt.

b) Im obigen Beispiel c) wird U von v_1, v_2 erzeugt.

4 Durchschnitt und Summe von Untervektorräumen

Proposition Seien U, U' Untervektorräume eines Vektorraumes V . Dann gilt:

a) $U \cap U' := \{v \mid v \in U \text{ und } v \in U'\}$ ist wieder ein Untervektorraum von V .

b) $U + U' := \{u + u' \mid u \in U, u' \in U'\}$ ist wieder ein Untervektorraum von V .

c) Folgende Aussagen sind äquivalent:

(i) Jedes Element von $U + U'$ ist eindeutig in der Form $u + u'$ mit $u \in U$, $u' \in U'$ darstellbar.

(ii) $U \cap U' = \{0\}$.

Sind die Bedingungen (i), (ii) erfüllt, so heißt $U + U'$ direkte Summe von U, U' .