



Alcools



• formule brute :



• classe des alcools :



alcool secondaire II



alcool tertiaire III

1C → méthane

2C → éthane

3C → propane

4C → butane

5C → pentane

6C → hexane

7C → heptane

8C → octane

• Carbone fonctionnel : c'est le carbone

lié au groupement hydroxyle OH.

• alcools isomères : sont des alcools qui ont la même formule brute et des formules semi développées différentes.

• isomère de chaîne :


même position de OH + chaînes $\neq$

• isomère de position :

même chaîne carbonée + positions de OH $\neq$

• oxydation ménagée : aux cours de laquelle la chaîne carbonée ne se détruit pas.

• alcool primaire :




aldéhyde

acide
carboxylique

• jaunît la DNPH
• Rosit avec
le réactif
de Schiff









• rougit
au papier
pH

alcool secondaire :



- jaunit le DNPH
- ne positif pas le réactif de Schiff

alcool tertiaire : ne s'oxyde pas




$$\%C = \frac{12m \times 100}{M}$$

$$\%O = \frac{16n \times 100}{M}$$

$$\%H = \frac{(12m+2) \times 100}{M}$$

* Esterification:

acide + alcool $\rightleftharpoons$ ester + eau



caractéristiques:

- lente
- limitée
- athermique

* pour accélérer cette réaction on utilise un catalyseur et on chauffe le mélange.

* Combustion complète:

