

Maturitní otázka číslo 16: Polohové a metrické úlohy ve stereometrii

Základní pojmy

- **Kolineární body** jsou body ležící v jedné přímce
- **Příčka mimoběžek** je úsečka, jejíž krajní body leží na daných mimoběžkách, **Osa mimoběžek** je jediná příčka, která je k oběma mimoběžkám kolmá, její délka je zároveň nejkratší vzdáleností
- **Svazek rovin** je množina všech rovin, které procházejí jednou společnou přímkou (osou svazku)
- **Trs rovin** je množina všech rovin, které procházejí jedním společným bodem (středem trsu)

Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin

Přímky p, q

- **Rovnoběžné** ($p \parallel q$): mohou být buď různé (žádný společný bod, kolienární vektory), nebo totožné (nekonečně společných bodů)
- **Různoběžné**: právě jeden společný bod, leží v jedné rovině
- **Mimoběžné**: Žádný společný bod, neleží v jedné rovině a směrové vektory nejsou kolineární

Přímka p a rovina ρ

- **Leží v rovině** ($p \in \rho$): Každý bod přímky je bodem roviny
- **Rovnoběžná** ($p \parallel \rho$): žádný společný bod

- **Různoběžná:** právě jeden společný bod. Speciálním případem je kolmost $p \perp \rho$.

Dvě roviny ρ, σ

- **Rovnoběžné:** buď různé (žádný společný bod), nebo totožné (nekonečně mnoho společných bodů)
- **Různoběžné:** Společné body tvoří přímku (průsečnici)


Kritéria rovnoběžnosti

- **Rovnoběžnost přímky a roviny:** Přímka p je rovnoběžná s rovinou ρ právě tehdy, když je rovnoběžná s alespoň jednou přímkou q , která v rovině ρ leží.
- **Rovnoběžnost dvou rovin:** Rovina ρ je rovnoběžná s rovinou σ , pokud ρ obsahuje dvě různé různoběžky a, b , které jsou obě rovnoběžné s σ

Průsečík s rovinou a průsečnice dvou rovin

Při hledání průsečnice dvou rovin hledáme dva společné body těchto rovin, pokud je nemáme přímo, používáme metodu pomocných rovin (rozvést, dodělat)

U průsečíku přímky s rovinou (například v tělese) přímku proložíme pomocnou rovinou, najdeme průsečnici této pomocné roviny s cílovou rovinou a tam, kde průsečnice protne původní přímku, leží hledaný bod. Ukážeme si to na příkladu: Najděte průsečíky přímky PQ s krychlí.



V příkladu je červeně naznačená pomocná rovina a řešením bude bod, kde se protíná úsečka PQ a úsečka EG a druhým průsečíkem s krychlí bude průsečík AC a PQ . To jsou body, kde přímka PQ "vchází" a "vychází" z krychle.

Řezy těles


Pravidla pro řezy:

- Leží-li dva body v jedné stěně, spojíme je úsečkou
- Jsou-li dvě stěny rovnoběžné, jsou řezy v nich (průsečnice) rovnoběžné.
- Trsy rovin: Vezmeme tři roviny: Rovinu řezu ρ , rovinu přední stěny α a rovinu boční stěny β (rovina řezu nesmí být rovnoběžná s rovinami krychle).

Víme o nich, že roviny stěn α a β se protínají v jedné přímce (hrana krychle, označme ji p) a že rovina řezu ρ protíná stěnu α v nějaké přímce (čára řezu, označme ji h).

Pokud protáhneme čáru řezu h a hranu krychle p , tak se někde protnou, protože leží v jedné rovině a nejsou rovnoběžné. Vezmeme tedy bod X , který leží na čáře řezu h , patří tedy do roviny řezu ρ , bod X zároveň leží na přímce hrany h , tudíž patří i do roviny boční stěny β , mohou tedy propojit bod X s dalším bodem patřícím do řezu v rovině β .

Příklad: narýsujte rovinu řezu procházející body PQF



Nejdříve jsem propojil body F, Q , protože leží na stejné straně. Poté už je nutné použít trsy rovin. Rovina BFC a ABC mají společnou průsečnici BC a v rovině BFC leží i čára hledaného řezu. Proto se po prodloužení těchto úseček musí protnout ve společném bodě těchto tří rovin. Bod X tedy leží ve stejné rovině jako bod P a mohou je spojit pro získání další čáry řezu.