

Fundação Getulio Vargas  
Escola de Matemática Aplicada  
Curso de Graduação em Matemática  
Aplicada

Utilização de indicadores ambientais e  
epidemiológicos no estudo da dinâmica de  
doenças transmitidas por vetores

por Raphael Felberg Levy

Rio de Janeiro - Brasil  
2023

Fundação Getulio Vargas  
Escola de Matemática Aplicada  
Curso de Graduação em Matemática  
Aplicada

Utilização de indicadores ambientais e  
epidemiológicos no estudo da dinâmica de  
doenças transmitidas por vetores

“Declaro ser o único autor do presente projeto de monografia que refere-se ao plano de trabalho a ser executado para continuidade da monografia e ressalto que não recorri a qualquer forma de colaboração ou auxílio de terceiros para realizá-lo a não ser nos casos e para os fins autorizados pelo professor orientador.”

---

Raphael Felberg Levy

Rio de Janeiro - Brasil  
2023

Fundação Getúlio Vargas  
Escola de Matemática Aplicada  
Curso de Graduação em Matemática  
Aplicada

Utilização de indicadores ambientais e  
epidemiológicos no estudo da dinâmica de  
doenças transmitidas por vetores

“Projeto de Monografia apresentado à Escola de Matemática  
Aplicada como requisito parcial para continuidade ao trabalho de  
monografia.”

Aprovado em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Grau atribuído ao Projeto de Monografia: \_\_\_\_

---

Professor Orientador: Flávio Codeço Coelho

**Escola de Matemática Aplicada**  
**Fundação Getúlio Vargas**

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Objetivo Final</b>	<b>7</b>
2.1	xx . . . . .	7
2.1.1	yy . . . . .	7
2.2	xx . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Metodologia</b>	<b>9</b>
3.1	Modelo SIR . . . . .	9
3.2	Modelo SEI . . . . .	11
3.2.1	yy . . . . .	13
3.3	xx . . . . .	13
<b>4</b>	<b>Resultados Esperados</b>	<b>14</b>
4.1	xx . . . . .	14
<b>5</b>	<b>Referências</b>	<b>15</b>

# 1 Introdução

A Amazônia é uma das maiores e mais biodiversas florestas tropicais do mundo, abrigando inúmeras espécies de plantas, animais e microrganismos, incluindo vetores e patógenos responsáveis pela transmissão de diversas doenças. Entre elas, algumas das mais comuns, e que serão estudadas nesse trabalho, são a malária, leishmaniose e doença de Chagas. Essas doenças são causadas por protozoários, respectivamente, do gênero *Plasmodium*, sendo transmitida pela picada da fêmea infectada do mosquito do gênero *Anopheles*; do gênero *Leishmania*, transmitida por insetos hematófagos conhecidos como flebótomos, podendo ser cutânea ou visceral; ou do gênero *Trypanosoma cruzi*, transmitida por insetos do gênero *Triatoma*, também conhecido como “barbeiro”, sendo as três doenças não-contagiosas, ou seja, podendo ser apenas transmitidas do vetor para o humano.

Notavelmente, a transmissão de doenças por vetores é intimamente relacionada à alterações ambientais que interferem no ecossistema dos organismos transmissores e dos organismos afetados. No caso da Amazônia, essas modificações no meio podem ser representadas pelo desmatamento, queimadas, mineração e expansão da agricultura e pecuária, entre outras. Essas atividades resultam em perda de habitat, fragmentação de ecossistemas e alterações no clima, afetando a distribuição e abundância de vetores e hospedeiros, bem como a interação entre eles e os patógenos. Além disso, o crescimento populacional e a urbanização também têm um papel importante na disseminação de doenças, uma vez que aumentam a exposição dos seres humanos aos vetores e aos riscos de infecção.

Diante desse contexto, este trabalho visa investigar a transmissão de doenças por vetores na Amazônia e analisar como os impactos ambientais influenciam a dinâmica de transmissão, abordando os vetores e patógenos apresentados anteriormente, os fatores ecológicos e socioeconômicos que afetam a disseminação das doenças e possíveis estratégias de prevenção e controle.

O trabalho tem como objetivo principal ser um estudo sobre a evolução de epidemias de malária, leishmaniose e Chagas, tendo como referência principal o Projeto Trajetórias-Sinbiose, elaborado pela FIOCRUZ, um dataset incluindo indicadores ambientais, epidemiológicos, econômicos e socioeconômicos para todos os municípios da Amazônia Legal, analisando a relação

espacial e temporal entre trajetórias econômicas ligadas à dinâmica dos sistemas agrários, sendo eles rurais de base familiar ou produção agrícola e de gado em larga escala, a disponibilidade de recursos naturais e o risco de doenças.

Ao longo deste trabalho, serão abordados os seguintes tópicos: (1) uma revisão das principais doenças transmitidas por vetores na Amazônia e seus vetores e patógenos associados; (2) análise dos fatores ecológicos, climáticos e socioeconômicos que influenciam a transmissão de doenças; (3) discussão sobre os modelos epidemiológicos, incluindo adaptações aos modelos SIR e SEI, para avaliar o impacto das mudanças ambientais na transmissão de doenças; e (4) identificação de estratégias de prevenção e controle baseadas na compreensão da dinâmica de transmissão e nos desafios específicos da região amazônica.

## 2 Objetivo Final

Estudar a evolução de doenças transmitidas por vetores através de um modelo matemático levando em consideração fatores influentes na transmissão, como desmatamento, queimadas, chuva, temperatura variante etc.

### 2.1 xx

referencial teórico... <sup>1</sup>.

#### 2.1.1 yy

---

<sup>1</sup>Ver xx



## 2.2 xx

xx

### 3 Metodologia

Para a elaboração do trabalho, serão usados dados do dataset do Projeto Trajetórias, e serão abordados métodos de transmissão de doenças baseados em equações diferenciais ordinárias, SIR e SEI, para hospedeiros e vetores, respectivamente, e, partindo de uma modelagem simples de cada doença, serão incluídos os fenômenos ambientais, como desmatamento e queimada, para ver como modificações no ecossistema irão interferir no modelo elaborado previamente.

#### 3.1 Modelo SIR

Desenvolvido por W. O. Kermack e A. G. McKendrick em 1927, o SIR é um dos modelos mais usados para a modelagem de epidemias, levando em consideração três compartimentos:

$S$  : número de indivíduos suscetíveis

$I$  : número de indivíduos infectados

$R$  : número de indivíduos recuperados

Nesse modelo, os indivíduos saudáveis na classe  $S$  são suscetíveis ao contato com indivíduos da classe  $I$ , e são transferidos para esse compartimento caso contraiam a doença. Indivíduos infectados podem espalhar a doença por contato direto com indivíduos suscetíveis, mas também podem se tornar imunes ao longo do tempo, sendo transferidos para o compartimento  $R$ . Em geral,  $R$  inclui o total de recuperados (imunes) e mortos em decorrência da doença, mas podemos assumir que o número de mortos é muito baixo em relação ao tamanho da população total, podendo ser ignorado. Consideramos também que indivíduos nessa categoria não voltarão a ser suscetíveis ou infecciosos.

Considerando uma epidemia em um espaço curto de tempo e que a doença não é fatal, podemos ignorar dinâmicas vitais de nascimento e morte. Com isso, podemos descrever o modelo SIR através do seguinte sistema de EDOs:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\frac{\beta SI}{N} \\ \frac{dI}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

No modelo,  $N(t) = S(t) + I(t) + R(t)$ , ou seja, a população total no tempo  $t$ , enquanto que  $\beta$  é a taxa de infecção e  $\gamma$  é a taxa de recuperação. Dado que  $S + I + R$  é sempre constante se ignorarmos nascimento e morte, temos  $\frac{dS}{dt} + \frac{dI}{dt} + \frac{dR}{dt} = 0$ .

Para que a doença possa se espalhar, é fácil ver que  $\frac{dI}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \gamma I > 0$ . Assim,  $\frac{\beta SI}{N} > \gamma I \Rightarrow \frac{\beta S}{N} > \gamma$ . Supondo que estamos no início da infecção, dado que queremos ver como se espalha,  $I$  será muito pequeno e  $S \approx N$ . Concluimos então que  $\frac{\beta N}{N} > \gamma \Rightarrow \frac{\beta}{\gamma} > 1$ . É possível derivar esse valor adimensionalizando o modelo: sejam  $y^* = \frac{S}{N}$ ,  $x^* = \frac{I}{N}$ ,  $z^* = \frac{R}{N}$  e  $t^* = \frac{t}{1/\gamma} = \gamma t$ , de forma que  $y^* + x^* + z^* = 1$ . Substituindo o sistema de EDOs acima utilizando esses valores:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = \frac{d(y^*N)}{d(t^*/\gamma)} = -\frac{\beta SI}{N} = -\frac{\beta(y^*N)(x^*N)}{N} = -\beta y^*N x^* \\ \frac{dI}{dt} = \frac{d(x^*N)}{d(t^*/\gamma)} = \frac{\beta SI}{N} - \gamma I = \frac{\beta(y^*N)(x^*N)}{N} - \gamma(x^*N) = \beta y^*N x^* - \gamma x^*N \\ \frac{dR}{dt} = \frac{d(z^*N)}{d(t^*/\gamma)} = \gamma I = \gamma(x^*N) \end{cases}$$

Agora, cancelando os fatores  $N$  e  $\gamma$  em ambos os lados das equações:

$$\begin{cases} \frac{d(y^*)}{d(t^*)} = -\frac{\beta y^* x^*}{\gamma} \\ \frac{d(x^*)}{d(t^*)} = \frac{\beta y^* x^*}{\gamma} - x^* \\ \frac{d(z^*)}{d(t^*)} = x^* \end{cases}$$

Sendo assim temos um sistema dado apenas por  $y^*$  e  $x^*$  e o parâmetro  $\frac{\beta}{\gamma}$ , que podemos chamar de  $R_0$ .

## 3.2 Modelo SEI

Figura 1: tabela.

Figura 2: tabela.

### 3.2.1 yy

yy

$$f_i(x) = (10x + 100), \quad (1) \tag{1}$$

$$f_{ii}(x) = (20x + 200), \quad (2) \tag{2}$$

$$f_{iii}(x) = (30x + 300), \quad (3) \tag{3}$$

xx

$$Vm_i(p,l) = ((-1.9141)p + 49.466)l + ((199.51)p - 10795.0), l=0 \tag{4}$$

$$f_n(y) = \frac{y}{1000}, \tag{5}$$

### 3.3 xx

xx

$$Funcao_i(p) = \gamma + \delta p + \theta p^2 + \omega p^3, \tag{6}$$

(6)

## 4 Resultados Esperados

Nesta seção serão apresentados os resultados esperados...

### 4.1 xx

xx

## 5 Referências

- [1] Rorato, A.C., Dal'Asta, A.P., Lana, R.M. et al. Trajetorias: a dataset of environmental, epidemiological, and economic indicators for the Brazilian Amazon. *Sci Data* 10, 65 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41597-023-01962-1>.
- [2] Prasad, R., Sagar, S.K., Parveen, S. et al. Mathematical modeling in perspective of vector-borne viral infections: a review. *Beni-Suef Univ J Basic Appl Sci* 11, 102 (2022). <https://doi.org/10.1186/s43088-022-00282-4>.
- [3] Vyhmeister E., Provan G., Doyle B., Bourke B. Multi-cluster and environmental dependant vector born disease models. *Heliyon*, Volume 6, Issue 9 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04090>
- [4] Arquam, M., Singh, A., Cherifi, H. (2020). Integrating Environmental Temperature Conditions into the SIR Model for Vector-Borne Diseases. In: Cherifi, H., Gaito, S., Mendes, J., Moro, E., Rocha, L. (eds) *Complex Networks and Their Applications VIII. COMPLEX NETWORKS 2019. Studies in Computational Intelligence*, vol 881. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-36687-2\\_34](https://doi.org/10.1007/978-3-030-36687-2_34).
- [5] ALVES, Leon Diniz. Weather-driven mathematical models of dengue transmission dynamics in twelve Brazilian sites. 2021. 137 f. Tese (Doutorado em Biologia Computacional e Sistemas) - Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2021. <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/52536>.
- [6] Alves, Leon Diniz, Raquel Martins Lana, and Flávio Codeço Coelho. 2021. "A Framework for Weather-Driven Dengue Virus Transmission Dynamics in Different Brazilian Regions" *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 18: 9493. <https://doi.org/10.3390/ijerph18189493>.
- [7] Prasad, R., Sagar, S.K., Parveen, S. et al. Mathematical modeling in perspective of vector-borne viral infections: a review. *Beni-Suef Univ J Basic Appl Sci* 11, 102 (2022). <https://doi.org/10.1186/s43088-022-00282-4>.
- [8] Abdullah, Seadawy, A. Jun, W. New mathematical model of vertical transmission and cure of vector-borne diseases and its numerical simulation. *Adv Differ Equ* 2018, 66 (2018). <https://doi.org/10.1186/s13662-018-1516-z>.
- [9] N. Shah and J. Gupta, "SEIR Model and Simulation for Vector Borne Diseases," *Applied Mathematics*, Vol. 4 No. 8A, 2013, pp. 13-17. doi: 10.4236/am.2013.48A003.