

Théorème 18.13 - *CS pour l'existence d'un point critique*

Soit f une fonction définie au voisinage d'un réel x_0 . Si f est dérivable en x_0 et admet un extremum local en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$.

Théorème 18.30 - *caractérisation du caractère lipschitzien par la dérivée*

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . f est lipschitzienne sur I si et seulement si f' est bornée sur I .

Le cas échéant, si $k \in \mathbb{R}$ est un majorant de $|f'|$ sur I , alors f est k -lipschitzienne.

Théorème 18.39 - *de la limite de la dérivée*

Soit I un intervalle de \mathbb{R} , $x_0 \in I$ et f définie et continue sur I , dérivable sur $I \setminus \{x_0\}$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ existe et vaut $\ell \in \mathbb{R}$, alors f est dérivable sur I entier et :

$$f'(x_0) = \ell$$

Théorème 18.42 - *de prolongement par la classe \mathcal{C}^n*

Soit I un intervalle et $x_0 \in I$. Soit $f \in \mathcal{C}^n(I \setminus \{x_0\})$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f^{(n)}(x) \in \mathbb{R}$, alors f est prolongeable en une fonction de classe \mathcal{C}^n sur I .

Si de plus pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f^{(k)}(x) \in \mathbb{R}$, alors f peut être prolongée sur I en une fonction \tilde{f} de classe \mathcal{C}^n sur I vérifiant alors :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \tilde{f}^{(k)}(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f^{(k)}(x)$$