

Définition 34.11 (1) - *norme associée à un produit scalaire*

Soit E un espace préhilbertien réel. On appelle *norme euclidienne sur E* l'application :

$$\begin{aligned} \|\cdot\| &: E \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\mapsto \sqrt{\langle x, x \rangle} \end{aligned}$$

Définition 34.11 (2) - *vecteur unitaire*

Soit E un espace préhilbertien réel. On dit qu'un vecteur $x \in E$ est *unitaire* si $\|x\| = 1$.

Définition 34.11 (3) - *distance euclidienne*

Soit E un espace préhilbertien réel. On appelle *distance euclidienne sur E* l'application :

$$\begin{aligned} d &: E^2 \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ (x, y) &\mapsto \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle} \end{aligned}$$

Proposition 34.15 - *identité de polarisation*

Soit E un espace vectoriel. Si existe, le produit vectoriel associé à une norme sur E vérifie :

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle x, y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2}{2}$$

Théorème 34.16 (0) - *inégalité de Cauchy-Schwarz*

Soit E un espace préhilbertien réel, $(x, y) \in E^2$.

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \times \|y\|$$

avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Théorème 34.16 (1) - *inégalité triangulaire*

Soit E un espace préhilbertien réel, $(x, y) \in E^2$.

$$||x| - |y|| \leq ||x + y| \leq ||x| + |y|$$

De plus,

$$||x + y| = ||x| + |y| \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}_+, x = \alpha y$$

Définition 34.19 (1) - *vecteurs orthogonaux*

Soit E un espace préhilbertien réel, $(x, y) \in E^2$. On dit que x et y sont *orthogonaux* si $\langle x, y \rangle = 0$. On note alors $x \perp y$.

Définition 34.19 (2) - *parties orthogonales*

Soit E un espace préhilbertien réel, $(X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2$. On dit que X et Y sont *orthogonales* si :

$$\forall (x, y) \in X \times Y, \langle x, y \rangle = 0$$

On note alors $X \perp Y$.

Définition 34.19 (3) - *famille orthogonale*

Soit E un espace préhilbertien réel, $(x_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E . On dit que $(x_i)_{i \in I}$ est *orthogonale* si :

$$\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies \langle x_i, x_j \rangle = 0$$

Définition 34.19 (4) - *famille orthonormée*

Soit E un espace préhilbertien réel, $(x_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E . On dit que $(x_i)_{i \in I}$ est *orthonormée* si elle est orthogonale et constituée de vecteur unitaire, i.e. :

$$\forall (i, j) \in I^2, \langle x_i, x_j \rangle = \delta_{ij}$$