

## TD 12 : Inversion de matrices

christina.boura@uvsq.fr

7 décembre 2020

### 1 Formules de Cramer

Calculer à l'aide des formules de Cramer la solution des systèmes linéaires suivants.

1.

$$\begin{cases} 3x + y - 4z = 12 \\ 2y - z = -1 \\ 3z = 6 \end{cases}$$

On a  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 12 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$ . On calcule  $\det(A) = 3 \cdot 2 \cdot 3 = 18 \neq 0$ .

On calcule les solutions  $x, y, z$  :

$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} 12 & 1 & -4 \\ -1 & 2 & -1 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}}{18} = \frac{6(-1+8) + 3(24+1)}{18} = \frac{6 \cdot 7 + 3 \cdot 25}{18} = \frac{2 \cdot 7 + 25}{6} = \frac{39}{6} = \frac{13}{2}.$$

$$y = \frac{\det \begin{pmatrix} 3 & 12 & -4 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}}{18} = \frac{3(-3+6)}{18} = \frac{3 \cdot 3}{18} = \frac{1}{2}.$$

$$z = \frac{\det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 12 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}}{18} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 6}{18} = 2.$$

2.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 7y - 2z = -1 \\ -x - y + z = 0 \end{cases}$$

On a  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . On calcule  $\det(A) = 1 \cdot (7-2) - 2(1+1) - (-2-7) = 5 - 4 + 9 = 10 \neq 0$ .

On calcule les solutions  $x, y, z$  :

$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 7 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

$$y = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}{10} = \frac{-(1+1)}{10} = -\frac{1}{5}$$

$$z = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}}{10} = \frac{-1+1}{10} = 0.$$

3.

$$\begin{cases} x & +2z & = 3 \\ x & +y & -z & = -1 \\ x & +2y & +3z & = 0 \end{cases}$$

On a  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . On calcule  $\det(A) = 1 \cdot (3+2) + 2(2-1) = 5+2 = 7 \neq 0$ .

On calcule les solutions  $x, y, z$  :

$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}}{7} = \frac{3(3+2) + (-4)}{7} = \frac{15-4}{7} = \frac{11}{7}$$

$$y = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}}{7} = \frac{(-3+2) + 3(-1-3))}{7} = -\frac{1-12}{5} = -\frac{13}{7}$$

$$z = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}}{7} = \frac{2+3(2-1)}{7} = \frac{5}{7}.$$

**Calculer à l'aide des formules de Cramer l'inverse des matrices suivantes**

1.  $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

On calcule la comatrice de  $A$  :  $\text{Com}A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ . On calcule également  $\det(A) = -2 \neq 0$ , la matrice est donc inversible.

On obtient directement

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Com}A^t = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/2 & -1 \\ -1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 \\ -4 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{On calcule } \det(A) = -\det \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} - 2\det \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = 31 - 40 = -9 \neq 0.$$

$$\det(A_{11}) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 7 & -2 \end{pmatrix} = -2$$

$$\det(A_{12}) = \det \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = 8$$

$$\det(A_{13}) = \det \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = -31$$

$$\det(A_{21}) = \det \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix} = -1$$

$$\det(A_{22}) = \det \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = -5$$

$$\det(A_{23}) = \det \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = 16$$

$$\det(A_{31}) = \det \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 1$$

$$\det(A_{32}) = \det \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} = -4$$

$$\det(A_{33}) = \det \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = 20$$

$$\text{On a donc } \text{Com}A = \begin{pmatrix} -2 & -8 & -31 \\ 1 & -5 & -16 \\ 1 & 4 & 20 \end{pmatrix} \text{ et } \text{Com}A^t = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -8 & -5 & 4 \\ -31 & -16 & 20 \end{pmatrix}.$$

Par conséquent,

$$A^{-1} = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -8 & -5 & 4 \\ -31 & -16 & 20 \end{pmatrix}.$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{On calcule } \det(A) = -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -1 \neq 0.$$

$$\begin{aligned}
\det(A_{11}) &= \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -1 \\
\det(A_{12}) &= \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{13}) &= \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{14}) &= \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{21}) &= \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{22}) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{23}) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \\
\det(A_{24}) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{31}) &= \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{32}) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \\
\det(A_{33}) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{34}) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{41}) &= \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{42}) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{43}) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \\
\det(A_{44}) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -1
\end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\text{Com}A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{Com}A^t = \text{Com}A \text{ et donc } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

## 2 Méthode de Gauss-Jordan

**Calculer par la méthode de Gauss-Jordan l'inverse des matrices suivantes** La méthodologie est partout la même. On forme la matrice  $(A|I)$ , on applique des opérations élémentaires sur les lignes de cette nouvelle matrice jusqu'à obtenir une matrice sous la forme  $(I|B)$ . On sait alors que  $B = A^{-1}$ .

1.  $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

On forme  $(A|I)$  et on lui applique des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & | & 1 & 0 \\ -1 & 3 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} -1 & 3 & | & 0 & 1 \\ 0 & -2 & | & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow (-1/2)L_2]{L_1 \leftarrow (-1)L_1} \begin{pmatrix} 1 & -3 & | & 0 & -1 \\ 0 & 1 & | & -1/2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + 3L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & -3/2 & -1 \\ 0 & 1 & | & -1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

On a donc que  $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3/2 & -1 \\ -1/2 & 0 \end{pmatrix}$ .

2.  $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 \\ -4 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & -2 \end{pmatrix}$

On forme  $(A|I)$  et on lui applique des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & -2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & | & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & -2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow 4L_3]{L_1 \leftarrow 3L_1} \begin{pmatrix} 12 & 12 & -3 & | & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & | & 1 & 1 & 0 \\ 12 & 28 & -8 & | & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{pmatrix} 12 & 12 & -3 & | & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 16 & -5 & | & -3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow 16L_2]{L_1 \leftarrow (1/3)L_1} \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 16 & -5 & | & -3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow (-1/9)L_3]{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 80 & -16 & | & 16 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & | & -31 & -16 & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow (-1/16)L_2} \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 31/9 & 16/9 & -20/9 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 + L_3]{L_2 \leftarrow L_2 + L_3} \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 & | & 40/9 & 16/9 & -20/9 \\ 0 & 5 & 0 & | & 40/9 & 25/9 & -20/9 \\ 0 & 0 & 1 & | & 31/9 & 16/9 & -20/9 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow (-1/5)L_2]{L_1 \leftarrow (1/4)L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 10/9 & 4/9 & -5/9 \\ 0 & 1 & 0 & | & 8/9 & 5/9 & -4/9 \\ 0 & 0 & 1 & | & 31/9 & 16/9 & -20/9 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2/9 & -1/9 & -1/9 \\ 0 & 1 & 0 & | & 8/9 & 5/9 & -4/9 \\ 0 & 0 & 1 & | & 31/9 & 16/9 & -20/9 \end{pmatrix}.$$

3.  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

On forme  $(A|I)$  et on lui applique des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

On a donc que  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

4.  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

On forme  $(A|I)$  et on lui applique des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 + L_1, L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_4} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_4 \leftarrow L_4 - 2L_3} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + L_3]{L_1 \leftarrow L_1 + L_4} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 4 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & -2 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_1 - 2L_2} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 4 & -6 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & -2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

On a donc que  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ .