

SBAR를 사용한 의사소통 개선

팀명 : YESBAR!!




활동배경

1. 최근 병동 내 신규 간호사 비율이 증가하고 의사 파업으로 인한 전공의 부재로 교수에게 직접 보고할 일이 많아짐에 따라 업무 인수인계와 의사-간호사 간 의사소통에서 어려움이 발생하고 있다.
2. 의사-간호사 간 의사소통에서 발생한 어려움은 의료진 간의 정보 공유가 원활하지 않고, 중요한 환자 정보를 누락하여 부정확한 정보를 전달할 위험이 있다. 이는 나아가 환자 안전도 위협 할 수 있다.
3. SBAR 기법은 간결하고 명확한 정보를 전달할 수 있도록 해준다. 이를 통해 의료진들은 환자 상태에 대해 신속하고 정확한 정보공유가 가능하고 의사소통의 오류를 줄일 수 있다.
4. 정보 전달 방법을 구조화함에 따라 불필요한 설명이 줄고 필요한 정보의 빠른 파악이 가능해져 업무 효율성이 향상되고 신속한 대응이 가능해진다.
5. 정확한 정보 전달은 환자 간호에 직접적인 영향을 미친다. SBAR를 통해 의사소통이 원활해지면, 환자 상태에 대한 정확한 보고와 피드백이 가능해질 것이며 그에 따라 환자 안전과 간호의 질을 높일 수 있다.

1. 52병동 간호사 경력 현황


- 1년 이하의 간호사가 33%, 5년 미만은 55%로 과반수 이상을 차지함.



<2025.03.24 ~ 2025.03.28, 52병동 간호사 16명>

2. 의사~간호사 간 의사소통에 대한 조사


의사에게 보고 시 어려움의 정도



■ 어렵다 ■ 쉽다




왜 어려울까?



<2025.03.24 ~ 2025.03.28, 52병동 간호사 16명>

3. 의사소통의 표준화 필요성




■ 필요하다 ■ 필요하지 않다

<2025.03.24 ~ 2025.03.28, 52병동 간호사 16명>

4. 의사소통 항목 별 불명확성

- 항목 별 명확하게 소통할 수 있도록 개선이 필요한 영역을 확인



<2025.03.24 ~ 2025.03.28, 52병동 간호사 16명>

팀 구성

(*다른 부서와 함께 활동한 경우, 아래와 같이 부서1, 부서2로 나누어 기재하고, 팀원명도 각 부서에 맞는 자리에 적습니다.)

팀장	52병동	양길녀
간사	52병동	김은영
팀원	52병동 신경외과	윤지선 최다혜 김은진 김소라 조해인 신예진 김수민

핵심지표 및 목표

(*지표명은 간단하고 부르기 쉽게, 그러나 무엇을 의미하는지 한 눈에 알 수 있는 이름이 좋습니다.)

핵심지표

52병동 간호사의 의사소통 명확성 점수

지표정의

정의 : 간호사~의사 간 의사소통 과정에 대해 명확하다고 느끼는 정도

분자 : 각 항목별 응답자 점수의 총합

분모 : 의사소통 명확성 설문 응답자 수

목표설정

현수준 : 2.3점



목표 : 3.3점

설정 근거 : 의사소통 명확성 점수 현수준 대비 1점 향상

자료수집

수집방법 : 52병동 근무 간호사를 대상으로
의사소통 명확성 설문지 배포 후 점수 산출


수집기간 : 1차 - 25.03.15~25.04.02 (N : 16)

2차 - 25.09.03~25.09.12 (N : 16)

(*1차는 활동 전에 조사, 2차는 활동 후에 조사합니다. 두 값을 비교하여 효과가 있었는지 평가합니다.)

2. Fish-bone diagram 원인분석 결과

(* 부록[그래프, 도식 샘플]의 브레인스토밍, 피시본, 파레토 차트 중 선택하여 사용, 결과를 기재 합니다.)




1. 도출된 개선전략 내용

(* 여기서 작성된 내용은 뒷장의 [2. 개선전략 우선순위 선정]과 동일해야 합니다.)

간호사	교육, 시스템	의사	환경
• 명확한 의사소통의 중요성 교육 • 표준화된 의사소통 도구 선정 • 간호사 간 피드백 • SBAR 템플릿 제작 • 상황에 따른 SBAR 형식을 활용하여 보고	• 의사소통 방법에 대한 교육 활동 실시 • 의사소통 중요성에 대한 교육 • SBAR 템플릿 제작 • SBAR 템플릿 사용 simulation • 지속적인 SBAR 사용평가 및 개선 활동	• SBAR사용을 통한 명확하고 간결한 처방지시 • 지정의-당직의 간의 인계 • 하이투스를 활용하여 보고 • 간담회 실시	• 간호사 및 의사 인력 충원 • SBAR 활용 보고에 대한 정기적인 리뷰 및 실습

2. 개선전략 우선순위 선정

(* 여기서 작성된 내용은 앞장의 [1. 도출된 개선전략 내용]과 동일해야 합니다.
여기서 수행할 활동들만 뒷장의 [3. 활동계획 수립]에 적습니다.)



3. 활동계획 수립

(* 여기서 작성된 내용은 앞장의 [2. 개선전략 우선순위 선정] 중 일부 활동만 골라서 적습니다.)

핵심문제	개선전략	담당자	기간
의사소통 비표준화 체계적인 보고방식의 부재	SBAR 템플릿 제작	윤지선 김은영 신예진	25.5.13-6.15
의사소통 비표준화	SBAR 템플릿 사용 simulation	최다혜 김은진 조해인	25.5.13-6.15
의사소통 기술 미숙	간호사 간 피드백	양길녀 김수민 김소라	25.5.13-6.15
의사소통방법에 대한 교육 부재	지속적 SBAR 사용평가 및 개선활동		25.7.1-9.30

개선활동 내용

1. SBAR 템플릿 제작

-진료과별로 작성(52병동 주요 입원 진료과 3개)



개선활동 내용

1. SBAR 템플릿 제작

-mental change, motor change, 경련 등 13개 상황에 대한 템플릿 제작

주요상황

SBAR 단계

Mental change

1. Situation

교수님 52병동 간호사 ()입니다.
(500)호 (000)님 mental change
있어 noti 드립니다.



2. Background

Dx ()로 () OP POD
()일 째로 기저질환으
로는 () 있습니다.

3. Assesment

(변화시점)부터 (의식수
준)에서 (의식수준)으로
변화 있고 (동공 반사 유/
무, 크기, 반응) 입니다.
(V/S)입니다.

4. Recommendation

CT 찍으시나요?
O2랑 EKG monitor
apply할까요?

52병동
YESBAR

한양대학교구리병원
HANYANG UNIVERSITY GURI HOSPITAL



S
발생한 상황
설명

B
환자의
기본정보
설명


A
간호사가
확인, 측정
한 정보

R
필요 처방에
대한 권고



한양대학교구리병원
HANYANG UNIVERSITY GURI HOSPITAL

2. SBAR 템플릿 교육



제작한 SBAR 템플릿을 간호사에게 교육하는 모습

일시 : 7월 14일(1차), 7월 15일(2차), 7월 18일(3차), 7월 19일(4차), 7월 20일(5차)
(데이와 이브닝 전체인계시간)

장소 : 52병동 간호사실

대상자 : 52병동 근무 간호사 16명

내용 : 템플릿 구성, 사용 방법, 피드백

3. SBAR 템플릿 사용 simulation



제작한 SBAR 템플릿을
신규 간호사에게 교육하는 모습





제작한 SBAR 템플릿을 이용하여
실제 notify 상황에서 적용하는 모습

개선활동 내용

4. 간호사 간 피드백

전체 인계시 종이에 적어
상시 수집(월 1회 확인)




사용 후기
수집

개선점 발견

개선안 배포

개선 반영



"인쇄물은 커서 휴대성이 떨어져요"

"진료과마다 notify 대상자가 달라 헷갈려요"

"글씨가 잘 보이지 않습니다"




개선활동 결과

1. 핵심지표 결과 평가

의사소통 명확성 점수가 2.3에서 개선 활동 후 3.4점으로 목표점수(3.3점)에 도달하였다.


52병동 간호사의 의사소통 명확성 점수



<2025.09.05 ~ 2025.09.08, 52병동 간호사 16명>

2. 핵심지표 외 효과평가

[의사에게 보고할 때 어려움을 느끼십니까?]



<2025.09.05 ~ 2025.09.08, 52병동 간호사 16명>

- QI활동 진행 후, 신입 간호사의 긴장도가 **유의미하게 감소함**.
→ 근무하는 간호사의 **정서적 안정감과 자신감 향상**을 시사.


환자 안전 확보와 간호서비스 질 개선

- SBAR을 통한 커뮤니케이션의 표준화 및 일관성 확보로 정보 누락과 전달 실수가 감소하였다.
- 표준화된 도구로 환자 상태 변화에 신속한 대응이 가능해지고 인수인계 실수가 감소하였다.
- 반복적인 SBAR 활용 훈련으로 신규 간호사의 의사소통 역량과 임상 상황에서의 자신감이 향상되었다.



확대 및 유지관리 방안

- 병원 전체에 SBAR 자료 및 도구확대 보급
- 병원 전체 QI회의에서 SBAR 우수사례 공유 및 포상



요약결과보고서

주제명	SBAR를 사용한 의사소통 개선
팀원	양길녀, 김은영, 윤지선, 최다혜, 김은진, 김소라, 조해인, 신예진, 김수민
활동의 필요성	신규 간호사 증가와 전공의 부재로 교수에게 직접 보고하는 일이 많아지면서 의사소통 오류와 정보 누락이 발생하였다. 이를 개선하기 위해 간결하고 명확한 보고가 가능한 SBAR기법을 도입하여 환자안전과 의사소통의 정확성을 높이고자 하였다.
문제 분석 (현 수준)	92%의 간호사가 보고 시 어려움을 느꼈고, 의사소통 명확성 점수는 평균 2.3점으로 낮았다. 대부분 5년 미만의 간호사로 표준화된 보고 경험이 부족한 상태였다.
핵심지표 및 목표	이번 QI 활동의 핵심지표는 의사소통 명확성 점수로, 현 수준은 2.3점이었다. 이를 3.3점으로 향상시키는 것을 목표로 활동 전후 설문을 통해 개선 정도를 평가하였다.
개선활동	먼저 신규 간호사가 실제 보고 시 바로 활용할 수 있도록 표준화된 SBAR 템플릿을 제작하여 제공하였다. 다음으로 SBAR의 개념과 활용 방법에 대한 체계적인 교육을 실시하여 신규 간호사의 이해도를 높였다. 셋째, 실제 임상 상황을 재현한 시뮬레이션 실습을 통해 SBAR 보고를 반복적으로 연습하며 적용 능력을 강화하였다. 넷째, 교육과 실습 후 참여자 및 지도자의 피드백을 수집하여 부족한 부분을 보완하고 개선 방향을 도출하였다. 마지막으로 간담회와 공유의 시간을 마련하여 교육 경험과 성과를 팀 내 구성원들과 나누고 확산시켰다.
개선활동의 효과	활동 후 의사소통 명확성 점수가 2.3점에서 3.4점으로 향상되어 목표를 달성하였다. 핵심지표 외 효과 평가에서는 의사에게 보고 시 어려움을 느끼는 간호사의 비율이 92%에서 48%로 감소함으로써 간호사의 정서적 안정감과 자신감 향상을 확인할 수 있었다. 직종 간 원활한 의사소통이 활성화됨에 따라 간호의 질은 더욱 향상되었고, 환자 안전 수준도 높아졌다.
결론 및 향후 관리방안	SBAR 도입으로 의사소통이 명확해지고 업무 효율이 향상되었다. 이후에도 교육팀과의 협업을 통해 SBAR 보고법을 정기 교육에 포함하고 템플릿을 지속적으로 개선한다면 효과는 더 극대화될 것이다. 또 SBAR 템플릿을 전산시스템과 동기화한다면 직원들이 사용하기 더 편리해질 것이며, 나아가 단일부서에서 벗어나 타 병동으로도 교육 및 적용을 확대한다면 병원 전체의 의사소통이 표준화될 것이며, 환자 안전 향상에도 큰 도움이 될 것이다.