

신규간호사의 심정지 상황 대응력 향상 활동

팀명 : 신박교육
(신규 compression 교육)



1. 신규 간호사는 경력간호사에 비해 심정지 상황에 대한 인지가 부족하고 이로 인해 대처능력이 부족하며, 부담과 스트레스가 크다.
2. 현재 각 부서의 간호사 경력을 살펴보면 만 2년 이하인 경우가 최소 19%에서 최대 71%의 비율을 차지하고 있다.
3. 그러나 이들을 위한 심폐소생술 교육은 이론교육에 의지하고 있어, 실제 상황 발생 시 적절한 역할 수행에 어려움을 겪고 있다.
4. 한편, 전문소생술 시뮬레이션 기반 교육은 연차에 상관없이 높은 교육 성과를 기대할 수 있어 각광받는 교육법이다.
5. 이에 신규간호사에게 전문소생술을 위한 적절한 교육과 경험을 제공하여 심정지 상황 대응력을 향상시키고자 한다.

1. 간호인력 요구도

시니어인 저도
CPR 상황을 겪어본 적이 없어요.

직접 해보지 않아서
잘 모르겠어요

제세동을
저희가 해도 돼요?

이론 교육만 들으니까
실제 상황이 좀 걱정돼요.

EKG 리듬은
아무리 봐도 모르겠어요.

상상했던 것과 실제 CPR은
차이가 있었어요.
더 긴박하고 다급했고,
훨씬 더 당황스러웠어요.

실제로 그 상황에닥치면
어떻게 해야 하죠?




경험

부담감

2. 예측 불가능한 CPR 건수

CPR 발생 건수

(단위 : 건)




예측 불가능한 CPR 건수

- 건수가 감소할 경우 경험 부족, 심정지 대응 긴장감 저하
- 실제 상황 발생 시 초기대응 능력, 실무역량 저하

3. 전문소생술 수행도

- 신규 배치 간호사 대상 평가 시행, 항목 별 정답자 수


(단위 : 명)



3. 전문소생술 수행도


- 신규 배치 간호사 대상 평가 시행, 항목 별 정답자 수

(단위 : 명)



3. 전문소생술 수행도

- 신규 배치 간호사 대상 평가 시행, 항목 별 정답자 수



조사대상 : 3월, 4월 입사 전체 신규간호사 (N=21)
 조사기간 : 2025.03.01 - 2025.04.30


팀 구성

팀장	간호국	정지현
간사	간호국	최나영
팀원	응급의학과 간호국	권이슬 박예림 서수안 장수정 최다슬

핵심지표	신규 간호사의 전문소생술 수행도	
지표정의	정의 : 신규 간호사가 전문소생술을 시행할 수 있는 수행능력을 평가한 점수(만점 25점) 분자 : 전문소생술의 수행도 점수의 총합 분모 : 신규 간호사의 수	
목표설정	현수준 : 8점/25점 ➡ 목표 : 18점 이상/25점 설정 근거 : 현 수준 대비 10점 상승을 목표로 함	
자료수집	수집방법 : 2025년 입사한 신규간호사를 대상으로 자기 기입식 시험지 배부 및 회수 수집기간 : 1차 - 2025년 3월 1일 ~ 4월 30일 (N=19) 2차 - 2025년 6월 16일 ~ 8월 27일 (N=9)	

원인분석

1. Brainstorming 원인분석 결과



1. 도출된 개선전략 내용

지식부족

- 심정지 상황 및 대처 방법에 대한 자료 제작, 제공 및 이론교육 시행
- 원내 제세동기 배치 장소 교육
- 전 문 소 생 술 시뮬레이션 교육 시행

심리적 부담감

- 전 문 소 생 술 시뮬레이션 후 디브리핑 시행
- CPR 상황 시 대응 방법, 표준 지침에 대한 소책자 제공
- 정기적인(연 4회) 교육 시행


훈련기회 부족

- 다양한 시나리오를 통한 시뮬레이션 교육을 실시
- 시뮬레이션 교육 장소 및 필요 기자재 확보

기구사용 미숙

- 병실 환경 및 기구 사용법 교육 시행
- 기구 사용 방법, E-cart 구성물품에 대한 소책자 제공

2. 개선전략 우선순위 선정




3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
- 기본소생술(BLS)에 대한 개념은 숙지하고 있으나, 전문소생술(ACLS)에 대한 지식은 부족하다. - 심정지 상황 인지 능력이 부족하다. - 원내 심폐소생술 팀 활성화 방법(CPR 방송 등)에 대한 지식이 부족하다.	심정지 상황 및 대처 방법에 대한 자료 제작, 제공 및 이론교육 시행	박예림 서수안 장수정 최다슬	3월 17일 ~
	원내 제세동기 배치장소 교육		
	전문소생술 시뮬레이션 교육 시행	정지현 권이슬 최나영	6월 16일 ~
신규간호사로서의 부담감이 크다.	전문소생술 시뮬레이션 교육 후 디브리핑 시행		
- 수동제세동기의 사용법이 미숙하다. - 원내 침대(자동침대)의 사용법을 모른다. (CPR 모드 및 침대 헤드보드 분리 방법) - E-cart 구성 및 구성품 사용 방법을 모른다.	병실 환경 및 기구사용법 교육 시행	팀원 전체	3월 17일 ~
시뮬레이션을 위한 교육장이 없다.	시뮬레이션 교육 장소 및 필요 기자재 확보	정지현 권이슬 최나영	3월 17일 ~ 5월 20일

개선활동 내용


1. 심정지 상황 및 대처 방법에 대한 자료 제작, 제공 및 이론교육 시행



- 신규 간호사의 병동 배치 전 5일 교육 시 심정지 상황 및 대처 방법에 대한 이론 교육 시행
- ACLS 교육 : 생존사슬, BLS, 제세동기 사용/심정지 심전도, 기도관리, 약물, 소생 후 치료
- 교육진행 : 심폐소생술 코디네이터 권이슬

개선활동 내용


2. 원내 제세동기 배치장소 교육



HANYANG UNIVERSITY GURI HOSPITAL

- 2) 전초차 B (제세동기 연결 --- 리듬확인 --- 맥스코 인공호흡, 전동기도기 삽입 준비)
 - ① 제세동기를 부착하여 가슴압박을 10초 이내로 중단하고 초기 리듬을 확인한다.
"제세동기 연결했습니다. 초기 리듬 확인하겠습니다. 모두 물려주세요."
"초기리듬 확인 후 Shockable 리듬인지 Nonshockable 리듬인지 확인한다."
"VF입니다. 제세동 시행하겠습니다." (이때 제세동 준비 전까지 가슴압박은 지속한다)
"VT입니다. 리듬 확인하였습니다. 리듬 없습니다."
"VVT입니다. 제세동 시행하겠습니다." (이때 제세동 준비 전까지 가슴압박은 지속한다)
"Asystole입니다. 가슴압박 유지해주세요."
"PEA입니다. 리듬 확인하였습니다. 리듬 없습니다. PEA입니다. 가슴압박 유지해주세요."
② 전동기도 확보 전까지 가슴압박과 인공호흡을 비율은 30:2로 시행한다.
③ 실폐소장을 지움됨 도착 후 wall O2, suction, 전동기도삽관을 준비한다.
- 3) 전초차 C (심정지환송 --- 음급거트 준비 --- IV route 확보 --- 에피네프린 등 필요 약을 투여)
 - ① 투음요청을 받은 후 EHR 상에서 연명치료 중단 여부 확인, 이후 심정지 발송한다.
작업 전화방송 원내전화 77# --- 차장실 등근 "OO과 1번 OO병동" 2회 반복 --- "F" 누르고 끊기
--- 원내전화 77# - 차장실 등근 "OO환자과 1번 322동" 2회 반복 - #

매뉴얼 내 제세동기 배치장소



- 신규간호사가 배치받은 근무지의 제세동기 위치, 비상시 대비한 인근의 제세동기 위치 안내
- 실제 비치 장소를 찾아가서 확인

개선활동 내용

교육 신청

사전 자료

시뮬레이션

디브리핑

3-1. 전문소생술 시뮬레이션 교육 시행

교육과정등록

개설년도 2025 교육구분 신규교육 교육과정 CPR simulation 01

교육모듈 공통 교육기간 2025-06-16 13:00 ~ 2025-06-16 14:00

교육장소 본관 12층 중회의실

수강구분 원내 담당자 2 10 정지현

등록비 0 보수교육과정 공통실문적용

☒ 신청기간 2025-05-17 08:00 ~ 2025-06-09 23:59

교육인원 16 / 강의(hr) 1 실습(hr) 0

총교육인원 16 총교육시간 1

주제별교육인원 0

특기사항 3신 CPR simulation

순번 1

교육모듈명 공통

주제명 Arrest 상황 simulation

강사명 정지현

사번 2251545

교육방법 강의

교육시간 1

※ 삭제 클릭 후, 저장을 하셔야 완전 삭제됩니다.

저장 종료

교육생 관리

개설년도 2025 교육구분 신규교육 교육과정명 CPR simulation 차수 1 교육주제명 Arrest 상황 simulation

신청/수료 ☐ 신청자 ☒ 수료자 교육기간 2025-06-16 ~ 2025-06-18 교육신청기간 2025-05-17 08:00 ~ 2025-06-09 23:59

조회 (F2)

메시지

☐	순번	신청구분	교육생구분	사번	성명	소속부서	근무부서	직위	교육모듈	총교육시간	강의시간	실습시간	면허번호	연락처	보수교육	신청일시
☐	1	일반	원내	21 03	김 동	간호국	외과계중환자실	간호사	공통	1	1	0		010-1939		2025-06-
☐	2	일반	원내	21 41	김 빈	간호국	마취후회복관리실	간호사	공통	1	1	0		010-4673		2025-06-
☐	3	일반	원내	21 51	전 은	간호국	응급의료센터	간호사	공통	1	1	0		010-6261		2025-06-
☐	4	일반	원내	21 47	김 연	간호국	71병동	간호사	공통	1	1	0		010-8802		2025-06-
☐	5	일반	원내	21 51	김 빈	간호국	72병동	간호사	공통	1	1	0		010-3593		2025-06-
☐	6	일반	원내	21 56	최 지	간호국	102병동	간호사	공통	1	1	0		010-4823		2025-06-
☐	7	일반	원내	21 09	박 현	간호국	52병동	간호사	공통	1	1	0		010-1216		2025-06-
☐	8	일반	원내	21 13	김 빈	간호국	82병동	간호사	공통	1	1	0		010-6513		2025-06-
☐	9	일반	원내	21 28	이 경	간호국	112병동	간호사	공통	1	1	0		010-7379		2025-06-
☐	10	일반	원내	21 22	서 정	간호국	내과계중환자실	간호사	공통	1	1	0		010-1856		2025-06-
☐	11	일반	원내	21 56	이 빈	간호국	72병동	간호사	공통	1	1	0		010-2886		2025-06-
☐	12	일반	원내	21 84	남 정	간호국	응급의료센터	간호사	공통	1	1	0		010-9066		2025-06-
☐	13	일반	원내	21 99	조 문	간호국	수술실	간호사	공통	1	1	0		010-7378		2025-06-
☐	14	일반	원내	21 18	현 원	간호국	마취후회복관리실	간호사	공통	1	1	0		010-4234		2025-06-
☐	15	일반	원내	21 37	강 경	간호국	외과계중환자실	간호사	공통	1	1	0		010-7641		2025-06-

- ◆ 시뮬레이션 교육 전 EHR 원내 교육 신청
- 시스템상 월별 신규 교육과정 등록
- 교육 진행 후 수료자 확인

개선활동 내용

교육 신청

사전 자료

시뮬레이션

디브리핑

3-2. 전문소생술 시뮬레이션 교육 시행

CPR 시뮬레이션 시나리오 타임라인 및 업무 분담			
간호사 A	간호사 B	간호사 C	
1) 의뢰자 없는 환자 발견 : 가슴이나 어깨를 가볍게 두드리며 "괜찮은 건가요?" 는 떠보세요. 2) DNR 여부 확인 : 환자 옆에 DNR 스티커 확인(DNR 확인을 위해 심폐소생 불 및 활성화 절차가 지연되지 않도록 한다.) 3) 소생법 결정(소생도움 요청) : 의도적 환자의 곁에서 "간호사C 선생님, CPR 시행해 주 시고 제세동기, 응급기호 가져와 주세요." (상황자가 의심되는 경우 소생법 활성화) 4) 맥박과 호흡을 동시에 확인한다. (5초-10초 이내) - 맥박 : 목동맥(삼각리듬역 동시 촉진 가능) 촉진 - 호흡 : 목통의 움직임 확인 (주요 일, 가슴, 배의 움직임) - 활맥(심장) 호흡과 정상 호흡 구분			
5) 가슴압박을 즉시 시작 : 심장박을 발견한 자는 30 이내 가슴압박을 시작한다. - 위치 : 가슴뼈 하단 1/2 - 깊이 : 5-6cm - 속도 : 분당 100-120회 - 완만한 이완(완벽한 이완이 아닌 1/3) - 압박 중단의 최소화	1) 제세동기를 가지고 온다. 2) 제세동기 부착 - 전원을 켜. (손잡이를 [MONITOR]까지 돌린다.) - LEAD I를 확인한다. - 전극을 부착한다. (RA, LA, LL) - "제세동기 부착했습니다. 초기 리듬 확인하겠습니다. 다. 모두 돌려주세요." 3) 초기 리듬 확인(30초 후) 후 제세동 결정 - "VF입니다. 제세동 시행하겠습니다." (제세동 준비 전까지 가슴압박 재개) - "VT입니다. 맥박 확인하겠습니다. 맥박 없습니다. pVT입니다. 제세동 시행하겠습니다." (제세동 준비 전까지 가슴압박 재개) - "Asystole입니다. 가슴압박 유지해주세요." - "(PEA) 맥박 확인하겠습니다. 맥박 없습니다. PEA입니다. 가슴압박 유지해주세요." - 초기 리듬 확인 후 30초마다 심전도를 확인한다.	1) 도움요청 받은 후 "간호사B 선생님, (상황지 장소로 제세동기 가져가 주세요." 2) DNR 확인 : EHR [연령이름] 불러 확인 3) CPR 방상 : 수위가 높고 - 77° - 자음발 돌고 - 진료통과는 반+발생장소" 진료통과는 반+발생장 소" - # 누르고 - 수위가 내려가	6) 2분마다 간호사 B와 가슴압박 교대

가슴압박 교대	호흡보조	< 제세동 시행 방법 > - 손잡이를 [DEFIB]까지 돌린다. - 에너지를 선택한다. (120J-200J) - Paddle 사용 시 충분한 양의 젤을 도포한다. - [CHARGE] 버튼을 눌러 에너지를 충전한다. - 충전이 완료되면 Paddle을 Sternum, Apex에 위치시키고 제세동을 실시한다. "모두 떨어지세요. 호파, 볼, shock, 뎀, 다섯" - 제세동 후에는 즉시 가슴압박을 재개한다.	5) 정맥로 확보 및 약물 투여(시간 제한) - 10G IV route 확보 or 사용중인 중심정맥 관 : "IV route 확보했습니다. Epinephrine 1mg 투여 할까요?" - 3way 2개 연결 - N/S IL 연결 및 hydration - Epinephrine 투여 : 모든 심장지 환자 3-5분마다 1mg IV bolus - Cordarone 투여 : 반복되는(3회 이상) 제 세동에 불응 시 300mg을 50W 20-30cc 와 혼합하여 IV bolus, 150mg 추가 투여
		5) 호흡보조(2분마다 간호사 A와 가슴압박 교대) - 기도 유지 : 머리가 올라-턱돌아올리기, 턱밀어올리기, GPR(압인두기도기) - 전문기도가 확보되기 전까지는 Bag mask ventilation을 실시 - 가슴압박:인공호흡 = 30:2 - 100%의 산소 투여(15L/min) - E-C 테크닉 : 기도유지, 가슴이 올라오는지 확인, 마스크 사이로 바람이 새지 않는지 확인 - 과호흡 방지 : 한 손으로 턱의 1/3만 잡고 할 것 - 전문기도가 삽입 준비(Intubation or i-gel) : 준비 물품, suction, videoscope - 전문기도 삽입 후에는 가슴압박은 멈출 것이 계속 진행, 분당 10회로 인공호흡	6) 가슴압박 교대 후 상황 기록

- ◆ 시뮬레이션 교육 전 교육생(신규간호사)에게 사전 숙지 자료 제공
- CPR 시뮬레이션 시나리오 타임라인 및 업무 분담
- 입사 6주차에 제공
- 역할별 업무를 충분히 숙지한 상태로 교육에 참여하도록 독려

개선활동 내용

교육 신청

사전 자료

시뮬레이션

디브리핑

3-3. 전문소생술 시뮬레이션 교육 시행



◆ 시뮬레이션 교육

- 사전 브리핑(5분) : 시뮬레이터 사용법, 수동제세동기 사용법 및 시나리오에 대해 설명
- 시뮬레이션(7분/1회당) : 업무 변경하여 총 3회 진행
- 디브리핑(8분/1회당)

15분씩 3회 = 45분

* 시뮬레이션 진행 후 즉시 디브리핑 진행

- 3월 신규간호사(16명) : 6/16 - 6/18 [13:00 - 14:00]
- 4월 신규간호사(3명) : 7/2 [12:30 - 14:00]
- 6월 신규간호사(9명) : 8/26 - 8/27 [12:30 - 14:00]

개선활동 내용

교육 신청

사전 자료

시뮬레이션

디브리핑

4. 전문소생술 시뮬레이션 교육 후 디브리핑 시행



◆ 디브리핑

- 정의 : 학습 촉진자(교육자)가 시뮬레이션에서 수행한 내용을 학습자(신규간호사)에게서 이끌어내고 배운 내용을 명확하게 인식하여 실제 임상에 적용할 수 있도록 안내하는 대화 과정 진행
- 방법 : 본 과정에서는 **디브리핑 절차의 3가지 기법인 피드백, 디브리핑, 유도성찰**을 하였고 총 3번의 시뮬레이션 속에서 학습자들의 역량이 향상되는 것을 관찰함

- 피드백 : 학습자, 촉진자, 시뮬레이터, 동료간의 수행을 개선하기 위한 목적으로 정보가 전달되는 단방향 절차
- 디브리핑 : 시뮬레이션 학습활동안에서 공식적이고 협력적인 성찰이 이루어지는 양방향의 절차
- 유도성찰 : 촉진자가 이해와 통찰력을 얻기위해 경험의 중요한 요소를 탐색하도록 장려하는 절차

5. 병실 환경 및 기구 사용법 교육 시행



- 신규간호사에게 수동 제세동기 사용법에 대해 현장교육 및 사전 브리핑 시 설명
- 원내 침대(자동침대) 사용법[CPR 모드, 침대 헤드보드 분리 방법]에 대해 설명 후 직접 실습
- E-cart 구성 및 구성품 사용 방법에 대해 내용물을 직접 보며 설명

개선활동 내용

6-1. 시뮬레이션 교육 장소 및 필요 기자재 확보



"사랑을 실천하는"

한양대학교구리병원

수신자 내부결재
(경유)

제 목 신규간호사 심정지 시뮬레이션을 위한 복막투석실 사용 계획의 건

1. 신규간호사의 심정지 상황 대응력 향상활동의 일환으로 심정지 시뮬레이션을 진행하고 있습니다.
2. 심정지 시뮬레이션 진행에 필요한 교육장으로 인공신장실 내 복막투석실을 사용하고자 합니다.
3. 월별 복막투석 스케줄을 확인하여 진행에 차질이 없도록 시뮬레이션 계획 날짜는 조정이 가능합니다.

첨부 : 2025년도 신규간호사 심정지 시뮬레이션 계획 1부, 끝.

2025년도 신규간호사 심정지 시뮬레이션 교육 계획

대상자	계획 날짜
3월 신규	6/16 ~ 6/18
4월 신규	7/1 ~ 7/3
6월 신규	8/27 ~ 8/29
7월 신규	9/23 ~ 9/25
8월 신규	11/4 ~ 11/6
9월 신규	12/2 ~ 12/4

◆ 시뮬레이션 교육 장소

- 인공신장실 내 복막투석실 이용
- 월별 복막투석 스케줄 확인 후 시뮬레이션 훈련 일정 조율

개선활동 내용


6-2. 시뮬레이션 교육 장소 및 필요 기자재 확보

기자재	 		
	시뮬레이터	수동제세동기	그 외 기타 물품
지원부서	응급의학과 CPR 코디네이터		인공신장실

개선활동 결과

1-1. 핵심지표 결과 평가 : 신규간호사의 전문소생술 수행도


- 핵심지표는 활동 전 8점(25점)에서 **활동 후 18점(25점)**으로 목표를 달성함.
- **현 수준 대비 약 10점 상승함.**



개선활동 결과

1-2. 핵심지표 결과 평가 : 신규간호사의 전문소생술 수행도

월별 신규간호사 전문소생술 시뮬레이션 교육 참여 전, 후 비교




조사대상 : 시뮬레이션 교육을 받은 신규 간호사(n=28)
 조사기간 : 2025.06.16 - 2025.08.27

2-1. 핵심지표 외 효과평가

신규간호사 전문소생술 시뮬레이션 교육 후 설문 결과 (5점 만점)

(단위 : 점)



2-2. 핵심지표 외 효과평가

신규간호사 전문소생술 시뮬레이션 교육 후 설문 결과

이론교육보다 시뮬레이션이 실제
상황에 적용하기 좋을 것 같다

직접 제세동을 시행해보고 현장 같은 분위기에서
실습해보며 응급상황을 공부한 것이 좋았다

실제 상황을 가정하고 역할에
몰입할 수 있었던 것

이론교육 후 실제로 시뮬레이션을 통해 지식습득 정도를
확인해볼 수 있어서 좋았다.
제세동기를 사용할 수 있어 도움이 되었다

당황스러울 수 있는 상황을 미리
연습해볼 수 있어서 좋았다

한번씩 모든 역할을 돌아가면서 하고
바로 피드백 해주셔서 좋았습니다



두려움




자기 효능감



신규간호사의 응급상황 대응 역량 강화

- 시뮬레이션 교육을 통한 상황 인지, 분석 및 대응 능력의 체계적 강화와 성공적인 문제 해결 경험을 통해 임상 판단력과 자기 효능감 증진
- 다양한 상황과 역할을 모두 경험, 연습함으로써 응급 상황에서의 협력적·유기적 대응 방안 학습
- 신규 간호사 교육 커리큘럼 내 시스템 확립을 통해 지속적인 교육 가능성 확인



확대 및 유지관리 방안



요약결과보고서

* 서술형태로 간단히 요약하여 적습니다.

주제명	신규간호사의 심정지 상황 대응력 향상 활동
팀원	정지현, 최나영, 권이슬, 박예림, 서수안, 장수정, 최다슬
활동의 필요성	신규 간호사는 경력간호사에 비해 심정지 상황에 대한 인지가 부족하고 이로 인해 대처능력이 부족하며, 부담과 스트레스가 크다. 현재 각 부서의 간호사 경력을 살펴보면 만 2년 이하인 경우가 최소 19%에서 최대 71%의 비율을 차지하고 있다. 그러나 지금의 신규 간호사 심폐소생술 교육은 이론교육에 의지하고 있어, 실제 상황 발생 시 적절한 역할 수행에 어려움을 겪고 있다. 전문소생술 시뮬레이션 기반 교육은 연차에 상관없이 높은 교육성과를 기대할 수 있어 신규간호사에게 전문소생술을 위한 적절한 교육과 경험을 제공하여 심정지 상황 대응력을 향상시키고자 한다.
문제 분석 (현 수준)	연차에 상관없이 심정지 상황에 대한 경험은 부족하고 그에 따른 부담감이 높으며, 산발적으로 심정지 상황이 발생하고 있으며 실제 상황 발생 시 초기대응 능력 및 실무역량이 저하된다.
핵심지표 및 목표	핵심지표는 신규 간호사의 전문소생술에 대한 수행도로, 현수준 8점/25점이며 현 수준 대비 10점 상승을 목표로 한다.
개선활동	심정지 상황 및 대처 방법에 대한 자료를 제작하고 신규간호사 병동 배치 전 5일 교육 시 이론교육을 시행하고, 신규간호사에게 배치 받은 근무지의 제세동기 위치, 비상시 대비한 인근의 제세동기 위치에 대해 교육한다. 또한, 병실 환경 및 기구 사용법에 대한 교육을 시행한다. 전문소생술 시뮬레이션 교육을 위해 입사 6주차에 사전자료를 배포하며 입사 12주차에 시뮬레이션 교육을 진행한다. 시뮬레이션 교육 시 역할 변경하여 총 3회 진행하며 시뮬레이션 진행 후 즉시 디브리핑을 진행한다.
개선활동의 효과	본 활동의 핵심지표인 신규 간호사의 전문소생술에 대한 수행도는 18점으로 약 10점 상승하여 핵심지표 목표 점수를 달성하였다. 본 활동을 통해 신규 간호사는 임상 판단력이 향상되었으며, 팀 기반 의사소통 및 역량 강화, 시뮬레이션 교육을 통해 응급상황에 대한 간접 경험을 하고, 실제 상황에서도 자신감을 가지고 침착하게 대응할 수 있는 태도를 가지게 되었다.
결론 및 향후 관리방안	전문소생술 시뮬레이션 교육을 통해 신규간호사의 임상 판단력 향상, 팀 기반 의사소통 및 역량 강화, 자기 효능감을 증진 시킴으로써 신규간호사의 응급상황 대응 역량을 강화시켰다고 할 수 있다. 이후에 입사하는 신규간호사를 대상으로 지속적인 전문소생술 시뮬레이션 교육을 진행하고 향후에는 원내 전체 간호사를 대상으로 교육 대상을 확대하여 지속적 교육 체계를 구축함으로써 환자 안전과 응급상황 대응력 향상을 위한 방향으로 발전시킬 수 있도록 한다.