

Mécanisme

Circonstances :

PQRST — Douleur

Provoquée ./ Palliée par

Qualité

Région ./ Irradiation

Sévérité

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Temps

début, durée, évolution

SAMPLE V — Anamnèse

Signes et symptômes

Allergies connues

Médicaments en cours

Passé médical

Last meal

Evénement déclencheur

Vaccins

dernier repas, heure

activité, stress, substances.

MATH F — Antécédents

Maladie

Allergies

Traitement

Hospitalisations récentes

Famille

grossesse, handicap.

X	Hémorragie Compression, garrot	A	Voies aériennes libération des voies aériennes	B	Respiration Regarder, écouter, sentir	C	Circulation Pouls, TRC, pâleur, marbrures	D	Neurologie Conscience (AVPU), pupilles
----------	--	----------	--	----------	---	----------	---	----------	--

RESPIRATION — FARASS

Fréquence A : 12–20, E : 20–30, N : 30–40, NN : 40–60 mvt/min

Amplitude ☐ Profonde ☐ Normale ☐ Superficielle

Régularité ☐ Régulière ☐ Irrégulière

Aspect

SpO₂ N : 94–100 %, IRC : 89–94 %

Symétrie

O₂ tirage, balancement
N : 15 L/min

Masq ☐ MHC (9–15 L/min) ☐ MMC (6–9 L/min) ☐ Lunettes (1–6 L/min)

♥ CIRCULATION — FARATT

Fréquence 60–100 bpm, E : 70–140 bpm, N : 100–160 bpm, NN : 120–160 bpm

Amplitude..... ☐ Bien frappée ☐ Filante

Régula☐ Régulier ☐ Irrégulier ☐ Symétrique ☐ Asymétrique ☐ G ☐ D

Aspect, peau.....

TRC..... pâleur, cyanose, marbrures, froid N : ≤ 2 s

Tension. Artérielle.....

Température..... N : 90–140 systolique | 60–90 mmHg diastolique
méthode, correction | hypo<35, fièvre>37.8, hyper>40°C

NEUROLOGIQUE — OMSPG					
O	rientation	temps, lieu, identité, mémoire			
M	otricité	mouvement spontanée, forcée, sensibilité			
S	ensibilité	touché, douleur, température			
P	upilles	isocorie, réactivité, mydriase (OO), myosis (..)			
G	lasgow	Y(4) + V(5) + M(6) = /15			
G	lycémie	N : 0,8–1,2 g/L 3,3–6,6 mmol/L			
FAST — Suspicion AVC					
F	ace	asymétrie, déviation			
A	rm	faiblesse, paralysie			
S	peech	trouble parole / compréhension			
T	ime	heure début des signes			
Rappel Glasgow					
Yeux (Y)		Verbal (V)		Moteur (M)	
4	Spontanée	5	Orientée	6	Obéit aux ordres
3	À la demande	4	Confuse	5	Orientée
2	À la douleur	3	Inappropriée	4	Évitement
1	Aucune	2	Incompréhensible	3	Flexion anormale
		1	Aucune	2	Extension
				1	Aucune
Rappel EVDA					
E	veil . . . Alert	V	oix . . Verbal	D	ouleur . Pain
				A	réactiveUnresponsive

GESTES EFFECTUÉS				
LVAS ☐ Aspiration mucosités ☐ Canule oropharyngée ☐ Désobstr. (claques) : _____ ☐ Désobstr. (compr. abd.) : _____ ☐ Bascule tête / subluxation	ACR ☐ RCP (compr. thorac.) : _____ ☐ DAE : ____ h ____ Chocs : ____ ☐ Ventil. (insufflateur) : _____ ☐ Ventil. (bouche-à-bouche) ☐ Administration O ₂	TRAUMATISMES ☐ Collier cervical ☐ Maintien tête pos. neutre ☐ Retrait casque ☐ Attelle modulable ☐ Immobilisation écharpes	PLAIES / BRÛLURES ☐ Compression manuelle ☐ Pansement compressif ☐ Garrot : ____ h ____ ☐ Pansement stérile : _____ ☐ Refroidissement (brûlure)	POSITIONS ☐ PLS ☐ Position demi-assise ☐ Allongée ☐ Réchauffement victime ☐ Autre : _____

1 SURVEILLANCE						
Paramètre	Initial	T+5	T+10	T+15	T+20	T+___
FR (bpm)						
SpO ₂ (%)						
Pouls (mpm)						
TA (mmHg)						
TRC (s)						
GCS (/15)						
Pupilles						
Glycémie (g/L mol)						
T° (°C)						