

1 Resultater degenerativ nakke

I Norge drives nakkekirurgi kun ved nevrokirurgiske avdelinger knyttet til de fem universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Troms, samt ved hovedsakelig ett privat sykehus (Oslofjordklinikken). Da der ikke finnes etablerte kvalitetsindikatorer for nakkekirurgi vil dette bli en viktig oppgave for NKR. Da en ny validering av datakvaliteten ikke er fullfrt grunnet uventede databaseproblemer, vises kun et generelt ml p pasient rapporterte tilfredshet (PREM) i rets rapport. I neste rrapport vil NKR presentere sykehusvise kvalitetsdata splittet p diagnose, behandling. Pasienttilfredshet (PREM)

Pasienter som opereres i nakken for degenerative tilstander har armsmerte med eller uten funksjonssvikt (radikulopati), varierende grad av nakkesmerter og noen har ryggmargspvirkning (myelopati). Som hovedregel kan ikke pasienter som opereres p grunn av ryggmargspvirkning pregne bedring i samme grad som de som behandles for armsmerte. Figur 3.21 viser at ogs andelen som opereres for myelopati varierer mellom sykehusene.

Figur 3.21: Andel pasienter som opereres for ryggmargspvirkning (myelopati) ved norske sykehus.