Figurer og tabeller til årsrapport for Norvas 2024

Norvas

6. juni 2025

Diagnose	Følges opp 2024	Ekskludert før 2024	Totalt
Kjempecellearteritt med polymyalgia	1200	194	1394
rheumatica /Annen kjempecellearteritt	1200	134	1004
Granulomatose med polyangiitt (GPA)	632	62	694
Mikroskopisk polyangiitt (MPA)	133	33	166
Uspesifisert arteritt	131	11	142
Takayasus sykdom (Aortabuesyndrom)	123	10	133
Polyarteritt med lungeaffeksjon (EGPA)	101	11	112

Tabell 1: Antall av de inkluderte som har de ulike diagnosene. Totalt og splittet på de som følges opp i 2024 og de som er ekskluderte. Definisjonen på at en pasient følges opp i 2024 er at det ikke er registrert en eksklusjonsdato før 2024

DiagnoseAar	Storkarsvaskulitt (LVV)	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)
2022	121	38
2023	127	47
2024	169	47
Total	417	132

Tabell 2: Oversikt over antall nysyke pasienter med AAV og LVV. Nysyke er definert ved at pasienten enten er registrert som Inkludert med ny diagnose eller at det er 30 dager eller mindre mellom inklusjonsdato og diagnosedato (så fremt pasienten ikke er registrert som inkludert med etablert diagnose).

Sykehusnavn	2022.etablert	2022.nysyk	2023.etablert	2023.nysyk	2024.etablert	2024.nysyk
Betanien	3	14	4	8	0	12
Drammen	1	19	1	11	1	7
Haugesund	1	7	1	5	3	4
Haukeland	13	17	5	12	2	14
Helgelandssykehuset	1	1	0	0	2	0
Kristiansand	8	3	5	20	3	17
Levanger	1	3	0	3	0	3
Lillehammer	12	8	3	12	4	21
Martina Hansen	8	9	5	11	5	22
Moss	13	4	6	9	2	8
Nordlandsykehuset	5	1	4	6	3	9
Rikshospitalet	17	10	27	4	20	12
St. Olavs	2	4	18	5	8	5
Stavanger	2	5	3	1	6	10
UNN	10	10	1	14	10	17
Ålesund	1	4	2	6	12	8
Førde	0	2	0	0	0	0
Total	98	121	85	127	81	169


Tabell 3: Oversikt over antall nysyke og pasienter med etablert diagnose med LVV. Nysyke er definert ved at pasienten enten er registrert som Inkludert med ny diagnose eller at det er 30 dager eller mindre mellom inklusjonsdato og diagnosedato (så fremt pasienten ikke er registrert som inkludert med etablert diagnose). År angir diagnoseår.

Sykehusnavn	2022.etablert	2022.nysyk	2023.etablert	2023.nysyk	2024.etablert	2024.nysyk
Betanien	1	0	0	4	2	1
Drammen	1	3	0	2	0	1
Haukeland	2	3	1	2	0	3
Kristiansand	1	2	0	4	1	4
Lillehammer	2	5	0	4	0	4
Martina Hansen	2	1	1	1	0	3
Moss	1	3	0	1	1	0
Nordlandsykehuset	1	2	0	4	2	3
Rikshospitalet	15	6	13	6	9	8
Stavanger	1	1	2	0	1	2
Ålesund	1	2	0	3	27	3
St. Olavs	0	3	11	5	3	3
UNN	0	7	2	10	0	4
Haugesund	0	0	1	1	0	3
Levanger	0	0	0	0	0	5
Total	28	38	31	47	46	47


Tabell 4: Oversikt over antall nysyke og pasienter med etablert diagnose med AAV. Nysyke er definert ved at pasienten enten er registrert som Inkludert med ny diagnose eller at det er 30 dager eller mindre mellom inklusjonsdato og diagnosedato (så fremt pasienten ikke er registrert som inkludert med etablert diagnose). År angir diagnoseår.

Diagnose	[16,26)	[26,36)	[36,46)	[46,56)	[56,66)	[66,76)	[76,140]	N
Granulomatose med polyangiitt (GPA)	4.9 %	6.9 %	8.6 %	13.7 %	20.9 %	27.8 %	17.1 %	694
Kjempecellearteritt med polymyalgia rheumatica /Annen kjempecellearteritt	0.0 %	0.1 %	0.1 %	1.8 %	17.6 %	45.3~%	35.2~%	1394
Mikroskopisk polyangiitt (MPA)	3.6~%	3.6~%	4.2~%	6.6~%	18.7 %	34.3~%	28.9~%	166
Polyarteritt med lungeaffeksjon (EGPA)	2.7~%	7.1 %	8.9 %	19.6~%	20.5~%	22.3~%	18.8 %	112
Takayasus sykdom (Aortabuesyndrom)	10.5~%	16.5~%	15.0 %	17.3~%	18.8 %	17.3~%	4.5~%	133
Uspesifisert arteritt	0.7~%	0.0~%	1.4~%	7.7~%	32.4~%	38.0~%	19.7~%	142


Tabell 5: Aldersfordeling ved diagnosetidspunkt. T.o.m. 2024




Figur 1: Diagnoser i Norvas blant de som følges opp og blant de ekskluderte




Figur 2: Alder ved diagnose, diagnosegruppe 1




Figur 3: Alder ved diagnose, diagnosegruppe 2




Figur 4: Kjønnsfordeling etter diagnose



Figur 5: Sykdomsvurdering



Figur 6: Sykdomsvurdering 2024, gruppe 1




Figur 7: Sykdomsvurdering 2024, gruppe 2

Sykehusnavn	T.o.m. 2023	2024
UNN	322	40
Haukeland	277	26
Rikshospitalet	235	59
Lillehammer	204	33
Kristiansand	145	33
Betanien	159	17
Drammen	151	10
Martina Hansen	118	35
St. Olavs	119	22
Haugesund	120	12
Ålesund	114	13
Nordlandsykehuset	81	23
Moss	79	17
Levanger	41	8
Stavanger	26	18
Førde	31	0
Helgelandssykehuset	4	2


Tabell 6: Antall inklusjoner pr. HF

Sykehusnavn	T.o.m. 2023	2024
UNN	2307	422
Lillehammer	1261	281
Haukeland	1103	200
Haugesund	806	158
Drammen	726	169
St. Olavs	697	109
Betanien	508	67
Kristiansand	375	197
Ålesund	430	73
Nordlandsykehuset	267	66
Rikshospitalet	204	83
Martina Hansen	152	96
Førde	181	0
Moss	133	46
Levanger	119	32
Stavanger	61	43
Helgelandssykehuset	14	3


Tabell 7: Antall oppfølginger pr. HF




Figur 8: Antall inklusjoner per HF.



Figur 9: Antall inklusjoner per HF og per diagnosegruppe. T.o.m. 2024



Figur 10: Antall inklusjoner per HF og per diagnosegruppe splittet på nysyke og de som er inkludert med etablert diagnose. T.o.m. 2024



Figur 11: Antall inklusjoner per HF og per diagnose. T.o.m. $2024\,$

Sykehusnavn	Granulomato-	Kjempecellear-	Mikroskopisk	Polyarteritt	Takayasus	Uspesifisert	Total
	se med	teritt med	polyangiitt	med	sykdom	arteritt	
	polyangiitt	polymyalgia	(MPA)	lungeaffeksjon	(Aortabuesyn-		
	(GPA)	rheumatica		(EGPA)	drom)		
		/Annen kjem-					
		pecellearteritt					
UNN	105	170	39	16	21	11	362
Haukeland	83	164	9	13	23	14	303
Rikshospitalet	92	124	21	24	27	9	294
Lillehammer	26	137	7	11	6	17	237
Kristiansand	48	101	12	9	6	2	178
Betanien	38	29	16	4	12	39	176
Drammen	47	78	7	∞	2	19	161
Martina Hansen	6	134	9	1	2	T	153
St. Olavs	39	20	2	∞	12	7	141
Haugesund	35	83	7	1		20	132
$ m \AA lesund$	43	48	14	12		6	127
Nordlandsykehuset	39	49	6	က	4	0	104
Moss	23	29	2	1	2	1	96
Levanger	15	20	∞	2	0	4	49
Stavanger	10	25	9	0	2		44
Førde	∞	19	0	1	3	0	31
Helgelandssykehuset	0	2	0	0	0	T	9
Nasjonalt	069	1361	165	111	130	137	2594

Tabell 8: Antall inklusjoner pr. HF og pr. diagnose t.o.m 2024


Sykehusnavn	LVV, nysyk	LVV, nysyk LVV, etablert	ANCA, nysyk	ANCA,	Total
		diagnose		etablert	
				$_{ m diagnose}$	
UNN	111	91	29	93	362
Haukeland	73	128	25	2.2	303
Rikshospitalet	45	112	30	107	294
Lillehammer	74	89	20	54	237
Kristiansand	47	65	16	20	178
Betanien	74	44	17	41	176
Drammen	70	29	21	41	161
Martina Hansen	78	59	4	12	153
St. Olavs	37	52	23	29	141
Haugesund	48	41	15	28	132
$ m \AA lesund$	27	31	14	22	127
Nordlandsykehuset	24	29	25	26	104
Moss	30	40	7	19	96
Levanger	19	ಬ	11	14	49
Stavanger	18	10	10	9	44
Førde	9	16	0	6	31
Helgelandssykehuset	1	ಬ	0	0	9
Nasjonalt	782	846	305	661	2594

Tabell 9: Antall inklusjoner pr. HF og pr. diagnosegruppe og nysykstatus t.o.m 2024

Antall oppfølginger pr. HF UNN Lillehammer Haukeland Haugesund St. Olavs Betanien Kristiansand Ålesund Nordlandsykehuset Rikshospitalet Martina Hansen Førde Moss Levanger Stavanger T.o.m. 2023, N=93442024, N=2045 Helgelandssykehuset 500 1000 1500 2000 2500 Antall pasienter


Figur 12: Antall oppfølginger per HF.

Andel pasienter som har brukt/bruker legemidler




Figur 13: Andel pasienter på de forskjellige medisingruppene t.o.m. 2023 og i løpet av 2024. For å telles som å være på en medisin i første gruppen skal medisinskjemaet ha registrert medisinering med startdato før 2024 for gitt medisin. Nevneren er antall unike pasienter som finnes i inklusjonskjema, oppfølgingsskjema eller medisineringsskjema før 2024. For å telles som å være på medisin i 2024-gruppen skal medisinskjemaet ha en medisinering med startdato i løpet av 2024 eller før, OG enten sluttdato i 2024 eller seinere ELLER ingen sluttdato. Nevneren er antall unike pasienter som finnes i inklusjonskjema eller oppfølgingsskjema med henholdsvis inklusjonsdato eller oppfølgingsdato i 2024, i tillegg til alle som har en medisinering med startdato i løpet av 2024 eller før, OG enten sluttdato i 2024 eller seinere ELLER ingen sluttdato. MERK: Vi mangler per nå en måte å fjerne pasienter som ikke finnes i registeret etter en viss dato.


Andel pasienter som har brukt/bruker legemidler




Figur 14: Utvalg som i Figur 13




Figur 15: Utvalg som i Figur 13 for 2024.




Figur 16: Utvalg som i Figur 13 for 2024.



Figur 17: Utvalg som i Figur 13 for 2024.




Figur 18: Utvalg som i Figur 13 for 2024.



Figur 19: Utvalg som i Figur 13 for 2024.

Medikamentbruk ved ANCA-assosierte vaskulitter



Figur 20: Utvalg som i Figur 13 for 2024.

Sykehusnavn	Storkarsvaskulitt (LVV)	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)
Betanien	0.3 (103)	0.5 (53)
Drammen	1.0 (90)	0.9 (59)
Førde	0.0(22)	0.0(9)
Haugesund	1.0 (79)	1.4 (36)
Haukeland	0.6 (175)	0.8 (99)
Helgelandssykehuset	0.8 (4)	
Kristiansand	1.3(74)	0.7(53)
Levanger	0.3(21)	0.7 (19)
Lillehammer	1.1 (129)	1.5 (67)
Martina Hansen	0.4 (102)	1.2 (14)
Moss	0.4(53)	0.4(25)
Nordlandsykehuset	0.6(33)	0.8 (40)
Rikshospitalet	0.2(122)	0.4 (112)
St. Olavs	0.4 (70)	0.3(46)
Stavanger	0.6 (14)	1.0 (12)
UNN	1.1 (152)	1.3 (148)
Ålesund	0.3 (45)	0.8(63)
Total	0.7(1288)	0.9 (855)

Tabell 10: Gjennomsnittlig antall oppfølginger per pasient. Tallene i parantes angir antall pasienter aktuell for oppfølging, dvs. inkludert før 2024

Sykehusnavn	Storkarsvaskulitt (LVV)	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)
Betanien	0.3 (98)	0.5 (51)
Drammen	1.1 (74)	0.9(53)
Førde	0.0(22)	0.0(9)
Haugesund	1.5 (52)	1.8 (28)
Haukeland	0.6(172)	0.9 (98)
Helgelandssykehuset	1.0 (3)	
Kristiansand	1.4 (66)	1.1 (35)
Levanger	0.3 (20)	0.8 (18)
Lillehammer	1.9 (77)	1.6 (63)
Martina Hansen	0.4 (101)	1.2(14)
Moss	0.4 (52)	0.4(25)
Nordlandsykehuset	0.6(33)	0.8(38)
Rikshospitalet	0.2(122)	0.4 (111)
St. Olavs	0.4 (68)	0.3(43)
Stavanger	0.6(14)	1.0 (12)
UNN	1.7 (96)	1.8 (104)
Ålesund	0.3(38)	0.8 (59)

Tabell 11: Gjennomsnittlig antall oppfølginger per pasient. Tallene i parantes angir antall pasienter aktuell for oppfølging, dvs. inkludert før 2024 og ikke ekskludert innen 2024


Sykehusnavn	2023	2024	2022
Lillehammer	64.4% (118)	55.7% (140)	56.2% (105)
UNN	37.5% (184)	57% (200)	26.7% (180)
Haugesund	57% (79)	48.8% (80)	46.6% (73)
Moss	24.5% (49)	9.1% (77)	50% (26)
Stavanger	20% (20)	23.1% (26)	50% (10)
Helgelandssykehuset	50% (2)	33.3% (3)	0% (1)
Ålesund	43.9% (82)	17.5% (97)	34.9% (63)
Kristiansand	29.1% (55)	34.7% (101)	24.1% (54)
Betanien	22% (132)	7.4% (149)	33.9% (115)
Drammen	31.1% (119)	29.9% (127)	19.6% (102)
Haukeland	26% (242)	17.4% (270)	25% (200)
Førde	3.2% (31)	0% (31)	21.4% (28)
St. Olavs	4.2% (95)	9.9% (111)	21.2% (85)
Nordlandsykehuset	14.3% (56)	16.9% (71)	17.6% (51)
Martina Hansen	7.7% (91)	14.8% (115)	12.3% (73)
Levanger	14.3% (35)	13.2% (38)	6.5% (31)
Rikshospitalet	6.7% (178)	4.3% (233)	8% (137)

Tabell 12: Andel aktuelle for oppfølging i 2024 med minimum 2 oppfølginger.

Diagnosegruppe	2020	2021	2022	2023	2024
Storkarsvaskulitt (LVV)	75	149	113	126	172
ANCA assosiert vaskulitt (AAV)	35	52	39	49	47

Tabell 13: Antall nysyke siste 5 år t.o.m. 2024. Nysyke er definert som pasienter som har InkludertNyEtablertDiagnose = 1. Dersom InkludertNyEtablertDiagnose ikke er utfylt telles pasienter med Diagnose_Klinisk_Dato og InklusjonDato innenfor plussminus 30 dager som nysyke.

Andelen med minimum 2 oppfølginger pr. år



Figur 21: 2024

Andel oppfølging	N
93.8	48
92.3	104
92.3	39
91.7	60
87.5	24
85.0	20
82.9	210
80.8	52
78.7	89
75.0	20
73.8	61
72.9	48
58.1	31
54.5	11
48.0	25
81.6	842
	93.8 92.3 92.3 91.7 87.5 85.0 82.9 80.8 78.7 75.0 73.8 72.9 58.1 54.5 48.0

Tabell 14: Andel med utført BVAS ved oppfølging i 2024, ANCA-assosierte vaskulitter

Sykehusnavn	2022	2023	2024
Betanien	62.5% (64)	53.2% (47)	48.0% (25)
Haukeland	77.8% (90)	80.6% (93)	78.7% (89)
St. Olavs	10.9% (46)	28.6% (21)	58.1% (31)
Nordlandsykehuset	86.8% (38)	81.0% (42)	92.3% (39)
Kristiansand	82.5% (40)	72.9% (59)	72.9% (48)
Lillehammer	94.7% (132)	94.9% (138)	92.3% (104)
Moss	71.9% (32)	77.3% (22)	54.5% (11)
Ålesund	80.0% (75)	89.9% (138)	80.8% (52)
Martina Hansen	100.0% (6)	80.0% (10)	85.0% (20)
Drammen	71.0% (62)	67.6% (68)	73.8% (61)
UNN	98.4% (124)	91.0% (166)	82.9% (210)
Stavanger	70.6% (17)	64.3% (14)	75.0% (20)
Rikshospitalet	86.4% (22)	92.0% (25)	93.8% (48)
Haugesund	82.7% (52)	81.6% (49)	91.7% (60)
Levanger	91.7% (12)	90.0% (10)	87.5% (24)
Førde	0.0% (6)	N < 5	
Total	79.0% (818)	81.9% (905)	81.6% (842)

Tabell 15: Andel med utført BVAS ved oppfølging

- C 1 1	4 1 1 6 1 1	
Sykehusnavn	Andel oppfølging	N
Haugesund	91.7	60
Lillehammer	90.4	104
Rikshospitalet	85.4	48
UNN	81.4	210
Nordlandsykehuset	79.5	39
Ålesund	71.2	52
Drammen	70.5	61
Kristiansand	62.5	48
Haukeland	60.7	89
Levanger	54.2	24
Martina Hansen	45.0	20
Betanien	44.0	25
Moss	36.4	11
St. Olavs	19.4	31
Stavanger	10.0	20
Total	71.4	842

Tabell 16: Andel oppfølgingskjema med utfylt VDI-skjema i 2024, ANCA-assosierte vaskulitter

Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Haukeland	60.3% (78)	58.6% (87)	63.3% (90)	66.7% (93)	60.7% (89)
St. Olavs	39.1% (69)	42.6% (68)	45.7% (46)	19.0% (21)	19.4% (31)
Kristiansand	41.0% (39)	53.6% (28)	60.0% (40)	54.2% (59)	62.5% (48)
Lillehammer	88.0% (50)	93.2% (74)	93.9% (132)	92.8% (138)	90.4% (104)
Nordlandsykehuset	82.1% (28)	92.0% (25)	86.8% (38)	71.4% (42)	79.5% (39)
Drammen	81.4% (43)	81.4% (59)	74.2% (62)	66.2% (68)	70.5% (61)
Ålesund	81.1% (37)	82.6% (69)	69.3% (75)	76.8% (138)	71.2% (52)
UNN	94.9% (137)	86.7% (188)	94.4% (124)	86.1% (166)	81.4% (210)
Haugesund	78.9% (57)	84.2% (57)	80.8% (52)	81.6% (49)	91.7% (60)
Levanger	52.2% (23)	52.0% (25)	66.7% (12)	80.0% (10)	54.2% (24)
Betanien	48.6% (37)	60.6% (66)	60.9% (64)	44.7% (47)	44.0% (25)
Rikshospitalet	50.0% (6)	16.7% (18)	9.1% (22)	68.0% (25)	85.4% (48)
Martina Hansen	N < 5	40.0% (5)	66.7% (6)	70.0% (10)	45.0% (20)
Førde	60.0% (5)	40.0% (5)	0.0% (6)	N < 5	
Total	71.0% (610)	72.4% (791)	72.4% (818)	73.0% (905)	71.4% (842)
Stavanger		50.0% (12)	5.9% (17)	21.4% (14)	10.0% (20)
Moss		80.0% (5)	68.8% (32)	68.2% (22)	36.4% (11)


Tabell 17: Andel oppfølgingskjema med utfylt VDI-skjema for ANCA-assosierte vaskulitter

Sykehusnavn	Andel oppfølging	N
Rikshospitalet	94.3	35
Lillehammer	89.8	177
Haugesund	87.8	98
Nordlandsykehuset	77.8	27
Martina Hansen	77.6	76
Kristiansand	76.5	149
Drammen	67.6	108
UNN	67.5	212
Haukeland	57.7	111
Moss	54.3	35
Stavanger	47.8	23
Betanien	47.6	42
St. Olavs	25.6	78
Ålesund	19.0	21
Levanger	0.0	8
Helgelandssykehuset	N < 5	3
Total	68.7	1203

Tabell 18: Andel med utført Kerrs ved oppfølging i 2024, gr. 1


Sykehusnavn	2022	2023	2024
Haugesund	79.6% (98)	80.8% (104)	87.8% (98)
Haukeland	80.4% (143)	68.1% (141)	57.7% (111)
UNN	86.3% (102)	81.8% (121)	67.5% (212)
Drammen	68.8% (93)	64.0% (114)	67.6% (108)
Moss	75.0% (32)	59.0% (39)	54.3% (35)
Lillehammer	91.0% (167)	92.0% (187)	89.8% (177)
Kristiansand	47.8% (23)	71.3% (108)	76.5% (149)
Rikshospitalet	95.1% (41)	91.8% (49)	94.3% (35)
St. Olavs	59.1% (44)	37.2% (43)	25.6% (78)
Ålesund	0.0% (27)	0.0% (32)	19.0% (21)
Betanien	53.3% (90)	40.6% (64)	47.6% (42)
Nordlandsykehuset	100.0% (7)	80.0% (15)	77.8% (27)
Martina Hansen	51.3% (39)	57.5% (40)	77.6% (76)
Stavanger	66.7% (6)	27.3% (11)	47.8% (23)
Førde	0.0% (24)	20.0% (5)	
Levanger	0.0% (8)	N < 5	0.0% (8)
Helgelandssykehuset	N < 5	40.0% (5)	N < 5
Total	71.6% (946)	$69.5\% \ (1082)$	$68.7\% \ (1203)$

Tabell 19: Andel med utført KERRS ved oppfølging




Figur 22

Andel oppfølginger med utfylt BVAS for ANCA-assosierte vaskulitter




Figur 23

Andel oppfølginger med utfylt VDI for ANCA-assosierte vaskulitter




 ${\rm Figur}~24$

Andel oppfølginger med utfylt VDI for ANCA-assosierte vaskulitter



Figur 25


Andel med utført Kerrs ved oppfølging for storkarsvaskulitter



 $Figur\ 26$


	Sykehusnavn	2022	2023	2024
1	Haugesund	N<5	N<5	100.0 (N=6)
2	Lillehammer	100.0 (N=11)	100.0 (N=6)	100.0 (N=6)
3	Martina Hansen	N < 5	N < 5	N < 5
4	Nordlandsykehuset	N < 5	N < 5	100.0 (N=7)
5	Moss	75.0 (N=8)	60.0 (N=5)	N < 5
6	UNN	100.0 (N=6)	100.0 (N=12)	83.3 (N=6)
7	Levanger			80.0 (N=5)
8	Stavanger	N < 5	N < 5	N < 5
9	Kristiansand	N < 5	50.0 (N=8)	66.7 (N=6)
10	Total	78.6 (N=84)	65.2 (N=89)	61.6 (N=86)
11	Drammen	100.0 (N=5)	N < 5	N < 5
12	Rikshospitalet	64.7 (N=17)	66.7 (N=24)	45.8 (N=24)
13	Haukeland	81.8 (N=11)	20.0 (N=5)	N < 5
14	Ålesund	75.0 (N=8)	83.3 (N=6)	N < 5
15	Betanien	N < 5	N < 5	20.0 (N=5)
16	St. Olavs	N < 5	0.0 (N=6)	$0.0 \ (N=6)$
_17	Førde	N<5		

Tabell 20: Andel ANCA test ved debut av ANCA-assosiert vaskulitt etter inklusjonsår. Nevner: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt inkludert gjeldende år. Teller: Pasienter som har et labskjema tilknyttet inklusjonsskjema som har utfylt enten PR3AncaPositiv eller MPO_AncaPositiv



Figur 27: Andel ANCA test ved debut av ANCA-assosiert vaskulitt. Nevner: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt. Teller: Pasienter som har et labskjema tilknyttet inklusjonsskjema som har utfylt enten PR3AncaPositiv eller MPO_AncaPositiv. Gjelder for pasienter inkludert t.o.m. 2024.

Andel med utført ANCA-test ved debut for ANCA-assosierte vaskulitter




Figur 28: Andel ANCA test ved debut av ANCA-assosiert vaskulitt. Nevner: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt. Teller: Pasienter som har et labskjema tilknyttet inklusjonsskjema som har utfylt enten PR3AncaPositiv eller MPO_AncaPositiv. Gjelder for pasienter inkludert fra 2022 til 2024.

Sykehusnavn	Andel	N
Betanien	77.8	9
Drammen	57.1	7
Førde	100.0	1
Haugesund	41.7	12
Haukeland	60.0	15
Kristiansand	68.2	22
Levanger	60.0	5
Lillehammer	64.7	17
Martina Hansen	50.0	4
Moss	60.0	5
Nordlandsykehuset	80.0	10
Rikshospitalet	66.7	6
St. Olavs	50.0	8
Stavanger	33.3	6
UNN	63.6	66
Ålesund	85.7	7
Total	63.0	200

Tabell 21: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra BVAS for ANCA-assosiert vaskulitter t.o.m. 2024. Kun pasienter som har utfylt BVAS ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.


Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Betanien	N<5	N<5	N<5	N<5	
Drammen		N < 5	N < 5		N < 5
Førde		N<5			
Haugesund	N < 5	N < 5		N < 5	
Haukeland	N < 5	N < 5	N < 5		N < 5
Kristiansand	N < 5	N < 5	N < 5	N < 5	N < 5
Levanger		N < 5			N < 5
Lillehammer		50.0% (6)	N < 5	N<5	N < 5
Martina Hansen				N < 5	N < 5
Moss		N<5	N < 5		
Nordlandsykehuset		N < 5	N < 5	N<5	N < 5
Rikshospitalet		N<5	N < 5	N<5	N < 5
St. Olavs	N < 5			N<5	N < 5
Stavanger	N < 5	N<5		N<5	N < 5
UNN	N < 5	66.7% (6)	N < 5	N<5	N < 5
Ålesund	N < 5	N < 5			N < 5
Total	70.6% (17)	61.3% (31)	52.9% (17)	63.6% (22)	90.5% (21)

Tabell 22: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra BVAS for ANCA-assosiert vaskulitter. Kun pasienter som har utfylt BVAS ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.



Figur 29: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som er i remisjon 6 m
ndr etter debut. Nevner: Alle med ANCA-assosiert vaskulitt som har et utfylt BVAS-skjema 6 m
nd \pm 4 uker etter diagnosedato. Gjelder alle med diagnosedato t.o.m. 2024

Andel i remisjon innen 6 måneder ut fra BVAS for ANCA-assosierte vaskulitter




Figur 30: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som er i remisjon 6 mndr, per år.

Sykehusnavn	Andel	N
Betanien	83.3	18
Drammen	65.5	29
Førde	0.0	4
Haugesund	47.8	23
Haukeland	80.5	41
Helgelandssykehuset	100.0	2
Kristiansand	75.0	20
Levanger	0.0	3
Lillehammer	50.9	55
Martina Hansen	87.5	16
Moss	73.3	15
Nordlandsykehuset	55.6	9
Rikshospitalet	100.0	13
St. Olavs	54.5	11
Stavanger	66.7	3
UNN	54.5	33
Ålesund	0.0	4
Total	64.2	299


Tabell 23: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra KERR for storkarsvaskulitter t.o.m. 2024. Kun pasienter som har utfylt KERR ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.

Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Betanien	66.7% (6)	100.0% (6)	N<5	N<5	N<5
Drammen	N < 5	80.0% (5)	85.7% (7)	N < 5	N<5
Haugesund	N < 5	N < 5	N < 5	N < 5	N<5
Haukeland	N < 5	93.3% (15)	100.0% (13)	N < 5	N < 5
Helgelandssykehuset			N < 5		
Kristiansand		N < 5	N < 5	100.0% (7)	71.4% (7)
Levanger	N < 5		N < 5		
Lillehammer	75.0% (8)	100.0% (5)	62.5% (8)	75.0% (8)	60.0% (10)
Martina Hansen		N < 5	N < 5	N < 5	100.0% (9)
Moss		100.0% (5)	N < 5	60.0% (5)	N < 5
Nordlandsykehuset		N < 5		N < 5	N < 5
Rikshospitalet	N < 5	N < 5		N < 5	100.0% (5)
St. Olavs	N < 5	N < 5		N < 5	N < 5
Stavanger		N < 5		N < 5	N < 5
UNN	N < 5	100.0% (6)	N < 5	N < 5	83.3% (6)
Ålesund	N < 5	N < 5	N < 5		
Total	67.9% (28)	87.7% (57)	78.7% (47)	86.4% (44)	86.0% (50)

Tabell 24: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra KERR for storkarsvaskulitter. Kun pasienter som har utfylt KERR ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.



Figur 31: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som er i remisjon 6 m
ndr etter debut, basert på Kerrs. Gjelder alle diagnosedato t.o.m.
 $2024\,$



Figur 32: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som er i remisjon 6 mndr, per år.

Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Haugesund	N<5				
Kristiansand	N < 5			N<5	
UNN	N < 5	N < 5			
St. Olavs	N < 5		N < 5	N < 5	
Ålesund	N < 5	N < 5			
Betanien	N < 5	N < 5		N < 5	
Stavanger	N < 5				
Total	60.0% (10)	91.7% (12)	N < 5	83.3% (6)	N < 5
Rikshospitalet		N < 5	N < 5		N < 5
Nordlandsykehuset		N < 5			
Lillehammer		N < 5	N < 5	N < 5	
Levanger		N < 5			
Drammen		N < 5			

Tabell 25: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt på Prednisolon $\leq 5 \mathrm{mg}$ 6 måneder etter debut

Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Betanien	50.0% (6)	14.3% (7)	N<5	N<5	N<5
Drammen		20.0% (5)	N < 5	N < 5	N < 5
Førde	N < 5	N < 5			
Haugesund	N < 5	N < 5		N < 5	N < 5
Haukeland	18.2% (11)	28.6% (7)	40.0% (5)	N < 5	N < 5
Kristiansand	16.7% (6)	N < 5	N < 5	N < 5	60.0% (5)
Levanger		N < 5			40.0% (5)
Lillehammer		33.3% (12)	42.9% (7)	N < 5	N < 5
Martina Hansen			N < 5	N < 5	N < 5
Moss	N < 5	80.0% (5)	N < 5	N < 5	N < 5
Nordlandsykehuset	N < 5	N < 5	N < 5	N < 5	40.0% (5)
Rikshospitalet	0.0% (10)	7.1% (28)	4.8% (21)	5.3% (19)	5.9% (17)
St. Olavs	N < 5		N < 5	12.5% (16)	16.7% (6)
Stavanger	N < 5	42.9% (7)	N < 5	N < 5	N < 5
UNN	30.0% (10)	55.6% (9)	42.9% (7)	41.7% (12)	N < 5
Ålesund	33.3% (6)	40.0% (5)	N < 5	N < 5	0.0% (30)
Total	23.0% (61)	28.9% (97)	25.8% (66)	26.9% (78)	17.2% (93)

Tabell 26: Andel pasienter med ANCA med utfylt oppfølgingsskjema 6m
nd. plusminus 4 uker etter diagnosedato


Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Kristiansand	N<5		N<5	40.0% (5)	
St. Olavs	N < 5	N < 5	N < 5		N < 5
Drammen	N < 5	60.0% (5)	N < 5	N < 5	
Levanger	N < 5		N < 5		
Haugesund	N < 5	N < 5	N < 5	N < 5	
Lillehammer	28.6% (7)	50.0% (6)	N < 5	37.5% (8)	
Haukeland	N < 5	40.0% (10)	N < 5	N < 5	
Ålesund	N < 5		N < 5		
Betanien	42.9% (7)	N < 5		N < 5	
Moss	N < 5	N < 5	N < 5	N < 5	
Rikshospitalet	N < 5	N < 5	N < 5	N < 5	40.0% (5)
UNN	N < 5	66.7% (9)	N < 5	N < 5	
Total	61.0% (41)	44.7% (47)	64.7% (17)	48.6% (35)	50.0% (6)
Martina Hansen		40.0% (5)		N < 5	
Nordlandsykehuset		N < 5		N < 5	
Stavanger				N<5	

Tabell 27: Andel pasienter med storkarsvaskulitt på Prednisolon $\leq 7.5 \mathrm{mg}$ 6 måneder etter debut

Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Betanien	40.9% (22)	26.9% (26)	5.9% (17)	16.7% (12)	8.3% (12)
Drammen	16.7% (6)	25.0% (16)	35.0% (20)	33.3% (12)	37.5% (8)
Førde		N < 5	N < 5		
Haugesund	18.8% (16)	36.4% (11)	50.0% (8)	16.7% (6)	42.9% (7)
Haukeland	10.5% (19)	38.9% (36)	36.7% (30)	29.4% (17)	12.5% (16)
Helgelandssykehuset			N < 5		N < 5
Kristiansand	0.0% (11)	0.0% (17)	27.3% (11)	40.0% (25)	40.0% (20)
Levanger	40.0% (5)	0.0% (6)	N < 5	N < 5	N < 5
Lillehammer	39.1% (23)	42.9% (14)	35.0% (20)	46.7% (15)	36.0% (25)
Martina Hansen	0.0% (9)	13.0% (23)	11.8% (17)	6.2% (16)	25.9% (27)
Moss	0.0% (8)	18.8% (16)	23.5% (17)	13.3% (15)	10.0% (10)
Nordlandsykehuset	N < 5	0.0% (10)	0.0% (6)	10.0% (10)	8.3% (12)
Rikshospitalet	8.7% (23)	6.7% (30)	3.7% (27)	12.9% (31)	0.0% (32)
St. Olavs	N < 5	40.0% (10)	0.0% (6)	17.4% (23)	30.8% (13)
Stavanger	N < 5	N < 5	14.3% (7)	N < 5	18.8% (16)
UNN	10.0% (10)	27.3% (22)	5.0% (20)	40.0% (15)	22.2% (27)
Ålesund	N < 5	12.5% (8)	20.0% (5)	37.5% (8)	0.0% (20)
Total	18.9% (164)	22.1% (249)	21.0% (219)	24.5% (212)	19.2% (250)

Tabell 28: Andel pasienter med storkarsvaskulitt med utfylt oppfølgingsskjema 6mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato


Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt på Prednisolon <= 5mg 6 måneder etter debut



Figur 33: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt på Prednisolon ≤ 5 mg 6 måneder etter debut. Gjelder alle år t.o.m. 2024.

Utvalg: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som har en registrering av prednisolon 6 måneder \pm 4 uker etter diagnosedato.

Andel pasienter med storkarsvaskulitt på Prednisolon <= 7.5mg 6 måneder etter debut



Figur 34: Andel pasienter med storkarsvaskulitt på Prednisolon $\leq 7.5 \text{mg}$ 6 måneder etter debut. Gjelder alle år t.o.m. 2024.


Utvalg: Pasienter som har en registrering av prednisolon \pm 4 uker av 6 måneder etter diagnosedato.


Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Betanien	12.5% (32)	10.5% (38)	11.1% (27)	13.6% (22)	6.7% (15)
Drammen	2.9% (35)	11.4% (35)	5.4% (37)	2.9% (34)	10.5% (38)
Førde	$\dot{N} < \dot{5}$	$\hat{N} < \hat{5}$	$\hat{N} < \hat{5}$	` '	` '
Haugesund	3.6% (28)	6.9% (29)	3.7% (27)	3.6% (28)	5.9% (34)
Haukeland	4.2% (48)	4.1% (49)	1.7% (59)	8.3% (48)	8.0% (50)
Kristiansand	11.5% (26)	8.7% (23)	7.7% (26)	7.1% (28)	0.0% (23)
Levanger	25.0% (12)	6.2% (16)	0.0% (9)	0.0% (6)	9.1% (11)
Lillehammer	14.7% (34)	5.0% (40)	14.5% (55)	8.6% (58)	5.3% (57)
Martina Hansen	N < 5	N < 5	16.7% (6)	N < 5	12.5% (8)
Moss	N < 5	25.0% (12)	33.3% (18)	25.0% (12)	0.0% (5)
Nordlandsykehuset	14.3% (21)	4.8% (21)	8.3% (24)	4.0% (25)	18.5% (27)
Rikshospitalet	15.8% (19)	10.9% (55)	17.2% (29)	5.9% (34)	4.9% (61)
St. Olavs	0.0% (25)	0.0% (25)	0.0% (23)	14.3% (21)	11.5% (26)
Stavanger	N < 5	12.5% (8)	22.2% (9)	0.0% (9)	20.0% (10)
UNN	5.4% (93)	9.2% (98)	11.4% (88)	3.1% (96)	4.1% (97)
Ålesund	12.1% (33)	10.6%~(47)	10.8% (37)	13.3% (45)	6.7% (30)
Total	8.7% (415)	8.6%~(502)	9.9% (475)	7.2% (470)	7.1% (492)

Tabell 29: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt med lett eller alvorlig residiv

Carlandaramaran	2020	2021	2022	2022	2024
Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Betanien	12.5% (32)	7.3% (55)	4.4% (45)	3.0% (33)	7.1% (28)
Drammen	0.0% (24)	5.4% (37)	6.5% (46)	10.7% (56)	8.9% (45)
Førde	0.0% (9)	0.0% (6)	N < 5	N < 5	
Haugesund	4.7% (43)	4.3% (47)	6.1% (49)	6.4% (47)	9.5% (42)
Haukeland	11.9% (42)	9.8% (61)	4.7% (86)	12.5% (72)	10.3% (58)
Helgelandssykehuset	N < 5		N < 5	N < 5	N < 5
Kristiansand	0.0% (7)	12.5% (24)	5.6% (18)	15.1% (53)	14.5% (69)
Levanger	0.0% (5)	0.0% (12)	0.0% (9)	N < 5	0.0% (5)
Lillehammer	9.4% (64)	22.7% (66)	14.1% (71)	25.0% (76)	17.5% (80)
Martina Hansen	N < 5	16.0% (25)	8.7% (23)	27.3% (33)	15.7% (51)
Moss	16.7% (6)	5.9% (17)	12.9% (31)	14.7% (34)	3.7% (27)
Nordlandsykehuset	30.8% (13)	12.5% (16)	22.2% (9)	16.7% (18)	14.8% (27)
Rikshospitalet	4.8% (21)	13.7% (51)	22.5% (40)	27.1% (48)	15.1% (53)
St. Olavs	8.3% (24)	9.1% (33)	13.6% (22)	0.0% (18)	16.7% (18)
Stavanger	N < 5	N < 5	12.5% (8)	0.0% (5)	10.0% (10)
UNN	7.0% (71)	11.5% (87)	14.9% (74)	11.0% (82)	10.9% (101)
Ålesund	0.0% (13)	0.0% (20)	0.0% (23)	0.0% (22)	0.0% (18)
Total	8.4% (381)	10.5% (560)	10.0%~(558)	14.1% (604)	12.0%~(635)


Tabell 30: Andel pasienter med storkarsvaskulitt med lett eller alvorlig residiv






Figur 35: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får lett eller alvorlig residiv basert på BVAS-skjema. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut BVAS-skjema, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av lett eller alvorlig residiv. Figuren gjelder 2024.

Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt med lett eller alvorlig residiv




Figur 36: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får lett eller alvorlig residiv basert på BVAS-skjema. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut BVAS-skjema, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av lett eller alvorlig residiv. Figuren gjelder 2024 og de to foregående årene.

Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt med lett eller alvorlig residiv




Figur 37: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får lett eller alvorlig residiv basert på BVAS-skjema. Nevneren er antall unike pasienter per HF har fylt ut BVAS-skjema, mens telleren er antall unike pasienter per HF som har minst én registrering av lett eller alvorlig residiv. Figuren gjelder alle tider.

Andel pasienter med storkarsvaskulitt med residiv, basert på Kerrs




Figur 38: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som får residiv basert på Kerrs. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut Kerrs, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av residiv. Figuren gjelder 2024.

Andel pasienter med storkarsvaskulitt med residiv, basert på Kerrs



Figur 39: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som får residiv basert på Kerrs. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut Kerrs, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av residiv. Figuren gjelder 2024 og de to foregående årene.


Andel pasienter med storkarsvaskulitt med residiv, basert på Kerrs




Figur 40: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som får residiv basert på Kerrs. Nevneren er antall unike pasienter per HF som har fylt ut Kerrs, mens telleren er antall unike pasienter per HF som har minst én registrering av residiv. Figuren gjelder alle tider.

Sykehusnavn	gj.sn.ant.inf	Ant_pas	Ant_reg
Betanien	0.4	54	68
Drammen	0.4	85	145
Haugesund	0.2	77	162
Haukeland	0.3	104	154
Helgelandssykehuset	0.0	1	2
Kristiansand	0.4	62	108
Levanger	0.6	20	32
Lillehammer	0.2	139	300
Martina Hansen	0.2	62	106
Moss	0.3	30	35
Nordlandsykehuset	0.4	43	54
Rikshospitalet	0.0	9	9
Stavanger	0.1	16	25
UNN	0.3	195	343
Ålesund	0.5	37	39
Totalt	0.3	934	1582

Tabell 31: Gjennomsnittlig antall infeksjoner per pasient i 2024. Inkluderer alle pasienter med registreringer i 2024 på skjemaet Alvorligeinfeksjoner. Denne underestimerer muligens tallet siden også pasienter inkludert sent på året er med i utvalget. I tillegg gis registreringer i kategorien 4 eller flere verdien 4.



Figur 41: Fordeling av antall alvorlige infeksjoner meldt i $2024\,$



Figur 42: Ulike typer alvorlig infeksjon registrert i 2024


Indikator	Andel	N
Andel utført CT thorax ved ANCA-assosierte vaskulitter	35.1	302
Andel utført CT/MR bihule for ANCA-assosierte vaskulitter	29.5	302
Andel utført UL/CT/MR mellomstore/store kar for storkarsvaskulitter	21.6	741
Andel utført biopsi/UL/MR/ mellomstore kar ved KCA (kjempecellearteritt)	33.7	698

Tabell 32: Utførte utredninger, alle tider.

Andel med utført CT thorax ved debut av ANCA-assosiert vaskulitt Ä. Lillehammer 65 % 20 Haugesund 60 % 15 UNN 58 % Drammen 57 % Nordlandsykehuset 47 % Nasjonalt 35 % 19 299 Kristiansand 33 % Rikshospitalet 29 % 15 68 Betanien 29 % 17 Haukeland 269 19 15 7 Ålesund 0% Stavanger 0% St. Olavs 0% Levanger 0% Moss N<5 21 11 Martina Hansen N<5 20 0 40 60 80 100

Figur 43: Andel utført CT thorax for ANCA-assosierte vaskulitter, alle tider t.o.m. 2024


Andel (%)




Figur 44: Andel utført CT/MR bihule for ANCA-assosierte vaskulitter, alle tider t.o.m. 2024

Figur 45: Andel med utført UL/CT/MR av mellomstore/store kar ved debut av storkarsvaskulitt (Large vessel vasculitis=LVV) , alle tider t.o.m. 2024

Andel (%)




Figur 46: Andel med utført Biopsi/UL/MR ved debut av kjempecellearteritt, alle tider t.o.m. $2024\,$



Figur 47: Gjennomsnittlig pasientrapportert tretthet ved inklusjon og oppfølging for nysyke pasienter inkludert i 2023 og 2024. Nysyke er enten registrert direkte som nysyke eller, hvis nysykvariabelen er tom, har 30 dager eller mindre mellom diagnosedato og inklusjonsdato. Én pasient kan ha flere oppfølginger.

Sykehusnavn	Storkarsvaskulitt (LVV)	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)
Betanien	2.2(42)	5.8(22)
Drammen	0.4(76)	5.6(26)
Førde	0.7(16)	0.3(3)
Haugesund	0.4(31)	0.3(13)
Haukeland	1.1(84)	0.8(18)
Helgelandssykehuset	0.7(5)	
Kristiansand	0.9(66)	1.8(36)
Levanger	0.5(15)	2.0(12)
Lillehammer	0.8(115)	2.1(43)
Martina Hansen	0.8(74)	0.3(10)
Moss	1.4(33)	3.8(9)
Nordlandsykehuset	2.5(23)	6.7(17)
Rikshospitalet	3.7(168)	7.9(131)
St. Olavs	1.0(19)	1.8(7)
Stavanger	1.1(24)	3.1(14)
UNN	0.6(48)	2.0(38)
Ålesund	0.5(7)	4.4(13)


Tabell 33: Gjennmsnittlig tid fra symptom til diagnose i måneder. N
 i parentes. Gjelder t.o.m. 2024.



Figur 48: Gjennomsnittlig pasientrapportert global sykdomsaktivitet ved inklusjon og oppfølging for nysyke pasienter inkludert i 2023 og 2024. Nysyke er enten registrert direkte som nysyke eller, hvis nysykvariabelen er tom, har 30 dager eller mindre mellom diagnosedato og inklusjonsdato. Én pasient kan ha flere oppfølginger.

Sykehusnavn	Lav IgG	N
Betanien	14	49
Drammen	18	59
Førde	1	8
Haugesund	11	42
Haukeland	13	86
Kristiansand	6	58
Levanger	3	21
Lillehammer	24	73
Martina Hansen	3	10
Moss	7	22
Nordlandsykehuset	5	46
Rikshospitalet	16	129
St. Olavs	7	41
Stavanger	1	10
UNN	37	159
Ålesund	16	66
Total	182	879


Tabell 34: Antall ANCA-pasienter med IgG \leq 5 på minst én registrering. N angir antall ANCA-pasienter som har minst en registrering av IgG-verdi. Gjelder t.o.m. 2024.



Figur 49: Gjennomsnittlig pasientrapportert smerte ved inklusjon og oppfølging for nysyke pasienter inkludert i 2023 og 2024. Nysyke er enten registrert direkte som nysyke eller, hvis nysykvariabelen er tom, har 30 dager eller mindre mellom diagnosedato og inklusjonsdato. Én pasient kan ha flere oppfølginger.

Sykehusnavn	Antall utført IgG	N	Andel utført IgG
Betanien	125	240	52.1
Drammen	312	409	76.3
Førde	9	53	17.0
Haugesund	265	347	76.4
Haukeland	248	659	37.6
Kristiansand	75	261	28.7
Levanger	45	107	42.1
Lillehammer	530	564	94.0
Martina Hansen	13	46	28.3
Moss	37	70	52.9
Nordlandsykehuset	154	254	60.6
Rikshospitalet	93	121	76.9
St. Olavs	99	404	24.5
Stavanger	8	63	12.7
UNN	1211	1655	73.2
Ålesund	262	386	67.9

Tabell 35: Andel oppfølginger av ANCA-pasienter med utført IgG. Gjelder t.o.m. 2024



Figur 50: PROM ved debut og etter 6 måneder for pasienter med oppfølging i 2023 og 2024.

Sykehusnavn	Antall lav IgG	N	Andel lav IgG
Drammen	8	15	53.3
Betanien	11	26	42.3
Haugesund	7	17	41.2
Lillehammer	8	20	40.0
Moss	2	7	28.6
Haukeland	9	34	26.5
Martina Hansen	1	4	25.0
Total	94	385	24.4
Ålesund	11	46	23.9
UNN	14	65	21.5
Nordlandsykehuset	4	19	21.1
Kristiansand	5	25	20.0
St. Olavs	3	18	16.7
Rikshospitalet	10	75	13.3
Levanger	1	9	11.1
Førde	0	3	0.0
Stavanger	0	2	0.0

Tabell 36: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en rituximabdose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5. Kun pasienter som har fått rituximab minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2024


Sykehusnavn	Antall lav IgG	N	Andel lav IgG
Haugesund	2	2	100.0
Nordlandsykehuset	1	1	100.0
Kristiansand	1	4	25.0
Total	6	29	20.7
UNN	2	19	10.5
Rikshospitalet	0	2	0.0
St. Olavs	0	1	0.0

Tabell 37: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en immunoglobindose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5. Kun pasienter som har fått rituximab minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2024

Sykehusnavn	Antall alvorlig infeksjon	N	Andel alvorlig infeksjon
Rikshospitalet	1	1	100.0
Haukeland	5	10	50.0
Drammen	7	15	46.7
Ålesund	4	10	40.0
Total	31	122	25.4
Lillehammer	5	20	25.0
Nordlandsykehuset	1	5	20.0
Moss	1	5	20.0
Kristiansand	1	6	16.7
UNN	4	24	16.7
Betanien	1	9	11.1
Haugesund	1	10	10.0
Levanger	0	3	0.0
St. Olavs	0	3	0.0
Førde	0	1	0.0


Tabell 38: Andel ANCA-pasienter med IgGVerdi < 5 som har hatt en eller flere alvorlige infeksjoner. Nevneren inkluderer kun pasienter som på samme inklusjon/oppfølging der IgGVerdi < 5 også har fylt ut skjema for alvorlig infeksjon. Telleren er de som har markert for AntallInfeksjoner > 0 på skjema for alvorlig infeksjon. Gjelder t.o.m 2024

Andelen med IgG<5 blant ANCA-pasienter som har fått minst én rituksimabdose




Figur 51: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en rituximabdose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5. Kun pasienter som har fått rituximab minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2024.

Andelen med IgG<5 blant ANCA-pasienter som har fått minst én immunoglobindose




Figur 52: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en immunoglobindose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5. Kun pasienter som har fått immunoglobiner minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2024.


Andelen ANCA-pasienter med IgG<5 som har hatt én eller flere alvorlige infeksjoner




Figur 53: Andel ANCA-pasienter med IgGVerdi < 5 som har hatt en eller flere alvorlige infeksjoner. Nevneren inkluderer kun pasienter som på samme inklusjon/oppfølging der IgGVerdi < 5 også har fylt ut skjema for alvorlig infeksjon. Telleren er de som har markert for AntallInfeksjoner > 0 på skjema for alvorlig infeksjon. Gjelder t.o.m 2024.



Figur 54: Antall inklusjoner t.o.m. 2024.



Figur 55: Tid fra inklusjon til oppfølging for pasienter inkludert t.o.m. 2024. Gjelder alle oppfølginger for pasienter som er inkludert nysyke.



Figur 56: Tid fra inklusjon til første oppfølging for pasienter inkludert t.o.m. 2024. Gjelder oppfølginger for pasienter som er inkludert nysyke.

Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Betanien	70.4% (27)	69.2% (13)	N<5	N<5	20.0% (5)
Drammen	N < 5	60.0% (5)	100.0% (5)	N < 5	N < 5
Førde	N < 5		N < 5		
Haugesund	80.0% (5)	N < 5	N < 5	N < 5	100.0% (6)
Haukeland	62.5% (8)	63.6% (11)	63.6% (11)	20.0% (5)	N < 5
Kristiansand	N < 5	N < 5	N < 5	87.5% (8)	50.0% (6)
Levanger	N < 5	62.5% (8)			80.0% (5)
Lillehammer	100.0% (8)	88.9% (9)	90.9% (11)	100.0% (6)	100.0% (6)
Martina Hansen	N < 5	N < 5	N < 5	N < 5	N < 5
Moss		100.0% (12)	87.5% (8)	40.0% (5)	N < 5
Nordlandsykehuset	83.3% (6)	N < 5	N < 5	N < 5	100.0% (7)
Rikshospitalet	64.3% (14)	66.0% (53)	64.7% (17)	70.8% (24)	50.0% (24)
St. Olavs	N < 5		N < 5	0.0% (6)	0.0% (6)
Stavanger		12.5% (8)	N < 5	N < 5	N < 5
UNN	100.0% (11)	90.9% (11)	100.0% (6)	100.0% (12)	100.0% (6)
Ålesund	86.7% (15)	91.7% (12)	62.5% (8)	83.3% (6)	N < 5
Total	79.1% (110)	72.0% (157)	71.4% (84)	68.5% (89)	60.5% (86)


Tabell 39: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved inklusjon.

Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Betanien	71.4% (7)	70.0% (30)	63.6% (33)	70.8% (24)	36.8% (19)
Drammen	100.0% (33)	87.5% (32)	94.6% (37)	91.2% (34)	89.2% (37)
Førde	N < 5	N < 5	N < 5	N < 5	
Haugesund	95.2% (21)	88.5% (26)	92.6% (27)	100.0% (24)	96.3%~(27)
Haukeland	62.5% (40)	45.5% (44)	63.0% (54)	78.7% (47)	73.6% (53)
Kristiansand	33.3% (21)	38.9% (18)	41.2% (17)	65.0% (20)	57.1% (21)
Levanger	100.0% (7)	87.5% (8)	30.0% (10)	50.0% (6)	25.0% (8)
Lillehammer	92.3% (26)	93.5% (31)	100.0% (45)	98.1% (52)	96.1% (51)
Martina Hansen		N < 5	N < 5	N < 5	50.0% (8)
Moss			80.0% (10)	44.4% (9)	62.5% (8)
Nordlandsykehuset	93.3% (15)	94.4% (18)	95.5% (22)	81.0% (21)	81.0% (21)
Rikshospitalet	N < 5	80.0% (5)	84.6% (13)	93.8% (16)	89.5% (38)
St. Olavs	63.6% (22)	59.3% (27)	36.4% (22)	0.0% (7)	12.5% (8)
Stavanger			28.6% (7)	14.3% (7)	14.3% (7)
UNN	88.3% (77)	86.0% (86)	88.6% (79)	91.5% (82)	89.2% (93)
Ålesund	93.8% (16)	88.6% (35)	71.1% (38)	77.3% (44)	64.0% (25)
Total	81.0% (290)	76.0% (367)	75.8% (421)	81.2% (399)	77.6% (424)

Tabell 40: Versjon 1: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved oppfølging. Nevner er alle pasienter som har oppfølging i aktuelle år.


Sykehusnavn	2020	2021	2022	2023	2024
Betanien	71.4% (7)	61.8% (34)	46.7% (45)	36.2% (47)	13.7% (51)
Drammen	78.6% (42)	62.2% (45)	70.0% (50)	56.4% (55)	62.3% (53)
Førde	28.6% (7)	12.5% (8)	0.0% (8)	0.0% (9)	0.0% (9)
Haugesund	90.9% (22)	85.2% (27)	89.3% (28)	88.9% (27)	92.9% (28)
Haukeland	39.7% (63)	28.2% (71)	41.5% (82)	39.8% (93)	39.8% (98)
Kristiansand	21.9% (32)	20.6% (34)	22.6% (31)	48.1% (27)	34.3% (35)
Levanger	87.5% (8)	70.0% (10)	16.7% (18)	16.7% (18)	11.1% (18)
Lillehammer	72.7% (33)	72.5% (40)	93.8% (48)	89.5% (57)	77.8% (63)
Martina Hansen	N < 5	N < 5	25.0% (8)	18.2% (11)	28.6% (14)
Moss			66.7% (12)	20.0% (20)	20.0% (25)
Nordlandsykehuset	53.8% (26)	54.8% (31)	65.6% (32)	50.0% (34)	44.7% (38)
Rikshospitalet	N < 5	23.5% (17)	15.7% (70)	17.2% (87)	30.6% (111)
St. Olavs	43.8% (32)	45.7% (35)	23.5% (34)	0.0% (37)	2.3% (43)
Stavanger			25.0% (8)	10.0% (10)	8.3% (12)
UNN	77.3% (88)	78.7% (94)	69.3% (101)	74.3% (101)	79.8% (104)
Ålesund	65.2% (23)	83.8% (37)	60.0% (45)	64.2% (53)	27.1% (59)
Total	60.4% (389)	57.3% (487)	51.5% (620)	47.2% (686)	43.2% (761)

Tabell 41: Versjon 2: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved oppfølging. Nevner er alle pasienter som skulle hatt oppfølging i aktuelle år.




Figur 57: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved inklusjon.

Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG årlig ved oppfølging



Figur 58: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG minst årlig ved oppfølging. Blant de som har minst én oppfølging i aktuelle år.

Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG årlig ved oppfølging



Figur 59: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG minst årlig ved oppfølging. Blant de som har skulle hatt oppfølging i aktuelle år.