

UNF Odense Matematikklub: Lineær Algebra

matklub@odense.unf.dk

1 Systemer af lineære ligninger

Du er sikkert stødt på 2 lineære ligninger i to ubekendte. Et eksempel er

$$\begin{aligned}2x + y &= -3 \\ 4x - 2y &= -9\end{aligned}$$

Vi ved hvordan man løser disse ligninger, hvis altså de har en løsning. Vi kan først isolere x i den første ligning:

$$\begin{aligned}2x + y &= -3 \\ \Rightarrow 2x &= -3 - y \\ \Rightarrow x &= \frac{-3}{2} - \frac{y}{2}.\end{aligned}$$

Vi kan sætte dette udtryk for x ind i ligning 2 og isolere y .

$$\begin{aligned}4\left(\frac{-3}{2} - \frac{y}{2}\right) - 2y &= -9 \\ \Rightarrow -6 - 2y - 2y &= -9 \\ \Rightarrow -4y &= -3 \\ \Rightarrow y &= \frac{3}{4}.\end{aligned}$$

Vi har fundet y . Vi kan nu indsætte y i den første ligning igen for at finde x .

$$\begin{aligned}2x + \frac{3}{4} &= -3 \\ \Rightarrow 2x &= -\frac{15}{4} \\ \Rightarrow x &= -\frac{15}{8}.\end{aligned}$$

Denne proces er dog lidt nørklet. Desuden kan man overveje følgende:

Hvad nu hvis man havde 3 lineære ligninger i 3 ubekendte? Eller n ligninger i n ubekendte for $n \geq 3$?

Godt nok kan man lave en lignende proces, men det bliver kun mere nørklet jo flere ligninger man tilføjer. Det er i denne slags situation at man som matematiker bør overveje

Findes der en nemmere og mere generel måde at løse denne slags ligninger på?

Og, da matematikere er dovne, ønsker vi særligt en metode som kræver mindre tankevirksomhed. Heldigvis er svaret på vores spørgsmål et klart “ja!”, og vi vil nu beskæftige os med en måde at gøre det på, kaldet *Gauß-(Jordan) elimination*.

Vi skal dog først være præcise om hvad vi mener med lineære ligningssystemer

Definition 1.1. En reel lineær ligning i variablene x_1, x_2, \dots, x_n er en ligning på formen

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b,$$

Hvor a_1, \dots, a_n og b alle er reelle tal.

Et lineært ligningssystem i x_1, \dots, x_n er en samling af lineære ligninger i x_1, \dots, x_n . En løsning på et sådant ligningssystem er et valg af konkrete reelle tal y_1, \dots, y_n , så samtlige ligninger bliver sande, når man indsætter y_1, \dots, y_n på x_1, \dots, x_n 's pladser.

2 Matricer og Gauß-Jordan elimination

Matricer

Vi betragter igen vores ligningssystem

$$\begin{aligned} 2x + y &= -3 \\ 4x - 2y &= -9 \end{aligned}$$

I stedet for at skrive det op som ovenfor, kan vi skrive det op som en liste af tal på *matrixform*:

$$\begin{array}{l} \text{ligning 1} \\ \text{ligning 2} \end{array} \begin{array}{ccc} x & y & \text{konstant} \\ \left(\begin{array}{ccc} 2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & -9 \end{array} \right) \end{array}$$

Hver *række* i matricen repræsenterer en af ligningerne. Den første *søjle* af matricen repræsenterer koefficienterne foran x i ligningerne, mens den anden repræsenterer koefficienterne foran y . Den sidste søjle repræsenterer konstantleddet i de to ligninger. Vi kunne også have skrevet matricen som

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -2 & 4 & -9 \end{pmatrix},$$

hvor vi altså har byttet om på x og y 's plads: Ligningssystemet er stadig det samme; vi har bare byttet om på pladserne for variablerne. Så længe én bestemt kolonne altid svarer til *præcis ét* variabel, så er det en gyldig måde at skrive systemet

op på. Dog er den sidste række *altid* den, som svarer til konstantleddene. Derfor skriver vi også nogle gange matricen som

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & -9 \end{array} \right)$$

Helt generelt definerer vi nu matricer

Definition 2.1. En *reel* $m \times n$ matrix, eller en matrix med m rækker og n søjler, er en liste af tal

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

hvor hvert a_{ij} ligger i \mathbb{R} . Mængden af alle $m \times n$ -matricer skriver vi som $M_{m \times n}(\mathbb{R})$. Hvis $n = m$ skriver vi dog $M_n(\mathbb{R}) := M_{n \times n}(\mathbb{R})$.

Vi har nu en generel måde at skrive n lineære ligninger i n variable op i en $n \times (n+1)$ -matrix: Hvis vi har et system af ligninger

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \dots + a_{m,n}x_n &= b_m \end{aligned}$$

får vi på naturlig vis en matrix

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} & b_m \end{array} \right).$$

Men hvad kan vi bruge det til?

Småt og godt om lineære ligningssystemer

Vi laver nu nogle generelle observationer om lineære ligningssystemer. Til det bruger vi igen vores modeleksempel

$$\begin{aligned} 2x + y &= -3 \\ 4x - 2y &= -9 \end{aligned}$$

Vi kan lægge -3 til på begge sider af ligning nr. 2, og få en ækvivalent ligning.

$$\begin{aligned} 4x - 2y - 3 &= -9 - 3 \\ \Leftrightarrow 4x - 2y + (-3) &= -12. \end{aligned}$$

Men vi kan bruge ligning 1 til at skrive -3 om

$$\begin{aligned} 4x - 2y + 2x + y &= -12 \\ \Leftrightarrow 6x - y &= -12. \end{aligned}$$

Vores oprindelige ligningssystem bliver altså nu til det ækvivalente ligningssystem

$$\begin{aligned} 2x + y &= -3 \\ 6x - y &= -12 \end{aligned}$$

Det giver os en generel regel:

Observation 2.2. *i et lineært ligningssystem kan man lægge én ligning til en anden ligning og få et ækvivalent ligningssystem.*

Vi kan omsætte vores observation til matricen som svarer til ligningssystemet. Det svarer til at lægge række 1 (R_1) til række 2 (R_2)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & -9 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -3 \\ 6 & -1 & -12 \end{array} \right)$$

Lad nu a være et reelt tal. Observer da at ligningen

$$2x + y = -3$$

er ækvivalent med

$$a(2x + y) = (a)(-3)$$

så længe $a \neq 0$, fordi vi kan gange med $1/a$ for at få den oprindelige ligning tilbage. Det følger os til en ny observation.

Observation 2.3. *I et lineært ligningssystem kan man gange en ligning med et tal forskelligt fra 0 og få et ækvivalent ligningssystem.*

Det vil sige at matricerne

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & -9 \end{array} \right)$$

og

$$\left(\begin{array}{cc|c} a \cdot 2 & 1 \cdot a & -3 \cdot a \\ 4 & -2 & -9 \end{array} \right)$$

repræsenterer ækvivalente ligningssystemer, altså ligningssystemer hvis løsninger er det samme.

Rækkeoperationer

Ud fra det forhenværende delafsnit kan vi nu komme frem til nogle operationer, som vi kan udføre på en matrix, uden at ændre på ligningssystemet, som repræsenteres. Inden vi gør det, bemærker vi lige en sidste ting.

Observation 2.4. Hvis man bytter om på to rækker i en matrix, indkoder den det samme ligningssystem som før.

I praksis: Matricerne

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & -9 \end{array} \right)$$

og

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & -2 & -9 \\ 2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

indkoder det samme ligningssystem. Nu kan vi endelig definere *rækkeoperationerne*.

Definition 2.5. Lad

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

være en $m \times n$ reel matrix. Følgende operationer kaldes *rækkeoperationer* på matricen:

1. At bytte om på to rækker i A .
2. At gange en række i A med et reelt tal forskelligt fra 0.
3. At lægge én række i A til en anden række i A . (eller alternativt, kombinere 2 og 3 til at gange en række med et tal $a \neq 0$, så lægge den til en anden række, og så gange den første række med $1/a$, så den er som før).

Ved brug af Observationerne 2.2, 2.3 og 2.4 opnår vi følgende:

Proposition 2.6. Lad $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ være matricer. Hvis man kan nå frem til B fra A med endeligt mange rækkeoperationer, så repræsenterer A og B ækvivalente lineære ligningssystemer, altså:

- Systemet repræsenteret af A har en løsning hvis og kun hvis systemet repræsenteret af B har løsning;
- Løsningsmængden for det ene system er præcis løsningsmængden for det andet system.

Gaußelimination, for real

Rækkeoperationer er det værktøj, som vi vil bruge til at løse lineære ligningssystemer.

Definition 2.7. Lad A være en $m \times n$ -matrix. Hvis en række R i A *ikke* kun består af 0'er, så kalder vi den første plads i rækken fra venstre, hvor der er et tal forskelligt fra nul, for den ledende plads. Hvis R kun består af 0'er, siger vi at dens ledende plads er ∞ .

Eksempel 2.8. I matricen

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

er den ledende plads på række 1 den 2. plads. Den ledende plads på række 2 er den 3. plads, og den ledende plads på række 3 er den 1. plads.

Definition 2.9. En $m \times n$ matrix A er på *række-echelon form* hvis følgende gælder:

For enhver række R i A er den ledende plads længere til højre (altså større) end den ledende plads i rækken over R .

Eksempel 2.10. Matricen fra eksempel 2.8 er *ikke* på række-echelon form, da den ledende plads på række 3 er længere til venstre end den ledende plads på række 2. Matricen

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

er dog på række-echelon form ($\infty > 3$). Til gengæld er matricen

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ikke på række-echelon form.

Hvis nu

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & b_2 \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & b_3 \end{array} \right)$$

indkoder et ligningssystem, og A er på række-echelon-form, altså

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & b_1 \\ 0 & a_{2,2} & a_{2,3} & b_2 \\ 0 & 0 & a_{3,3} & b_3 \end{array} \right),$$

så repræsenterer A ligningerne

$$a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 = b_1$$

$$a_{2,2}x_2 + a_{2,3}x_3 = b_2$$

$$a_{3,3}x_3 = b_3,$$

i de ubekendte x_1, x_2, x_3 , og så kan vi jo nemt aflæse løsningen ved at bemærke at $x_3 = b_1/a_{3,3}$, $x_2 = \frac{b_2 - a_{2,3}x_3}{a_{2,2}}$, etc, hvis altså $a_{1,1}, a_{2,2}, a_{3,3} \neq 0$. Hvis de ikke alle er forskellige fra 0 kan man stå i et par forskellige situationer.

1. Systemet har ingen løsninger. Det sker hvis man får en række hvor alle pladser er 0, ud over den sidste plads, hvor der er et tal $b \neq 0$. Det ville nemlig svare til at

$$0 = 0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = b \neq 0,$$

hvilket er umuligt. Alternativt kan man stå i følgende situation i stedet:

2. Der er *frie variable* i systemet; variable hvis værdi vi kan vælge til at være hvad som helst, og stadig opnå en løsning til systemet.

Vi kommer til at kigge på begge situationer i eksempler. Nøgleobservationen er dog følgende

Observation 2.11. Man kan løse et lineært ligningssystem (hvis det har en løsning) ved at udføre rækkeoperationer på systemets matrix indtil den opnår række-echelon form.

Definition 2.12. *Gauß-elimination* af en matrix er at udføre rækkeoperationer på matricen indtil den opnår række-echelonform.

Eksempel 2.13. Vi ønsker at løse vores model-eksempel med Gauß-elimination. Betragt ligningssystemet

$$\begin{aligned} 2x + y &= -3 \\ 4x - 2y &= -9 \end{aligned}$$

og dets tilhørende matrix

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & -9 \end{array} \right).$$

På den første række i matricen er den ledende plads 1. Vi skal derfor have gjort tallet på række 2, søjle 1 til et 0. Det kan vi gøre med en rækkeoperation:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & -9 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2 \cdot R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & -9 \end{array} \right).$$

Det giver os ligningerne

$$\begin{aligned}-4y &= -3 \\ 2x + y &= -3.\end{aligned}$$

Man kan nu finde y ved at dividere med -4 i den første ligning, og så sætte y ind i den anden ligning. Så får man, som vi også så i det første afsnit, at $x = \frac{-15}{8}$, $y = \frac{3}{4}$

Godt nok var det simplere for os at Gauß-eliminere systemet end at regne det direkte, men der er måske ikke så tydelig en fordel når kun vi har to ligninger og to ubekendte. I næste afsnit vil vi blandt andet kigge på større ligningssystemer.

Gauß-Jordan elimination

Hvis man ikke gider lave det ekstra arbejde med at finde værdierne af sine variable efter at have Gauß-elimineret en matrix, så kan man Gauß-Jordan eliminere den. I Gauß-Jordan elimination reducerer man en matrix til *reduceret* række-echelon form. Det betyder at for enhver række R i vores matrix gælder følgende:

1. Tallet på den ledende plads er 1
2. Hvis den ledende plads på R er n , så er tallet på plads n på alle andre rækker lig med 0.

Eksempel 2.14. Matricen

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & -3 \end{pmatrix}$$

er *ikke* på reduceret række-echelonform, men matricen

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

er til gengæld.

Fordelen ved Gauß-Jordan elimination er at det er nemmere at aflæse løsningen fra matricen; ulempen er at man skal bruge flere rækkeoperationer.

Eksempler

Lad os eliminere nogle matricer

Eksempel 2.15. Vi er givet ligningssystemet

$$\begin{aligned} -2x + 2y + z &= 7 \\ 2x - 8y + 5z &= 0 \\ 19x - 10y + 22z &= 3. \end{aligned}$$

Vi skriver den tilsvarende matrix op,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -8 & 5 & 0 \\ 19 & -10 & 22 & 3 \end{array} \right),$$

og udfører nu Gauß-Jordan elimination. Vi skal først have nuller på plads 1 på alle rækker under række 1, mens vi skal have ændret -2 på række 1, plads 1 til 1

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -8 & 5 & 0 \\ 19 & -10 & 22 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & -6 & 6 & 7 \\ 19 & -10 & 22 & 3 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{R_1 \rightarrow -\frac{1}{2}R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1/2 & -7/2 \\ 0 & -6 & 6 & 7 \\ 19 & -10 & 22 & 3 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 19 \cdot R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1/2 & -7/2 \\ 0 & -6 & 6 & 7 \\ 0 & 9 & 22 + 19/2 & 3 + 133/2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1/2 & -7/2 \\ 0 & -6 & 6 & 7 \\ 0 & 9 & 63/2 & 139/2 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Vi skal nu udføre samme process for række 2. Bemærk at både pladserne over og under den førende plads skal blive 0.

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1/2 & -7/2 \\ 0 & -6 & 6 & 7 \\ 0 & 9 & 63/2 & 139/2 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{6}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1/2 & -7/2 \\ 0 & 1 & -1 & -7/6 \\ 0 & 9 & 63/2 & 139/2 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3/2 & -7/2 - 7/6 \\ 0 & 1 & -1 & -7/6 \\ 0 & 9 & 63/2 & 139/2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3/2 & -14/3 \\ 0 & 1 & -1 & -7/6 \\ 0 & 9 & 63/2 & 139/2 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 9 \cdot R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3/2 & -14/3 \\ 0 & 1 & -1 & -7/6 \\ 0 & 0 & 63/2 + 18/2 & 139/2 + 63/6 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3/2 & -14/3 \\ 0 & 1 & -1 & -7/6 \\ 0 & 0 & 81/2 & 480/6 \end{array} \right) \\ & = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3/2 & -14/3 \\ 0 & 1 & -1 & -7/6 \\ 0 & 0 & 81/2 & 80 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Nu skal processen bare udføres for række 3.

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3/2 & -14/3 \\ 0 & 1 & -1 & -7/6 \\ 0 & 0 & 81/2 & 80 \end{array} \right) &\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 \cdot 2/81} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3/2 & -14/3 \\ 0 & 1 & -1 & -7/6 \\ 0 & 0 & 1 & 160/81 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3/2 & -14/3 \\ 0 & 1 & 0 & -7/6 + 160/81 \\ 0 & 0 & 1 & 160/81 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 3/2 R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -14/3 + 480/162 \\ 0 & 1 & 0 & -7/6 + 160/81 \\ 0 & 0 & 1 & 160/81 \end{array} \right) \\
 &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -46/27 \\ 0 & 1 & 0 & 131/162 \\ 0 & 0 & 1 & 160/81 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

Altså har vi løst ligningssystemet.

Eksempel 2.16 (Et uløseligt ligningssystem). Betragt ligningssystemet

$$\begin{aligned}
 2x &- y = -3 \\
 4x &- 2y = -9.
 \end{aligned}$$

Ved Gauß-Jordan elimination fås

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -3 \\ 4 & -2 & -9 \end{array} \right) &\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2 \cdot R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -3 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{1}{2} R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1/2 & -3/2 \\ 0 & 0 & -3 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

Det viser at vores oprindelige ligningssystem er ækvivalent med

$$\begin{aligned}
 x - \frac{y}{2} &= -\frac{3}{2} \\
 0 &= -3.
 \end{aligned}$$

Men $0 = -3$ er ikke muligt, hvilket vil sige at ligningssystemet er *ukonsistent*, og at der derfor ingen løsning findes.

Eksempel 2.17 (Frie variable). Betragt matricen

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Den svarer til ligningssystemet

$$\begin{aligned}x_1 - 3x_3 &= 7 \\x_2 + 2x_3 &= -5.\end{aligned}$$

Altså får vi

$$x_1 = 7 - 3x_3, \quad x_2 = -5 - 2x_3.$$

Bemærk at uanset hvilket x_3 vi vælger, så er kan vi få en løsning til ligningssystemet ved at vælge x_1 og x_2 ud for ovenstående ligning. Det vil sige, at x_3 er et *frit variabel*: Vi kan vælge det til at være hvad som helst, og stadig få en løsning til ligningssystemet. Dette er en effekt af at der er en række i matricen, som kun består af 0'er. Vi har altså egentlig flere ligninger end variable.

3 At regne med matricer

- Addition
- Skalering
- Multiplikation (måske som prikprodukt)
- Identitet og invertibilitet
- $M_1(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}$.

4 Opgaver

- Løs et par ligningssystemer
- Ligningssystemer som lineære matrixligninger
- Invertibilitet af A i $A\vec{x} = \vec{b}$ hviss entydig løsning
- Rækkeoperationer som matrixmultiplikation. Find udtryk for A^{-1}
- Find to matricer som ikke kommuterer
- Vis at $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- Vis kommutation med invers medfører invers kommuterer med ikke-invers
- Vis at $M_1(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}$