

CORRECTION

L1 IEEEA, 2024-2025
Université de Rouen

NOM

Prénom

Groupe de TD :

Numéro :

Note sur 20:

Contrôle continu - Seconde chance (v3)

UE Logique et structures algébriques

Vendredi 10 janvier 2025 - Documents, mobiles et calculatrices interdites

Exercice 1. Écrire la négation de chacune de ces propositions suivantes et indiquer en le justifiant si la proposition considérée est vraie ou fausse (cocher la bonne case).

(a) Proposition $P : \forall n \in \mathbb{Z}, (n^2 \leq 9) \text{ ou } (n > 3)$ Vraie : ☐ Fausse : ☒

Proposition $\neg P : \exists n \in \mathbb{Z}, (n^2 > 9) \text{ et } (n \leq 3)$

$\neg P$ est vraie : pour $n = -4$

On a $(n^2 = 16 > 9)$ vraie et $n = -4 \leq 3$ vraie, donc P est fausse.

(b) Proposition $Q : \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} \quad (x > y) \text{ et } (x^2 + y^2 < 1)$ Vraie : ☐ Fausse : ☒

Proposition $\neg P : \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x \leq y) \text{ ou } (x^2 + y^2 \geq 1)$

$\neg P$ est vraie - On pose $x = 2$.

alors, pour $y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 \geq x^2 = 4 \geq 1$ donc $(x^2 + y^2 \geq 1)$ est vraie donc $\neg P$ est vraie.

Exercice 2. On considère des propositions P et Q de valeurs de vérité quelconques.

P	Q	$P \text{ ou } Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

P	$\neg P$	Q	$\neg P \text{ ou } Q$
V	F	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	V	F	V

P	Q	$(P \text{ ou } Q) \text{ et } (\neg P \text{ ou } Q)$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	F

(a) Compléter les tables de vérité ci-dessus.

(b) Que peut-on en déduire concernant la proposition $((P \text{ ou } Q) \text{ et } (\neg P \text{ ou } Q))$?

Sa table de vérité est la même que celle de Q
donc $((P \text{ ou } Q) \text{ et } (\neg P \text{ ou } Q)) \Leftrightarrow Q$

Exercice 3. On considère les fonctions réelles : $f(x) = x^2 + 2$ et $g(x) = 2x + 1$.
Déterminer explicitement : $(f \circ g)(x)$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x+1) = (2x+1)^2 + 2 \\ (= 4x^2 + 4x + 3)$$

Exercice 4. On considère les nombres complexes $z = 4 + 3i$ et $z' = 1 - 2i$.
Déterminer explicitement :

$$z + z' = (4 + 3i) + (1 - 2i) = 5 + i$$

$$\overline{z'} = 1 + 2i$$

$$\begin{aligned} \frac{z}{z'} &= \frac{4 + 3i}{1 - 2i} = \frac{(4 + 3i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = \frac{4 + 8i + 3i - 6}{1 + 4} \\ &= \frac{-2 + 11i}{5} = -\frac{2}{5} + \frac{11}{5}i \end{aligned}$$


Exercice 5. Soit $z = \sqrt{3} - 3i$.

a) Calculer : $|z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-3)^2} = \sqrt{3 + 9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$$\frac{z}{|z|} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} - i \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

b) Donner la forme exponentielle complexe de z .

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2} \\ \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad \begin{aligned} &\text{donc } \theta = -\frac{\pi}{3} \\ &\text{donc } z = 2\sqrt{3} e^{-i\frac{\pi}{3}} \end{aligned}$$



Exercice 6. On considère la suite de nombre complexes définie par récurrence :

$$u_0 = 1 + 2i \quad \text{et pour } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = (1 + i)u_n + 2.$$

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_n = (1 + i)^n + 2i$. (P_n)

Initialisation : $n = 0 \quad u_0 = (1 + i)^0 + 2i = 1 + 2i$ (P₀ vraie)

Hérédité . Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que P_n est vraie :
 $u_n = (1 + i)^n + 2i$

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= (1 + i)u_n + 2 = (1 + i)((1 + i)^n + 2i) + 2 \\ &= (1 + i)^{n+1} + (1 + i)(2i) + 2 = (1 + i)^{n+1} + (2i - 2) + 2 \\ &= (1 + i)^{n+1} + 2i \quad \text{Donc } (P_{n+1}) \text{ est vraie.} \end{aligned}$$

Conclusion . $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = (1 + i)^n + 2i$

Exercice 7. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow]0, 2]$, $x \mapsto \frac{2}{x^2+1}$.

a) Montrer que la fonction f est surjective. Soit $y \in]0, 2]$, et $x \in \mathbb{R}$.

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = \frac{2}{x^2+1} \Leftrightarrow x^2+1 = \frac{2}{y} \Leftrightarrow x^2 = \frac{2}{y} - 1$$

comme $0 < y \leq 2$, on a $1 \leq \frac{2}{y}$ donc $\frac{2}{y} - 1 \geq 0$.

On pose $x = \sqrt{\frac{2}{y} - 1}$. Alors $x \in \mathbb{R}$ et $x^2 = \frac{2}{y} - 1$ et donc $f(x) = y$. Donc f est surjective.

b) Soit $B =]0, 1]$. Déterminer, en le justifiant, l'ensemble $f^{-1}(B) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in B\}$. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B \Leftrightarrow \frac{2}{x^2+1} \in]0, 1]$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{x^2+1} \leq 1 \Leftrightarrow 2 \leq x^2+1$$

$$\Leftrightarrow x^2 \geq 1 \Leftrightarrow (x \geq 1) \text{ ou } (x \leq -1)$$

$$f^{-1}(B) =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$$

Exercice 8. On va montrer la relation définie sur \mathbb{R}^2 ci-dessous est une relation d'ordre :

$$(x, y) \prec (x', y') \Leftrightarrow (x \leq x' \text{ et } x + y \leq x' + y').$$

(a) Montrer que \prec est réflexive : Soient $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{R}^2$.

On a $x \leq x$ et $x + y \leq x + y$ donc $(x, y) \prec (x, y)$

(b) Montrer que \prec est anti-symétrique : On suppose que :

$$(x, y) \prec (x', y') \text{ donc } x \leq x' \text{ et } x + y \leq x' + y'$$

$$(x', y') \prec (x, y) \text{ donc } x' \leq x \text{ et } x' + y' \leq x + y$$

$$x \leq x' \text{ et } x' \leq x \text{ donc } x = x'. \text{ donc } x + y \leq x + y' \text{ et } x + y' \leq x + y$$

$$\text{donc } y \leq y' \text{ et } y' \leq y \text{ donc } y = y'.$$

(c) Montrer que \prec est transitive :

$$\text{On suppose que } (x, y) \prec (x', y') \text{ et } (x', y') \prec (x'', y'')$$

$$\text{Donc } x \leq x' \text{ et } x' \leq x'' \text{ donc } x \leq x''$$

$$x + y \leq x' + y' \text{ et } x' + y' \leq x'' + y'' \text{ donc } x + y \leq x'' + y''$$

$$\text{Donc } (x, y) \prec (x'', y'')$$

(d) Est ce que \prec est une relation d'ordre total ? Justifier votre réponse.

$$\text{on n'a pas } (1, 3) \prec (2, 1) \text{ car } 1+3 \leq 2+1 \text{ est Faux}$$

$$(2, 1) \prec (1, 3) \text{ car } 2 \leq 1 \text{ est Faux}$$

L'ordre n'est pas total.

Exercice 9. Pour $x, y \in I =]0, \infty[$ on note : $f(x, y) = x * y = \frac{xy}{x+y}$.

(a) Montrer que l'application $f : I \times I \mapsto I$ est bien définie. Est-ce que $*$ définit une loi de composition interne sur I ?

Pour $x, y \in]0, +\infty[$, $x > 0, y > 0$ donc $x+y > 0$, $xy > 0$
donc $x*y$ est bien défini d- $x*y \in]0, +\infty[$. $*$ est bien une l.c.i.

(b) Est-ce que la loi $*$ est commutative?

$$x * y = \frac{xy}{x+y} = \frac{yx}{y+x} = y * x$$

donc $*$ est commutative.

(c) Calculer explicitement en simplifiant pour $x, y, z \in I$:

$$\begin{aligned} A = (x * y) * z &= \left(\frac{xy}{x+y} \right) * z = \frac{\left(\frac{xy}{x+y} \right) \times z}{\left(\frac{xy}{x+y} \right) + z} = \frac{\left(\frac{xy}{x+y} \right) \times z \times (x+y)}{\left(\left(\frac{xy}{x+y} \right) + z \right) \times (x+y)} \\ &= \frac{xyz}{xy + zx + zy} \\ B = x * (y * z) &= x * \left(\frac{yz}{y+z} \right) = \frac{x \times \left(\frac{yz}{y+z} \right)}{x + \left(\frac{yz}{y+z} \right)} = \frac{x \times \left(\frac{yz}{y+z} \right) \times (y+z)}{\left(x + \left(\frac{yz}{y+z} \right) \right) \times (y+z)} \\ &= \frac{xyz}{xy + xz + yz} \end{aligned}$$

Est-ce que la loi $*$ est associative? oui car $A = B$

(d) Est-ce que la loi $*$ admet un élément neutre? Justifier votre réponse.

On suppose par l'absurde que $e \in]0, +\infty[$ est l'élément neutre. alors $e * e = e$ donc $\frac{e \times e}{e+e} = e$
donc $\frac{e^2}{2e} = e$ donc $\frac{1}{2} = 1$. Impossible. $*$ n'a pas d'élément neutre.

(e) Soit $x \in]0, +\infty[$. On pose $x_1 = x$ et on définit par récurrence $x_{n+1} = x_n * x$. Montrer par récurrence que pour $n \geq 1$ on a $x_n = \frac{x}{n}$. (P_n)

Initialisation. $x_1 = x$ donc $x = \frac{x}{1}$ donc (P_1) vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$. On suppose que $x_n = \frac{x}{n}$

$$\text{Alors } x_{n+1} = x_n * x = \frac{x_n \times x}{x_n + x} = \frac{\left(\frac{x}{n} \right) \times x}{\left(\frac{x}{n} \right) + x}$$

$$x_{n+1} = \frac{\left(\frac{x}{n} \right) \times x \times n}{\left(\left(\frac{x}{n} \right) + x \right) \times n} = \frac{x^2}{x + nx} = \frac{x}{n+1} \quad \text{donc } (P_{n+1}) \text{ vraie.}$$

Conclusion : $\forall n \geq 1, x_n = \frac{x}{n}$