

Fiche n° 2 - Nombres complexes v1


Rappel : Le corps des nombres complexes est : $\mathbb{C} = \{z = a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ (avec $i^2 = -1$).

Soient $z = a + ib$, $z' = a' + ib'$, u et v des nombres complexes (non nuls si ils sont en quotient) et $n \in \mathbb{Z}$:

- Addition : $(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b')$
- Multiplication : $(a + ib) \times (a' + ib') = aa' + iab' + iba' + i^2 bb' = (aa' - bb') + i(ab' + ba')$
- Parties réelles et imaginaires : $\operatorname{Re} z = a$, $\operatorname{Im} z = b$ (donc $z = \operatorname{Re} z + i \operatorname{Im} z$)
- Conjugué : $\bar{z} = a - ib$. Alors $\overline{\bar{z}} = z$, $\overline{u + v} = \bar{u} + \bar{v}$, $\overline{u - v} = \bar{u} - \bar{v}$, $\overline{uv} = \bar{u}\bar{v}$, $\overline{\left(\frac{u}{v}\right)} = \frac{\bar{u}}{\bar{v}}$, $\overline{(u^n)} = (\bar{u})^n$
 $z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = (a)^2 - (ib)^2 = a^2 - i^2 b^2 = a^2 + b^2$
- Module : $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2} (= |\bar{z}|)$. $||u| - |v|| \leq |u + v| \leq |u| + |v|$, $|uv| = |u||v|$, $\left|\frac{u}{v}\right| = \frac{|u|}{|v|}$, $|u^n| = |u|^n$
- inverse : $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ ou bien $\frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{(a + ib) \times (a - ib)} = \frac{a}{a^2 + b^2} - i \frac{b}{a^2 + b^2}$
- **Forme algébrique** : $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$
- **Forme polaire ou (forme trigonométrique)** : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r \geq 0$, $\theta \in \mathbb{R}$
 $r = |z|$ est le module et θ est un **argument** de z (pour $k \in \mathbb{Z}$, alors $\theta + 2k\pi$ est aussi un argument de z)
- Relations entre forme algébrique et forme polaire : Pour $z = a + ib = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ($z \neq 0$), on identifie :

$$\begin{cases} a = r \cos \theta \\ b = r \sin \theta \end{cases} \iff \begin{cases} a^2 + b^2 = r^2 \\ \cos \theta = \frac{a}{r} \\ \sin \theta = \frac{b}{r} \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{cases}$$

- Exponentielle complexe: Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.
Donc on a aussi : $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$, $\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$, $\sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$
Multiplication, puissance, quotient : $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta + \theta')}$, $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$, $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta - \theta')}$
- **Forme exponentielle** : $z = r e^{i\theta}$
- Multiplication, puissance, quotient : $(r e^{i\theta}) \times (r' e^{i\theta'}) = (rr') e^{i(\theta + \theta')}$, $(r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$, $\frac{r e^{i\theta}}{r' e^{i\theta'}} = \frac{r}{r'} e^{i(\theta - \theta')}$
- Valeurs remarquables de $e^{i\theta}$:



$$\begin{aligned} e^{i0} &= \cos(0) + i \sin(0) = 1 \\ e^{i\frac{\pi}{6}} &= \cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \\ e^{i\frac{\pi}{4}} &= \cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \\ e^{i\frac{\pi}{3}} &= \cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3) = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \\ e^{i\frac{\pi}{2}} &= \cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2) = i \\ e^{i\pi} &= \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1 \end{aligned}$$

Exercice 1. On pose $z = 4 - 2i$, $z' = 2 + 3i$.

- Calculer $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$, \bar{z} , \bar{z}' , $z\bar{z}$, $|z|$, $|z'|$.
- Calculer les nombres complexes suivants : $z + z'$, zz' , z^2 , z/z' , $1/z'$.
- Placer les points z , z' , \bar{z} , $1/z'$, $z + z'$, zz' dans le plan complexe.

Exercice 2. On pose $z = 2 + i2\sqrt{3}$ et $z' = 3 \cos(\frac{\pi}{6}) + i3 \sin(\frac{\pi}{6}) (= 3e^{i\frac{\pi}{6}})$.

- Placer ces points dans le plan complexe et calculer : $|z|$, $|z'|$, $\arg z$, $\arg z'$, $\operatorname{Re}(z')$, $\operatorname{Im}(z')$.
- Calculer les nombres complexes suivants : $z + z'$, zz' , z^2 , z/z' , $1/z'$. (*) Placer ces points dans le plan complexe.

Exercice 3. (*) Soient z et z' deux nombres complexes. Démontrer que :

- $\operatorname{Re}(\bar{z}) = \operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(\bar{z}) = -\operatorname{Im}(z)$, $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$, $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$, $\operatorname{Re}(z + z') = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(z')$
- $\overline{(zz')} = \bar{z}\bar{z}'$, $|zz'| = |z||z'|$, $|z + z'|^2 = |z|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{z}') + |z'|^2$ (c) $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$, $|z + z'| \leq |z| + |z'|$