



**Cinvestav**

Centro de Investigación y de Estudios  
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional  
Unidad Guadalajara

## **Tarea 3. Consenso en sistemas de alto orden**

Presentado por

**Jesús Alejandro Díaz Hernández**

Presentado para el curso de  
Tópicos avanzados de control 2


Curso impartido por: Héctor Manuel Becerra Fermín  
Profesor

Guadalajara, Jalisco

29 de mayo de 2024

## Pregunta 1.-

Inciso a)



Inciso b)

Según la proposición 2.9 que dice (traducido al español): considerando el grafo  $\mathcal{G}$  con  $n$  vértices y  $n - 1$  aristas, entonces  $\det L_v = 1$  si solo si  $\mathcal{G}$  es un árbol de expansión.

Como esta proposición se cumple, es decir,  $\det L_v = 1$ , sabemos que el grafo no solo tiene un árbol de expansión, sino que es un árbol de expansión.

Inciso c)

Los valores propios de la matriz Laplaciana **negativa** son

$$\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

### Inciso d)

Utilizando la ecuación 6 del paper, se puede inferir que proponiendo donde se quiera tener las raíces se puede usar la forma en monomios como

$$(\lambda + 2)(\lambda^2 + 1)$$

cuyas raíces son las deseadas  $[-2 \quad i \quad -i]$  al extender la operación queda como

$$\lambda^3 + 2\lambda + \lambda + 2$$

y entonces de allí podemos observar que las ganancias  $\gamma$  corresponderían a  $[2 \quad 1 \quad 3]$

### Inciso e)

Con estas ganancias  $\gamma$  no se consigue consenso como se muestra a continuación




Figure 1: Posición (izquierda), Velocidad (derecha)




Figure 2: Aceleración

**Inciso f)**

Las ganancias para alcanzar los valores del caso dos son  $\gamma = [1 \ 2 \ 3]$

**Inciso g)**




Figure 3: Posición (izquierda), Velocidad (derecha)




Figure 4: Aceleración

### Inciso h)


Para calcular los valores de consenso para largos valores de  $t$  los términos dominantes en  $e^{\Gamma t}$  son

$$\begin{bmatrix} 1p^T & t1p^T & \frac{1}{2}t^21p^T \\ 0 & 1p^T & t1p^T \\ 0 & 0 & 1p^T \end{bmatrix}$$

considerando que  $p^T = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$  y que elegí las condiciones iniciales como números consecutivos del 1 al 12, podemos calcular los valores de consenso como  $\frac{9t^2}{2} + 5t + 1$  para posición,  $9t + 5$  para velocidad y 9 para aceleración, los cuales sí coinciden con los observados en la simulación. **Nota:** originalmente probé con valores aleatorios como condiciones iniciales, pero el cálculo de valores de consenso se volvía muy complicado debido a valores fraccionarios, así que utilice estos valores para mayor facilidad de lectura.

## Pregunta 2.-

El grafo no dirigido es



a)

La matriz Laplaciana del grafo modificado es

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

b)

Los valores propios de la matriz Laplaciana negativa son

$$\begin{bmatrix} 0 \\ -.5858 \\ -2 \\ -3.4142 \end{bmatrix}$$

c)

Tomando en consideración la ecuación  $\lambda^3 - \gamma_2\mu\lambda^2 - \gamma_1\mu\lambda - \gamma_0\mu = 0$  al realizar el análisis bajo el criterio de Routh-Hurwitz y como  $\mu$  son los eigenvalores de  $-L$  obtenemos la siguiente tabla

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & \gamma_1\mu \\ s^2 & \gamma_2\mu & \gamma_0 \\ s^1 & b_1 & 0 \end{array}$$

Donde

$$b_1 = -\frac{\gamma_0 - \gamma_2\gamma_1\mu^2}{\gamma_2\mu}$$

La tabla la podríamos continuar, pero de aquí podemos establecer la condición una condición para estabilidad como  $\gamma_0 < \gamma_2\gamma_1\mu^2$ , por lo que puedo elegir las ganancias como  $\gamma = [1 \quad 2 \quad 3]$  y cumplir con ella.

d)

Implementando el control con las ganancias mencionadas en el punto anterior obtenemos




Figure 5: Posición (izquierda), Velocidad (derecha)






Figure 6: Aceleración

e)

No es posible utilizar ganancias arbitrarias debido a que como ya vimos en el inciso c, existe la condición  $\gamma_0 < \gamma_2 \gamma_1 \mu^2$ , además se puede observar por la ecuación de solución  $e^{\Gamma t}$  y  $\Gamma$  se ve afectada por la selección de las ganancias  $\gamma$  es decir se podría elegir algunas tales que la exponencial sea creciente.

f)

Nuevamente el vector  $p^T = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$ . Calculando los valores de consenso con las mismas condiciones iniciales que en la pregunta 1 obtenemos los valores de consenso como  $\frac{9t^2}{2} + 5t + 1$  para posición,  $9t + 5$  para velocidad y 9 para aceleración, los cuales sí coinciden con los observados en la simulación.

### Pregunta 3.-

Podemos concluir que la elección de ganancias influye directamente en la estabilidad del sistema, afectando su capacidad para alcanzar el consenso. Además, la diferencia entre el grafo dirigido y el no dirigido no es significativa en este contexto. Sin embargo, si se incrementaran las conexiones en el grafo no dirigido, se obtendría una conectividad algebraica mayor, lo que resultaría en un consenso más rápido.

### Anexo (código usado)

```
1  clc
2  clearvars
3  close all
4
5  %Matriz de grado
6  %Primer punto
7  D=[0 0 0 0;
8     0 1 0 0;
9     0 0 1 0;
10    0 0 0 1;];
11 %Segundo punto
12 % D=[1 0 0 0;
13 %     0 2 0 0;
14 %     0 0 2 0;
15 %     0 0 0 1;];
16
17 %Matriz de adyacencia
18 %Primer punto
19 A=[0 0 0 0;
20    1 0 0 0;
21    0 1 0 0;
22    0 0 1 0;];
23 %Segundo punto
24 % A=[0 1 0 0;
25 %     1 0 1 0;
26 %     0 1 0 1;
27 %     0 0 1 0;];
28
29
30 %hago el objeto grafo, pero aun no lo ploteo
31 G=digraph(A');
32 % G=graph(A);
33
34
35 %Nodos
36 n=size(A,1);
37
38 %Laplaciano
39 L=D-A
40
41 %Calculo de los eigenvalores
42 eig(-L)
43
```

```

44 %Formo la matriz Gama
45 n=size(L,1);
46 l=3; %Posicion, velocidad, aceleracion
47 gammas=[1 2 3];%defino mis valores de gamma
48
49 Gamma=zeros(l*n,l*n); %Inicializo la matriz Gamma
50 I=eye(n);
51
52 %relleno la matriz Gamma
53 for i = 1:l-1
54     Gamma((i-1)*n+1:i*n, i*n+1:(i+1)*n) = I;
55 end
56
57 % Rellenar la ultima fila de bloques de Gamma
58 Gamma((l-1)*n+1:l*n, :) = [-gammas(1)*L, -gammas(2)*L, -gammas(3)*L
59     ];
60
61 %Hago el producto Kronecker
62 m=1; %dimensiones que estoy considerando
63 Im=eye(m);
64 Gamma_kron= kron(Gamma,Im);
65
66 % Esta parte es para la simulacion del sistema
67 %Valores iniciales
68 xi0=[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12];%Guardo los valores iniciales para
69     referencia
70 % xi0=rand(size(Gamma_kron,1),1);%Guardo los valores iniciales para
71     referencia
72 xi=xi0;%Uso estos valores en la aproximacion de Euler
73
74 %periodo de muestreo
75 Dt=0.01;
76 tiempo=25; %segundos
77 iteraciones=tiempo/Dt;
78
79 %Simulo el sistema
80 for k=1:iteraciones
81
82     %Aproximacion de Euler con Gammakron
83     xi(:,k+1)=xi(:,k)+Dt*(Gamma_kron*xi(:,k));
84
85 end
86
87 %Calculo de consensos
88 syms t;
89 Uno=ones(n,1);
90 Cero=zeros(n,n);
91 p=[1;0;0;0];
92 egamma=[Uno*p' t*Uno*p' (1/2)*(t^2)*Uno*p';
93         Cero Uno*p' t*Uno*p';
94         Cero Cero Uno*p'];
95 Consenso=egamma*xi0
96
97 %Vectores de tiempo para graficar
98 t=linspace(0,tiempo,iteraciones+1);

```

```

98 te=linspace(0,tiempo,iteraciones);
99
100 figure
101 subplot(1,2,1)
102 plot(t,xi(1:4,:))
103 grid on
104
105 subplot(1,2,2)
106 plot(t,xi(5:8,:))
107 grid on
108
109
110 figure
111 plot(t,xi(9:12,:))
112 grid on
113
114 figure
115 % plot(G, 'Layout', 'force', 'EdgeLabel', G.Edges.Weight);
116 plot(G);

```