

Badanie przebiegu zmienności funkcji

Przemysław Sankowski

19.01.2018

Spis treści

1 Wprowadzenie

Żeby uzyskać przebieg zmienności funkcji należy wyznaczyć:

1. Dziedzinę.
2. Miejsca zerowe.
3. Punkt przecięcia z osią Oy.
4. Granice na krańcach dziedziny.
5. Asymptoty.
6. Przedziały monotoniczności.
7. Ekstrema.
8. Przedziały wklęsłości i wypukłości.
9. Punkty przegięcia.

Do badania powyższych własności używamy drugiej pochodnej funkcji. Na końcu rysujemy wykres funkcji i odczytujemy z niego zbiór wartości funkcji.

Na przykład rozwiązania weźmy funkcję:

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 2} + 1$$

2 Wyznaczenie dziedziny funkcji

$$x^2 - 2 = 0 \quad (1)$$

$$x^2 = 2 \quad (2)$$

$$x = -\sqrt{2} \quad \vee \quad x = \sqrt{2} \quad (3)$$

A zatem dziedzina funkcji to:

$$\mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$$

3 Wyznaczenie miejsc zerowych funkcji

$$\frac{1}{x^2 - 2} + 1 = 0 \quad (4)$$

$$\frac{1}{x^2 - 2} = -1 \quad (5)$$

$$1 = -(x^2 - 2) \quad (6)$$

$$x^2 = 1 \quad (7)$$

$$x = 1 \quad \vee \quad x = -1 \quad (8)$$

4 Wyznaczenie punktu przecięcia z osią Oy

$$f(0) = \frac{1}{0^2 - 2} + 1 = \frac{1}{-2} + 1 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} \quad (9)$$

Zatem punkt przecięcia z osią Oy to:

$$\left(0, \frac{1}{2}\right)$$

5 Wyznaczenie granic dziedziny

Należy wyznaczyć granice funkcji w $+\infty$ i $-\infty$ oraz dla x 'ów przerywających ciągłość funkcji, czyli dla krawędzi tej części funkcji, która znajduje się poza dziedziną. W naszym przypadku to $x = \sqrt{2}$ i $x = -\sqrt{2}$ (??).

Zacznijmy od granic w nieskończonościach:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2 - 2} + 1 \right) = \left[\frac{1}{+\infty} + 1 \right] = [0 + 1] = 1 \quad (10)$$

$$\lim_{n \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x^2 - 2} + 1 \right) = \left[\frac{1}{-\infty} + 1 \right] = [0 + 1] = 1 \quad (11)$$

Otrzymujemy w ten sposób asymptotę poziomą wyrażoną wzorem $y = 1$. Teraz obliczamy granicę w punktach nieciągłości. Zacznijmy od granicy lewostronnej z $\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^-} \left(\frac{1}{x^2 - 2} + 1 \right) = \left[\frac{1}{\sqrt{2}^- - 2} + 1 \right] = \left[\frac{1}{0^-} + 1 \right] = (12) \\ &= [-\infty + 1] = -\infty \end{aligned}$$

Następnie granicę prawostronną z $\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^+} \left(\frac{1}{x^2 - 2} + 1 \right) = \left[\frac{1}{\sqrt{2}^+ - 2} + 1 \right] = \left[\frac{1}{0^+} + 1 \right] = (13) \\ &= [+\infty + 1] = +\infty \end{aligned}$$

Ze względu na to, że granice wyliczone w powyższych równaniach są różne, granica dla $x = \sqrt{2}$ nie istnieje.

Następnie należy wyliczyć granicę dla $x = -\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}^-} \left(\frac{1}{x^2 - 2} + 1 \right) = \left[\frac{1}{-\sqrt{2}^- - 2} + 1 \right] = \left[\frac{1}{2^+ - 2} + 1 \right] = (14) \\ &= \left[\frac{1}{0^+} + 1 \right] = [+\infty + 1] = +\infty \quad (15) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}^+} \left(\frac{1}{x^2 - 2} + 1 \right) = \left[\frac{1}{-\sqrt{2}^+ - 2} + 1 \right] = \left[\frac{1}{0^-} + 1 \right] = (16) \\ &= [-\infty + 1] = -\infty\end{aligned}$$

Granica dla $x = -\sqrt{2}$ również nie istnieje.

6 Wyznaczenie asymptot

Asymptoty pionowe to proste pionowe przechodzące przez punkty nieciągłości funkcji, czyli znajdujące się w $x = -\sqrt{2}$ i $x = \sqrt{2}$ (??)

Asymptoty poziome istnieją, jeżeli granice w $+\infty$ i $-\infty$ istnieją i nie są nieskończone. Z równań (??) i (??) wynika, że asymptota pionowa istnieje, a jej wartość to $y = 1$.

W tym przykładzie **asymptoty ukośne** nie istnieją, ale normalnie wyznaczamy je wzorami:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= a \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) &= b\end{aligned}$$

Jeśli obie te granice są skończone, to **asymptota ukośna prawostronna** opisana jest równaniem:

$$y = ax + b$$

Tak samo obliczamy **asymptotę ukośną lewostronną**, tylko że liczymy granice w $-\infty$.

7 Wyznaczenie przedziałów monotoniczności

Aby wyznaczyć przedziały monotoniczności (oraz ekstrema) musimy obliczyć pochodną funkcji.

$$f'(x) = \left(\frac{1}{x^2 - 2} + 1 \right)' = \frac{-2x}{(x^2 - 2)^2} \quad (17)$$

Aby policzyć pochodną skorzystaliśmy ze wzorów z [?] Funkcja $f(x)$ jest **rosnąca** jeśli $f'(x) > 0$, **malejąca** natomiast kiedy $f'(x) < 0$, należy więc rozwiązać obie te nierówności.

$$f'(x) > 0 \rightarrow \frac{-2x}{(x^2 - 2)^2} > 0 \rightarrow -2x > 0 \rightarrow x < 0 \quad (18)$$

$$f'(x) < 0 \rightarrow \frac{-2x}{(x^2 - 2)^2} < 0 \rightarrow -2x < 0 \rightarrow x > 0 \quad (19)$$

Z powyższych równań wynika, że funkcja jest rosnąca dla $x \in (-\infty; 0)$, a malejąca dla $x \in (0; +\infty)$

8 Wyznaczenie ekstremów

Do obliczenia ekstremów potrzebujemy pochodnej, którą wyliczyliśmy już w równaniu ???. Funkcja może mieć ekstremum tylko w tych miejscach gdzie jej pochodna się zeruje. Dodatkowo aby ekstremum istniało, to funkcja musi w danym punkcie zmienić monotoniczność. Mogą być dwie sytuacje:

- o Jeśli funkcja była rosnąca i w pewnym momencie zaczyna maleć, to mamy ekstremum maksimum (wykres lokalnie przypomina górkę)
 - o Jeśli funkcja była malejąca i w pewnym momencie zaczyna rosnąć, to mamy ekstremum minimum (wykres lokalnie przypomina dolinę)
- Zaczynamy od znalezienia x 'ów dla których $f'(x) = 0$, liczymy więc.

$$f'(x) = 0 \rightarrow \frac{-2x}{(x^2 - 2)^2} = 0 \rightarrow -2x = 0 \rightarrow x = 0 \quad (20)$$

Następnie należy sprawdzić, czy funkcja w punkcie $x = 0$ zmienia monotoniczność.

Ustaliliśmy już, że dla $x \in (-\infty; 0)$ funkcja $f(x)$ jest rosnąca, a dla $x \in (0; +\infty)$ - malejąca, zatem jest to ekstremum minimum, którego wartość należy wyliczyć z równania $f(0)$:

$$f'(0) = \frac{1}{0^2 - 2} + 1 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} \quad (21)$$

9 Wyznaczenie przedziałów wklęsłości i wypukłości

Aby wyznaczyć przedziały wklęsłości i wypukłości (oraz punkty przegięcia), to musimy obliczyć drugą pochodną funkcji. Zatem liczymy:

$$f''(x) = \left(\frac{-2x}{(x^2 - 2)^2} \right)' = \dots = \frac{6x^4 - 8x^2 - 8}{(x^2 - 2)^4} \quad (22)$$

Ponownie skorzystaliśmy z wzorów z [?]

Funkcja $f(x)$ jest **wypukła** kiedy $f''(x) > 0$, a **wklęsła** kiedy $f''(x) < 0$.

Na początku wyznaczymy przedziały w których funkcja jest wypukła, czyli rozwiążemy nierówność:

$$\begin{aligned} f''(x) > 0 &\rightarrow \frac{6x^4 - 8x^2 - 8}{(x^2 - 2)^4} > 0 \rightarrow 6x^4 - 8x^2 - 8 > 0 \rightarrow \quad (23) \\ &\rightarrow 6x^4 - 8x^2 - 8 = 0 \rightarrow t = x^2 [t > 0] \rightarrow 6t^2 - 8t - 8 = 0 \\ &\Delta = 64 - 4 * 6 * (-8) = 256 \\ &\sqrt{\Delta} = 16 \\ &t_1 = -\frac{8}{12} < 0 \\ &t_2 = 2 < 0 \\ &x^2 = 2 \rightarrow x = \sqrt{2} \cup x = -\sqrt{2} \end{aligned}$$

Zatem miejsca zerowe funkcji $y = 6x^4 - 8x^2 - 8$ to $-\sqrt{2}$ i $\sqrt{2}$. Następnie musimy naszkicować wykres tej funkcji (Rysunek ??).

Rysunek 1: Piękny wykresik

Rysunek 2: Wykres całej funkcji

Z wykresu możemy odczytać gdzie funkcja jest większa od 0, z czego otrzymujemy:

$$6x^4 - 8x^2 - 8 > 0 \text{ dla } x \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty)$$

To znaczy, że funkcja jest wypukła dla $x \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty)$.

Również z wykresu możemy wywnioskować, że funkcja jest wklęsła dla $x \in (-\sqrt{2}; \sqrt{2})$

10 Wyznaczenie punktów przegięcia

Punkty przegięcia występują w tych miejscach, w których funkcja zmienia wypukłość. Żeby je znaleźć, to należy rozwiązać równanie:

$$f''(x) = 0 \quad (24)$$

Z równania (23) wynika, że $x = -\sqrt{2} \cup x = \sqrt{2}$.

Oznacza to, że w tych punktach funkcja zmienia wypukłość, czyli teoretycznie są to punkty przegięcia, ale... Niestety nie należą one do dziedziny - na początku wyliczyliśmy, że dziedzina to: $\mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$. Z czego płynie wniosek, że nasza funkcja $f(x)$ nie ma punktów przegięcia.

Na koniec rysujemy jeszcze wykres funkcji i odczytujemy z niego zbiór wartości.

Zgodnie z (Rysunek ?? - następna strona) zbiór wartości funkcji to:

$$\left(-\infty; \frac{1}{2}\right) \cup (1; +\infty) \quad (25)$$

Artykuł napisany na podstawie [?]