Simulado 07/10

I. Cardiopata (prótese valvar), problema renal, problemas periodontais abaixo da gengiva
↳ Antibiótico → Amoxi 500 mg → 21 cp...
↳ Devido ao problema sistêmico ↳ 2 de dose de ataque!!
↳ Paracetamol 750
↳ Clorex 0,12%
* Fugir do AI por conta do problema renal

II. Criança 9 anos, 20 kg, Síndrome de Down, colaboradora, extrações de decíduo 55
UI ↳ Ibuprofeno 200 mg/ml — 15 ml
↳ 20 gotas 6/6 h, 3 dias
UE - 1. Clorex 0,12%
↳ 15 ml (1 colher de sopa) 3x ao dia

III. 34 anos, histórico de gastrite, extração do 45 por motivo ortodôntico
↳ Anti-inflamatório não é 100% necessário, somente em complicações → meloxicam, nimesulida, coxibes
UI. 1. Paracetamol 750 mg → 12 cp
↳ 1 cp, 6/6 h, 3 dias
UE. 1. Clorex 0,12
↳ ...

(sem problemas de saúde)
IV. 30 anos, hígido, após endo 36, paciente volta c/ vermelhidão, febre e dor, medicado c/ amoxicilina, cetoprofeno e dipirona
↳ Potencializar o antibiótico ou complementar c/ metronidazol
UI. 1. Amoxi 500 mg + clavulanato de potássio 125 mg — 21 cp
↳ 2 cp inicialmente e 1 cp 8/8 h, 7 dias
2. Codeína 15 mg ——— 12 cp.
↳ 1 cp 6/6 h, 3 dias
* Pode considerar injetável p/ resolver dor

V. 34 anos, diabético, s/ problemas sistêmicos, ansioso, n/ utiliza outros medicamentos, 3º molar retido
UI. 1. Paracetamol 750 mg ——— 12 cp.
↳ 6/6 h, 3 dias
2. Nimesulida 100 mg ——— 06 cp.
↳ 12/12 h, 3 dias

3. Dexametasona 4 mg ——— 1 cp.
↳ Tomar 01 cp antes do procedimento
* Não precisa de antibiótico, a não ser que a diabete não esteja controlada, mas não é errado prescrever
UE. 1. Clorex...
Receita tipo B.
↳ Midazolam, 1 cp 15 mg, 1h antes da consulta.
* Procedimentos complexos, pode-se utilizar o antiansiolítico

VI. 35 anos, raízes residuais c/ infecção localmente ao redor dos restos radiculares
* Antibiótico → localmente não precisa!
UI. 1. Paracetamol 750 mg ——— 12 cp
2. Nimesulida 100 mg ——— 06 cp
* Não é 100% necessário
UE ...

VII. 20 anos, 3os molares inclusos e impactados
UI. 1. Paracetamol 750 mg 12 cp
2. Nimesulida 06 cp
3. Dexametasona 4 mg ——— 1 cp.
↳ 1 cp
UE. 1. Clorex...

VIII. 10 anos, 25 Kg, extração 73 e 83, diabético não compensado
UI. 1. Amoxicilina 250 mg/5 ml
↳ 8 ml, 8/8h, 7 dias
2. Ibuprofeno 100 mg/ml
↳ 25 gotas, 6/6h, 3 dias
UE. Clorex 0,12%.
↳ ...

IX. 35 anos, drenagem de abcesso extraoral
UI. 1. Amoxi 500 mg + clavulanato 125 mg – 21 cp
↳ 8/8h, 7 dias
2. Paracetamol 750 mg ——— 12 cp