**caso 1**
uso interno:
1-amoxicilina 500 mg + clavulanato de potássio 125 mg ————————————————————————
21cp
tomar de 8 em 8 horas por 7 dias
2-paracetamol 750 mg ————————————12cp
tomar de 6 em 6 horas por 3 dias

**caso 2**
uso interno:
1-dexametasona 4 mg ————————————-1 cp
tomar de 1 comprimido 1 hora antes do procedimento
2-paracetamol 750 mg————————————12cp
tomar de 6 em 6 horas por 3 dias
3-nimesulida 100 mg————————————6cp
tomar de 12 em 12 horas por 3 dias
uso externo:
1-digluconato de clorexidina 0,12% ————100ml
fazer bochecho com 1 colher de sopa 3 vezes ao dia durante 3 dias

**caso 3**
uso interno:
1-eritromicina 500 mg ————————————30 cp
tomar 2 cp 1 hora antes da cirurgia e o restante de 6 em 6 horas durante 7 dias
2-paracetamol 500 mg————————————12cp
tomar de 6 em 6 horas por 3 dias
uso externo:
1-digluconato de clorexidina 0,12%————100ml
fazer bochecho com 1 colher de sopa 3 vezes ao dia durante 3 dias

**caso 4**
uso interno:
1-paracetamol 750 mg————————————-12cp
tomar de 6 em 6 horas por 3 dias
2-aciclovir 50 mg ————————————- bisnaga 10 gr
aplicar 5 vezes ao dia de 4 em 4 horas no período diurno durante 7 dias

**caso 5**
uso interno:
1-paracetamol 500 mg————————————— 12cp

tomar de 6 em 6 horas durante 3 dias
2-lorazepam 1 mg———————————— 1cp
tomar 1 hora antes da cirurgia
uso externo:
1-digluconato de clorexidina 0,12%—— 100ml
fazer bochecho com 1 colher de sopa 3 vezes ao dia durante 3 dias

## PROVA ANTIGA 2022

**caso 1**
**questão 1**
uso interno:
1-dexametasona 4mg ———————————1cp
tomar 1 hora antes da cirurgia
**questão 2**
uso interno:
1-midazolam 15mg———————————1cp
tomar 1 hora antes do procedimento

**caso 2**
uso interno:
1- amoxicilina 500mg + clavulanato de potássio 125 mg ———————————————————- 21 cp
tomar de 8 em 8 horas por 7 dias
2- paracetamol 750mg ———————————12 cp
tomar de 6 em 6 horas por 3 dias

**caso 3**
uso externo:
1- cetoprofeno 100mg/2ml ————————1 ampola
aplicação via intramuscular

**caso 4**
uso interno:
1- codeína 15mg ———————————12 p
tomar de 6 em 6 horas por 3 dias

**caso 5**
uso interno:
1- amoxicilina 250mg/ 5ml ———————— 1 frasco
tomar 6ml de 8 em 8 horas por 7 dias

2-ibuprofeno 100 mg/ml ———————1 frasco
tomar 18 gotas de 6 em 6 horas por 3 dias
uso externo:
1-digluconato de clorexidina 0,12% ———— 100ml
fazer bochecho 1 colher de sopa 3 vezes por dia

**caso 6**
uso interno:
1-cetoconazol 200mg ———————————— 14cp
tomar 1 comprimido por dia por 14 dias

**caso 7**
1- lorazepam 2mg ———————————1cp
tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento
2- paracetamol 500mg ———————————12cp
tomar de 6 horas em 6 horas por 3 dias
3- nimesulida 100mg———————————6 cp
tomar de 12 em 12 horas por 3 dias