Receita 1:

Uso Interno

1- Amoxicilina 500mg+Clavulanato de potássio 125mg----------21cp

Tome 1cp a cada 8 horas durante 7 dias.

2- Paracetamol 750mg----------12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Receita 2:

Uso Interno

1- Paracetamol 750mg----------12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

2- Nimesulida 100mg----------6cp.

Tome 1 cp de 12 em 12 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1- Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia

Receita 3:

Uso Interno

1- Amoxicilina 500mg ----------21cp

Tome 2cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.

2- Paracetamol 750mg----------12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1- Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Receita 4:

Uso Interno

1- Amoxicilina 500mg ----------21cp

Tome 2cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.

2- Paracetamol 750mg----------12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

3- Nimesulida 100mg----------6cp.

Tome 1 cp de 12 em 12 horas durante 3 dias.

4- 1- Dexametasona 4mg ----------1cp

Tome 1cp 1 hora antes do atendimento.

Uso Externo:

1- Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Receita 5:

Uso Interno

1- Paracetamol 500mg----------12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1- Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.



Receita 6:

Uso Interno

1-Amoxicilina 500mg ---------- 21cp

Tome 2cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.

2-Paracetamol 750mg ---------- 12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1-Digluconato de clorexidina 0,12% ----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Receita 7:

Uso Interno

1-Ibuprofeno 200mg/ml ---------- 15ml

Tome 20 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1-Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Receita 8:

Uso Interno

1-Paracetamol 750mg ---------- 12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1-Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Receita 9:

Uso Interno

1-Amoxicilina 500mg + Cavulanato de potássio 125mg ---------- 21cp

Tome 2cp inicialmente e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.

2-Codeina 15mg ---------- 12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Receita 10:

Uso Interno

1-Paracetamol 750mg ---------- 12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

2-Nimesulida 100mg ---------- 6cp.

Tome 1 cp de 12 em 12 horas durante 3 dias.


3-Dexametasona 4mg ----------1cp

Tome 1cp 1 hora antes do atendimento.

Uso Externo:

1-Digluconato de clorexidina 0,12% ----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.


NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF: PR | NÚMERO: XXXX | B2

19 de 08 de 2009

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dr. EDIJILSON ILO LISBOA
CRO 14266 - PR
Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário.
Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX

B

Paciente: Fulano de Tal

Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

Estudante Ilo Lisboa
Assinatura do Emitente

MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA: Midazolan

QUANTIDADE E FORMA FARMACÊUTICA: 1 comprimido

DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA: 15mg

POSOLOGIA: 1 hora antes da consulta

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:
Endereço:
Telefone:
Identidade nº: Órgão Expedidor:

CARIMBO DO FORNECEDOR

Nome do Vendedor | Data

Dados da Gráfica (Nome - Endereço Completo - CNPJ)

Numeração desta impressão de a

Receita 11:

Uso Interno

1-Paracetamol 750mg ---------- 12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

2- Nimesulida 100mg ---------- 6cp.

Tome 1 cp de 12 em 12 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1-Digluconato de clorexidina 0,12% ----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Receita 12:

Uso Interno

1-Paracetamol 750mg ---------- 12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

2-Nimesulida 100mg ---------- 6cp.

Tome 1 cp de 12 em 12 horas durante 3 dias.

3-Dexametasona 4mg ---------- 1cp

Tome 1cp 1 hora antes do atendimento.

Uso Externo:

1-Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Receita 13:

Uso Interno

1-Amoxicilina 250mg/ 5ml ----------1Cx

Tome 8 ml de 8 em 8h durante 7 dias.

2- Ibuprofeno 100mg/ml ----------1Frasco

Tome 25 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1-Digluconato de clorexidina 0,12% ----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.