TIPO DE MEDICAMENTO	NOME	INDICAÇÃO	CONTRA-INDICAÇÃO	EXEMPLO DE POSOLOGIA
Analgésico	Paracetamol	Gestantes e lactantes, crianças, idosos	Pacientes com uso de varfarina sódica (anticoagulante). Pode causar hemorragia	▪ Criança – "gotas" com 200 mg/mL): 1 gota/kg/peso ▪ Adulto – 750 mg (1 cp) de 6h/6h durante 3 dias ▪ Idoso – 500 mg (1 cp) de 6h/6h durante 3 dias
Analgésico e antiinflamatório	Ibuprofeno	Principalmente crianças	Pacientes com uso de varfarina sódica (anticoagulante)	▪ Criança – "gotas" com 100 mg/ml: 1 gota/Kg/peso de 6h/6h durante 3 dias
Analgésico opióide	Codeína	Dor persistente: paciente está usando paracetamol e permanece com dor	Gestantes e lactantes, crianças	▪ Adulto – 15 mg (1 cp) de 6h/6h durante 3 dias
Antiinflamatório (AINE)	Nimesulida	Quadro inflamatório	Gestantes e lactantes, crianças, pacientes com uso de varfarina sódica (anticoagulante), diabetes não controlada, problemas sistêmicos, idosos	▪ Adulto – 100 mg (1 cp) de 12h/12h durante 3 dias
Antiinflamatório (corticóide)	Dexametasona	Pacientes com problemas de hemostasia, gestantes e lactantes, pacientes hipertensos, diabéticos com a doença controlada. Normalmente usado em cirurgias complexas e programadas em dose única	Pacientes com infecções fúngicas sistêmicas, herpes simples ocular, doenças psicóticas, tuberculose ativa, problemas sistêmicos, criança (pode, mas preferir ibuprofeno), idosos	▪ Adulto – 4mg (1 cp) 1 hora antes da cirurgia
Antisséptico bucal	Digluconato de clorexidina	Após procedimentos que afetam tecidos bucais de crianças, adultos e idosos	–	▪ Digluconato de clorexidina a 0,12%. 100 ml – bochechos com uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias
Sedação	Midazolam	Pacientes ansiosos em dose única antes de procedimentos de adultos	Crianças, preferir utilizar Dormire	▪ Adulto – 15 mg (1 cp) 1 hora antes da consulta
Sedação	Lorazepam	Pacientes ansiosos em dose única antes de procedimentos de idosos	Crianças	▪ Idoso – 1 mg (1 cp) 1 hora antes da consulta
Antifúngico	Fluconazol	Paciente a qual antifúngicos tópicos e higiene oral não foram eficientes	–	▪ 100 mg (1 cp) por dia durante 14 dias
Antibiótico	Clindamicina	Pacientes alérgicos a penicilinas	–	▪ Adulto: 600 mg (2 cp) 1 hora antes, 300 mg (1 cp) de 8h/8h durante 7 dias ▪ Profilaxia adulto: 600 mg (2 cp)
Antibiótico	Amoxicilina	Enxertos, procedimentos muito extensos, cardiopata, problemas sistêmicos, diabetes não compensadas	Implantes unitários, infecções localizadas, pacientes saudáveis	▪ Adulto – 1g (2 cp) 1 hora antes, 500 mg (1 cp) de 8h/8h durante 7 dias ▪ Criança – 250 mg/5ml: 0,32 ml/Kg/peso de 8h/8h durante 7 dias ▪ Profilaxia adulto – 2g (4 cp) em dose única antes do procedimento
Anti beta-lactamase	Clavulanato de potássio	Associado a amoxilina, potencializando seu efeito	–	Adulto – 250 mg (2 cp) 1 hora antes, 125 mg (1 cp) de 8h/8h durante 7 dias

