
ANTI-INFLAMATÓRIO	DERIVADO	DOSE USUAL	AÇÃO	INDICADO	OBSERVAÇÕES
PIROXICAM	Oxican	1 comprimido ou injetável de 24/24h. 10 a 20 mg	Atua pela inibição não específica da COX-1 e COX-2	Dor pós-traumática e pós-operatória Anti-iflamatório, analgésico e antitérmico	
MELOXICAM	Oxican	1 comprimido ou injetável de 24/24h. 7.5 a 15 mg	Atua pela inibição de COX-1 e COX-2 (com certa seletividade)	Dor pós-traumática e pós-operatória Anti-iflamatório, analgésico e antitérmico	
DICLOFENACO POTÁSSICO/SÓDICO	Ácido acético	1 comprimido de 8/8h. 75 a 100 mg	Atua pela inibição não específica da COX-1 e COX-2	Adulto e crianças acima de 14 anos Anti-inflamatório, analgésico e antitérmico	
IBUPROFENO	Ácido propiônico	1 comprimido de 8/8h ou 6/6h. 600 mg	Atua pela inibição não específica da COX-1 e COX-2	Fraco anti-inflamatório, analgésico e antitérmico Função antiagregante plaquetário – ações antitromboembólicas	
CETOPROFENO	Ácido propiônico	1 comprimido de 6/6h. 50 mg	Atua pela inibição não específica da COX-1 e COX-2	Fraco anti-inflamatório, analgésico e antitérmico Função antiagregante plaquetário – ações antitromboembólicas	
NAXOPROFENO	Ácido propiônico	Comprimidos de 250mg: tomar 1 comprimido, 1 a 2 vezes ao dia Comprimidos de 500mg: tomar 1 comprimido, 1 vez ao dia Não utilizar por mais de 10 dias	Atua pela inibição não específica da COX-1 e COX-2	Fraco anti-inflamatório, analgésico e antitérmico Função antiagregante plaquetário – ações antitromboembólicas	
NIMESULIDA	Fenoximetanossulfanilida	½ a 1 comprimido (50 a 100 mg) de 12-12h	Atua pela inibição de COX-1 e COX-2 (seletivamente)	Analgésico, anti-inflamatório	Bem tolerada por crianças, adultos e idosos



ANTI-INFLAMATÓRIO	DERIVADO	DOSE USUAL	AÇÃO	INDICADO	OBSERVAÇÕES
CELECOXIBE	Coxibe	A dose recomendada de celecoxibe é de 400 mg, inicialmente, seguidos de uma dose de 200 mg, após 12 horas se necessário, por via oral, no primeiro dia do tratamento Nos dias subsequentes, a dose recomendada é de 200 mg duas vezes ao dia, conforme necessário, o que geralmente são 3 dias	Atua pela inibição de COX-1 e COX-2 (seletivamente)	Potente anti-inflamatório e antirreumático, mas também é utilizado em a nalgesia.	
ETORICOXIBE	Coxibe	A dose recomendada é de 60 mg ou 90 mg uma vez ao dia A mínima dose eficaz é de 60 mg uma vez ao dia Em alguns pacientes, 90 mg uma vez ao dia pode proporcionar um aumento do benefício terapêutico	Atua pela inibição de COX-1 e COX-2 (seletivamente)	Alívio da dor crônica e aguda e tratamento da dor aguda pós- operatória moderada a grave associada à cirurgia odontológ ica	
LUMIRACOXIBE	Coxibe	400 mg, uma vez ao dia para o tratamento da dor aguda, por no máximo 10 dias	Atua pela inibição de COX-1 e COX-2 (seletivamente)		Acumula-se em locais inflamados. Retirado do mercado
DEXAMETASONA	Corticóide	4mg – comprimidos posologia: 1 a 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento cirúrgico	Bloqueio duplo da cascata do ácido araquidônico	Agentes paliativos no controle d a inflamação, isto é, não combatem sua causa, mas r eduzem o processo inflamatório em uma magnitude clinicamente relevante	
BETAMETASONA	Corticóide	2 mg - comprimidos posologia: 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento cirúrgico	Bloqueio duplo da cascata do ácido araquidônico	Agentes paliativos no controle d a inflamação, isto é, não combatem sua causa, mas r eduzem o processo inflamatório em uma magnitude clinicamente relevante	

