CASOS CLÍNICOS

❖ EM TODAS AS RECEITAS

- ❖ Palavra “receita”.
- ❖ Nomear e enumerar os medicamento em “Uso interno” e “uso externo”.
- ❖ Assinar, colocar CRO (inventar) e colocar a data.
- ❖ Não deixar espaços nem para baixo, nem para o lado, minimizando o risco de modificações.

❖ CASO 1:

- Paciente com 35 anos, necessita drenagem de abcesso extraoral.
- Faça a receita: 1 pós-operatória e indique quais medicamentos que vão ser usados no paciente.

Uso interno

1. Amoxicilina 500mg + clavulanato de potássio 125 mg ---------- 21 cp.
   Tome 1 comprimido a cada 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp.
   1 comprimido a cada 6 em 6 horas por 3 dias.







- Tratamento endodôntico mal efetuado.
- Foi anestesiado o local ao redor. Anestesia local pelo lado externo do paciente em vários pontos.
- Cortar com um bisturi e com uma pinça hemostática, colocar nesse orifício que você fez e divulsionar o tecido.
- Forma vários grumos.
- O paciente tem duas sensações: a de alívio por tirar a pressão e a de dor pois dói para fazer esse procedimento já que a anestesia não é profunda.
- Quando tem esse tipo de infecção que invade a parte inferior do rosto, com o aumento de volume, se essa infecção começar a drenar pela fáscia, cai pelos grandes vasos e pode dar uma septicemia no paciente, e o paciente pode vir a falecer.
- É bom deixar a pele um pouco aberta com algum material que mantenha aquela abertura aberta para você continuar drenando com o tempo, pois o pus vai ser formado de novo.
- Vamos evitar da antinflamatório quando há processo infeccioso. Pois essa inflamação ali vai ajudar no processo de cicatrização.
- Vamos evitar o uso de corticoides quando há processo infeccioso. Pois ele baixa a imunidade e pode piorar o processo infeccioso.
- Pode dar dipirona, ibuprofeno em vez do paracetamol.
- Não vamos receitar clorexidina pois não mexemos no dente.

❖ CASO 2:

- Paciente com 20 anos, com fratura no elemento 11, necessita extração, o qual foi planejado com antecedência devido a não ter lesão e estar planejado implante em sessão única.

Uso interno

1. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp.
   Tome 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.
2. Nimesulida 100 mg ---------- 6 cp.
   Tome 1 comprimido de 12 em 12 horas durante 3 dias.

Uso externo

1. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
   Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3X ao dia, a cada 8 em 8 horas, durante 7 dias.



- Vamos dar o Nimesulida por conta do implante, como vamos mexer em tecido, vamos dar antinflamatório então.
- Sempre que tiver procedimento interno que seja cirúrgico (periodontal, extração, aumento de coroa, ou seja, qualquer situação que envolva tecidos) temos que passar o digluconato de clorexidina para o paciente. O resto dos medicamentos irão servir para melhorar sintomas do paciente.
- Nesse caso, vamos extrair esse dente (cuidando para não fraturar parede óssea vestibular), abrir a gengiva, expor esse osso, colocar o implante e então fazer um ponto em cima para retomar o tecido. Podemos colocar um provisório para não perder o colo. Se perdermos essa parte da forma da gengiva é muito difícil retomar a estética.
- Poderia ter sido dado dexametasona pré-operatório, aí mantem o analgésico pós-operatório. Por conta que a cirurgia foi planejada.

❖ CASO 3:

- Paciente com 43 anos necessita de raspagem subgengival, o paciente é diabético o qual não consegue chegar no limítrofe da normalidade e com pressão levemente alterada.

Uso interno

1. Amoxicilina 500mg ---------- 21 cp.
   Tome 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento e 1 comprimido após o procedimento, de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp.
   1 comprimido a cada 6 em 6 horas por 3 dias.



Uso externo

3. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
   Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3X ao dia.

- Não usamos o antinflamatório pois não vamos mexer com tecido e osso.
- Paciente possui problema periodontal grave. Paracetamol para dor.
- Vamos precisar tirar todo o material que está infectado ali abaixo da gengiva, isso causa um sangramento contundente (raspagem subgengival).
- Essa profundidade de sulco está muito aumentada. A ideia é tirar toda essa sujeira e recuperar esse espaço.

- Vamos prescrever antibiótico por conta da diabetes não controlada. Se fosse controlada não precisaria usar antibiótico.
- Poderia dar um metronidazol.
- Poderia passar um antinflamatório, mas teria que tirar o analgésico.
- Dexametasona: muito exagerado. Não possui expectativa de uma inflamação muito grande.
- Vou causar uma bacteremia no paciente, por isso vou dar dois comprimidos de amoxicilina 1 hora antes do procedimento.
- Inflamação: quando você mexe em tecido e osso por um tempo considerável.

❖ **CASO 4:**


- Paciente com 32 anos necessita de enxerto ósseo na região do elemento 14, será efetuada na mesma sessão o implante.

Uso interno

1. Amoxicilina 500 mg ---------- 21 cp.
   Tome 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento e após o procedimento tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp.
   Tome 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.
3. Nimesulida 100 mg ---------- 6 cp.
   Tome 1 comprimido de 12 em 12 horas durante 3 dias.
4. Dexametasona 4 mg ---------- 1 cp.
   Tome 1 comprimido 1 hora antes do atendimento.

Uso externo

1. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
   Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3X ao dia.



- Para usar clavulanato, o paciente precisa ter um problema sistêmico.
- Antibiótico: por conta da possibilidade de rejeição que existe por ser um enxerto.
- Analgésico: pode ser uma codeína pois o paciente pode sentir muita dor.
- Corticoide pré-operatório.
- Antinflamatório pós-operatório.
- Tenho que inibir o processo inflamatório antes da cirurgia e depois da cirurgia, como mexeu muito tecido, preciso diminuir esse processo.
- Todos esses medicamentos vamos dar em casos de 3° molar, exceto o antibiótico.

❖ **CASO 5:**

- Paciente com 51 anos necessita de implante no elemento 11. Paciente ansioso.

Uso Interno

1. Paracetamol 500mg----------12cp
   Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:


2. Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml
   Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.



❖ CASO 6:

- Paciente cardiopata (usa prótese valvar) doente renal necessita raspagem em campo aberto (abertura gengival cirúrgica), pois apresenta bolsas gengivais profundas.





RECEITA

USO INTERNO

1 – amoxicilina 500mg ----------21 cp

Tome 2 cp 1h antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias

2 – paracetamol 750 mg ----------12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas por 3 dias.

USO EXTERNO

1 – Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3X ao dia, por 7 dias.

COMENTÁRIOS

*O antibiótico é por ser cardiopata e ainda mais, por utilizar prótese dentária.

*No caso do antibiótico, pode utilizar 4 comprimidos antes do procedimento e não utilizar nada no pós.

*Se tem um paciente com problema renal, não precisa utilizar antibiótico, apenas se for um transplantado renal.

*Se o paciente tiver um problemas sistêmico, deve-se dar um antibiótico pré-operatório.

*Se fosse, esse paciente, em um caso de extração, utilizaria um corticoide pré-operatório e não iria prescrever o antibiótico. Lembrar que extração geralmente não precisa antibiótico.

*Processo inflamatório e corticoides por 3 dias é o suficiente.

❖ CASO 7:

- Paciente menor de idade (9anos) 20kg, com necessidade especiais (síndrome de Down), colaborador, necessita de extração do elemento 55, paciente relatou alergia a penicilina.



RECEITA

USO INTERNO

1 – Ibuprofeno 200mg/ml ----------15ml

Tome 20 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.

USO EXTERNO

1 – Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3X ao dia, por 7 dias.

COMENTÁRIOS

*É uma extração simples.

*Lembrar que precisa colocar ibuprofeno **200mg/ml.**

*Raspagem, implante simples, extração simples não tem muita inflamação, não precisa de anti-inflamatório e corticoides. Entretanto, tratamentos endodônticos complexos, extração de terceiros molares, múltiplos implantes e enxertos ósseos são situações que se esperam um inchaço, edema e inflamação. Mas não necessariamente necessita de anti-inflamatório.

6 *Se utilizar corticoide antes, utiliza Antinflamatórios não esteroidais depois.

*pacientes com ulceras não utilizar nenhum tipo de anti-inflamatório. (NÃO UTILIZAR PFV).

❖ CASO 8:

- Paciente com 34 anos, pacientes apresenta-se com gastrite, sem outros problemas sistêmicos, não usuário de outro medicamento, necessita extração do elemento 45 por motivo ortodôntico.



RECEITA

USO INTERNO

1 – Paracetamol 750mg ----------12 cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

USO EXTERNO

1 – Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3X ao dia, por 7 dias.

❖ CASO 9:

- Paciente com 30 anos, hígido, após a endodontia do elemento 36, volta ao consultório com vermelhidão no local, febre e dor, pacientes encontra-se medicado com amoxicilina, cetoprofeno e dipirona.



Abscesso Dentário

RECEITA

USO INTERNO

1 – Codeína 15mg ----------12cp.

Tome 1 cp de 6 em 6 durante 3 dias.

2 – amoxicilina 500mg + clavulanato de potássio 125mg ---------- 21cp.

Tome 2cp inicialmente e 1 cp após de 8 em 8h durante 7 dias

COMENTÁRIOS

*Não receitar corticoide e anti-inflamatórios em pacientes com infecção grande, pois pode piorar.

*Nesse caso precisa potencializar o efeito dos medicamentos antigos.

*Pode substituir a amoxicilina, por uma com clavulanato associado ou pode manter a amoxicilina e receitar ainda o metronidazol.

*Por ser uma lesão externa, não necessita de clorexidina 0,12%.

❖ CASO 10:

- Paciente com 34 anos, diabético e sem problemas sistêmicos, ansiosa, não usuário de outro medicamento, necessita de terceiro molar incluso e retiro.







RECEITA

USO INTERNO

1 - paracetamol 750 mg ----------12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas por 3 dias.

2 – Nimesulida 100mg ---------- 6 cp

Tome 1 cp de 12 em 12 h durante 3 dias.

3 – Dexametasona 4mg ----------1cp

Tome 1cp 1 hora antes do atendimento.

4 – Midazolam 15 mg---------- 1 cp.

Tome 1 cp 1h antes do procedimento.

USO EXTERNO

1 – Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3X ao dia, por 7 dias.


NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF: PR | NÚMERO: XXXX | B2

19 de 08 de 2009

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dr. EDIUILSON ILO LISBOA
CRO 14286 - PR
Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário.
Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX

B

Paciente: Fulano de Tal

Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA: Midazolan

QUANTIDADE E FORMA FARMACÊUTICA: 1 comprimido

DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA: 15mg

POSOLOGIA: 1 hora antes da consulta

Ediuilson Ilo Lisbôa
Assinatura do Emitente

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:
Endereço:
Telefone:
Identidade nº: Órgão Expedidor:

CARIMBO DO FORNECEDOR

Nome do Vendedor | Data

Dados da Gráfica (Nome - Endereço Completo - CNPJ)

Numeração desta impressão de a

COMENTÁRIOS

*Não precisa de antibiótico, pois não é diabético descompensado.

*Se fosse um paciente com diabete descompensada, com endocardite bacteriana iria necessitar de uma dose de ataque de antibiótico. Mas não precisa prolongar o antibiótico para depois.

❖ CASO 11:

- Pacientes com 35 anos necessita de extração de raízes residuais com focos infecciosos.



RECEITA

USO INTERNO

1 – Paracetamol 750mg ---------- 12cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas, durante 3 dias.

2 – Nimesulida 100mg----------6cp

Tome 1 cp de 12 em 12 horas, durante 3 dias.

USO EXTERNO

1 – Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100ml

Faça bochechos com uma medida de uma colher de sopa, 3X ao dia, durante 7 dias.

❖ CASO 12:

- Paciente com 20 anos, necessita de extração de 3 molares, dente está incluso e impactado.



RECEITA

USO INTERNO

1 – Paracetamol 750mg ---------- 12 cp

Tome 1 cp de 6 em 6 horas, durante 3 dias.

2 – nimesulida 100mg ---------- 6 cp

Tome 1 comprimido de 12 em 12 horas, durante 3 dias.

3 – Dexametasona 4mg ----------1 cp

Tome 1 cp 1 hora antes do atendimento.

USO EXTERNO

1 – Digluconato de clorexidina 0,12% ----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia, durante 7 dias.

❖ CASO 13:

- Paciente com 10 anos 25 kg necessita de extração de elementos 73 e 83, paciente é diabético não compensado.

RECEITA

USO INTERNO

1 – paracetamol ~~750mg~~ 200/ml ---------- 1 frasco

Tome 25 gotas de 6 em 6 horas, durante 3 dias.

2 – amoxicilina 250mg/5ml ---------- 1 caixa

Tome 8ml de 8 em 8 horas durante 7 dias.

USO EXTERNO

1 – Digluconato de clorexidina 0,12% ----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia, durante 7 dias.