ANTIGAS

1. Paciente com 6 anos, 15 kg, diabético controlado, necessita extração do elemento 51 e 52 devido a um trauma. Indique quais medicamentos, dosagem e posologia que devem ser usados no paciente:

Uso Interno:

1. Paracetamol 200mg/ml----------1 frasco

Tomar 15 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1. Digluconato de Clorexidina 0,12%----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

2. Paciente com 60 anos, com cirurgia onde foi colocado uma prótese valvar com o tempo de 8 meses, necessita extração do elemento 45 devido a fratura do mesmo. Indique quais medicamentos, dosagem e posologia que devem ser usados no paciente:

Uso Interno:

1. Amoxicilina 500mg----------21 cp

Tomar 4 cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.

2. Paracetamol 500mg----------12 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

3. Paciente com 21 anos necessita de extração dos elementos 38 e 48 impactados e retidos, o paciente é alérgico a penicilina. Indique quais medicamentos, dosagem e posologia que devem ser usados no paciente:

Uso Interno:

1. Dexametasona 4mg ---------- 1 comprimido

Tomar 1 cp 1 hora antes do procedimento.

2. Paracetamol 750mg----------12 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas por 3 dias.

3. Nimesulida 100mg ----------6 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 3 dias.

Uso Externo:

1. Digluconato de Clorexidina 0,12%----------100ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

4. Paciente com 21 anos necessita de extração dos elementos 25 e 15, devido a planejamento ortodôntico, o paciente é ansioso e com histórico de úlcera péptica. Indique quais medicamentos, dosagem e posologia que devem ser usados no paciente:

Uso Interno:

1. Midazolam 15mg----------1 comprimido

Tomar 1 comprimido 1 horas antes do procedimento.

2. Paracetamol 750mg----------12 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1. Digluconato de Clorexidina 0,12%----------100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

5. Paciente com gravidez de 4 meses, necessita endodontia do elemento 36, com infecção no elemento, edema na área externa na região de ângulo de mandíbula sem ponto de flutuação para a drenagem imediata e ainda dor. Indique quais medicamentos, dosagem e posologia que devem ser usados no paciente:
Uso Interno:
1. Amoxicilina 500mg + Clavulanato de Potássio 125mg ----------21 cp
Tomar 4 cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 750mg ----------12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

6. Paciente adulto após 1 dia retorna ao consultório depois de extração dentária do elemento 24, o qual foi tecnicamente difícil e demorou-se 2 horas na cirurgia, sem infecção, mas apesar de estar usando analgésico dipirona e Piroxicam, reclama de não controlar a dor. Indique uma alternativa para sanar a dor do paciente:
Uso Interno:
1. Paracetamol 500 mg + Codeína 30mg ----------12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

7. Paciente HIV positivo, sem a manifestação da doença e com contagem de carga viral zerada necessita retirar uma raiz residual sem infecção. Indique quais medicamentos, dosagem e posologia que devem ser usados no paciente:
Uso Interno:
1. Paracetamol 750mg ----------12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas por 3 dias.
2. Nimesulida 100 mg ----------6 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12%----------100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

OBS: se tivesse carga viral teria que administrar um antibiótico com dose de ataque e uso posterior ao procedimento.

8. Paciente idoso necessita ansiolítico para cirurgia de colocação de implantes, prescreve um ansiolítico, dosagem e posologia para o paciente:
Uso Interno:
1. Lorazepam 1mg----------1 comprimido
Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento.

CASOS CLÍNICOS PROFESSOR

1. Paciente com 35 anos, necessita de drenagem de abcesso extraoral:
Uso Interno:
1. Amoxicilina 500mg + Clavulanato de potássio 125mg ----------21 cp

Tomar 1 cp de 8 em 8 horas por 7 dias.
2. Paracetamol 750mg ----------12 comprimidos
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

2. Paciente com 20 anos, com fratura no elemento 11, necessita extração, o qual foi planejado com antecedência devido a não ter lesão e estar planejado implante em sessão única.
Uso Interno:
1. Paracetamol 750 mg ----------12 comprimidos
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas por 3 dias.
2. Nimesulida 100 mg----------6 comprimidos
Tomar 1 cp de 12 em 12 horas por 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

3. Paciente com 42 anos necessita de raspagem subgengival, o paciente é diabético o qual não consegue chegar no limítrofe da normalidade e com pressão levemente alterada:
Uso Interno:
1. Amoxicilina 500mg ----------21 cp
Tomar 4 cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas.
2. Paracetamol 750 mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas por 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

4. Paciente com 32 anos necessita de enxerto ósseo na região do elemento 14, será efetuada na mesma sessão um implante:
Uso Interno:
1. Dexametasona 4mg ---------- 1 comprimido.
Tomar 1 cp 1 hora antes do procedimento.
2. Amoxicilina 500mg ---------- 21 cp.
Tomar 4 cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.
3. Paracetamol 750 mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.
4. Nimesulida100 mg ---------- 6 comprimidos.
Tomar 1 cp de 12 em 12 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.
OBS: se o implante não fosse na mesma sessão tiraria o Amoxicilina.

5. Paciente com 51 anos necessita de implante no elemento 11. Paciente é ansioso:
Uso Interno:
1. Paracetamol 750 mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

2. Midazolam 15mg ---------- 1 comprimido
Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

CASOS CLÍNICOS PROFESSOR

1. Paciente cardiopata (usa prótese valvar) doente renal necessita raspagem em campo aberto (abertura gengival cirúrgica), pois apresenta bolsas gengivais profundas:
Uso Interno:
1. Amoxicilina 500 mg ---------- 21 comprimidos
Tomar 4 cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 500 mg ----------12 comprimidos
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

2. Paciente menor de idade (9 anos) 20kg, com necessidades especiais (Síndrome de Down), colaborador, necessita extração do elemento 55, paciente relatou apresentar alergia a penicilinas:
Uso Interno:
1. Paracetamol 200mg/ml ---------- 1 frasco
Tomar 20 gostas de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

3. Paciente com 34 anos, apresenta-se com gastrite, sem outros problemas sistêmicos, não usuário de outro medicamento, necessita extração do elemento 45 por motivo ortodôntico:
Uso Interno:
1. Paracetamol 750 mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.
Uso Externo:
1. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

4. Paciente com 30 anos, hígido, após endodontia do elemento 36, volta ao consultório com vermelhidão no local, febre e dor. Paciente encontra-se medicado com amoxicilina, Cetoprofeno e dipirona:
Uso Interno:
1. Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de potássio 125 mg ---------- 21 comprimidos
Tomar 1 cp de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 500mg + Codeína 30mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

5. Paciente com 34 anos, diabético e sem problemas sistêmicos, ansioso, não usuário de outro medicamento, necessita cirurgia de terceiro molar incluso e retido:

Uso Interno:

1. Dexametasona 4mg ---------- 1 comprimido

Tomar 1 cp 1 hora antes do procedimento.

2. Paracetamol 750 mg ---------- 12 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

3. Nimesulida 100 mg---------- 6 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas durante 3 dias.

4. Midazolam 15 mg ---------- 1 comprimido

Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento.

Uso Externo:

1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

6. Paciente com 35 anos necessita de extração de raízes residuais com focos infecciosos:

Uso Interno:

1. Nimesulida 100 mg ---------- 6 comprimidos

Tomar 1 cp de 12 em 12 horas durante 3 dias.

2. Paracetamol 750 mg ---------- 12 comprimidos

Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

7. Paciente com 20 anos, necessita de extração dos 3 molares, dente está incluso e impactado:

Uso Interno:

1. Dexametasona 4mg ---------- 1 comprimido

Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento.

2. Paracetamol 750 mg ---------- 12 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

3. Nimesulida 100 mg ---------- 6 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

8. Paciente com 10 anos 25 kg necessita de extração dos elementos 73 e 83, paciente é diabético não compensado:

Uso Interno:

1. Amoxicilina 250mg/5ml ---------- 1 frasco

Tomar 16 ml 1 hora antes do procedimento e 8ml após de 8 em 8 horas durante 7 dias.

2. Paracetamol 200mg/ml ---------- 1 frasco

Tomar 25 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:

1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

CASOS CLÍNICOS DOS SLIDES DE RECEITUÁRIO

1. Paciente com 34 anos, sem problemas sistêmicos, não usuário de outro medicamento, necessita de cirurgia de elemento normal com foco infeccioso:

Uso Interno:
1. Paracetamol 750 mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

2. Paciente com 30 anos, hígido com necessidade de extração dos 4 terceiros molares, com necessidade de remoção ósseo, sem infecção no local:

Uso Interno:
1. Dexametasona 4mg ---------- 1 comprimido
Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento
2. Paracetamol 750mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.
3. Nimesulida 100 mg ---------- 6 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

3. Paciente com 30 anos, hígido com necessidade de extração dos 4 terceiros molares, com necessidade de remoção ósseo, sem infecção no local e ansioso:

Uso Interno:
1. Dexametasona 4mg ---------- 1 comprimido
Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento
2. Paracetamol 750mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.
3. Nimesulida 100 mg ---------- 6 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas durante 3 dias.
4. Midazolam 15mg ---------- 1 comprimido
Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

4. Paciente com 30 anos, hígido, ansioso, após extração dos 4 terceiros molares, com necessidade de remoção óssea, sem infecção no local retorna com dor ainda:

Uso Interno:
1. Paracetamol 500mg + Codeína 30mg ---------- 12 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

5. Paciente com 8 anos, 20 kg, dente hígido, necessita de extração do elemento 51, sem infecção no local:
Uso Interno:
1. Paracetamol 200mg/ml ---------- 1 frasco
Tomar 20 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

6. Paciente com 34 anos, sem problemas sistêmicos, não usuário de outro medicamento, necessita cirurgia de terceiro molar, com foco infeccioso, alérgico a penicilina e diabético:
Uso Interno:
1. Dexametasona 4 mg ---------- 1 comprimido
Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento.
2. Paracetamol 750 mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.
3. Nimesulida 100 mg ---------- 6 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

OUTROS CASOS

1. Paciente com 35 anos, diabético controlado, necessita implante maxilar (2 implantes) e ao mesmo tempo vai ser feito enxerto ósseo no seio maxilar advindo do ângulo da mandíbula:
Uso Interno:
1. Amoxicilina 500mg ---------- 21 comprimidos
Tomar 2 cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Dexametasona 4mg ---------- 1 comprimido
Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento.
3. Paracetamol 750mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.
4. Nimesulida 100mg ---------- 6 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

2. Paciente com 10 anos e 30kg com necrose e abcesso com celulite e edema no elemento 36. Irá ser realizada uma abertura coronária, o paciente apresenta-se ainda com dor e febre:
Uso Interno:
1. Amoxicilina 250mg/5ml + Clavulanato de Potássio 62,5mg/5ml ---------- 1 frasco
Tomar 20ml 1 hora antes do procedimento e 10ml após de 8 em 8 horas durante 7 dias.

3. Paracetamol 200mg/ml ---------- 1 frasco
Tomar 30 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

3. Paciente com 21 anos necessita de extração dos elementos 38 e 48, não impactados e retidos, o paciente é doente renal:
Uso Interno:
1. Paracetamol 500mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 4 em 4 horas durante 3 dias.
2. Dexametasona 4mg ---------- 1 comprimido
Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

4. Paciente com 21 anos necessita de extração dos elementos 38 e 48, não impactados e não retidos, o paciente é ansioso e com histórico de epilepsia:
Uso Interno:
1. Dexametasona 4mg ---------- 1 comprimido
Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento.
2. Paracetamol 750mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.
3. Nimesulida 100mg ---------- 6 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

OBS: não pode administra o ansiolítico devido interação com o antiepilético.

5. Paciente com 35 anos, necessita drenagem de abcesso extraoral:
Uso Interno:
1. Amoxicilina 500mg + Clavulanato de Potássio 125mg ---------- 21 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 750mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

6. Paciente com 12 anos e 35 kg necessita de extração dos elementos 73 e 83, paciente é diabético:
Uso Interno:
1. Paracetamol 750mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

7. Paciente com 51 anos necessita de raspagem periodontal subgengival, paciente é doente renal, cardiopata e diabético:

Uso Interno:
1. Amoxicilina 500mg ---------- 21 cp
Tomar 4 cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 750mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.
3. Midazolam 15mg ---------- 1 cp
Tomar 1 cp 1 hora antes do procedimento.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

OUTRA PROVA

1.Paciente A.S, masculino, 18 anos aparece em seu consultório para extração do elemento 48 incluso e retido (será necessário remoção de osso e o corte do dente com brocas), paciente é transplantado renal e toma corticoide de forma contínua, você marcou para o dia seguinte a cirurgia:

Uso Interno:
1. Amoxicilina 500mg ---------- 21 comprimidos
Tomar 4 cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 750mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

OBS: se não fosse transplantado renal não precisaria do Amoxicilina

2. Paciente P.A masculino 32 anos apresenta-se em seu consultório, no exame clínico foi constado uma periodontite severa do elemento 48. Descreva a sua conduta medicamentosa para o caso:

Uso Interno:
1. Paracetamol 750mg ----------12 comprimidos
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12%---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

OBS: Pericoronarite severa passa mais o antibiótico.

3. Paciente A. M. S feminino aparece em seu consultório, necessita fazer uma cirurgia de extração do elemento 34 e 44 devido a indicação ortodôntica. Paciente mostrou-se extremamente tensa e ansiosa. A paciente foi marcada para o dia seguinte:

Uso Interno:
1. Midazolam 15mg ---------- 1 comprimido
Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento.
2. Paracetamol 750mg ---------- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

4. Paciente menor de idade A. L (10 anos) 38 kg, necessita extração do elemento 55:
Uso Interno:
1. Paracetamol 200mg/ml ---------- 1 frasco
Tomar 35 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100 ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

5. Paciente F.L 4 anos, 20kg aparece no consultório queixando-se de dor, na anamnese foi constato que a paciente é alérgica a penicilinas, no exame clínico foi encontrado na região do elemento 54 somente raízes residuais e foco infeccioso, paciente relata problema cardíaco congênito grave:
Uso Interno:
1. Eritromicina 250mg/5ml ---------- 1 frasco
Tomar 6,7 ml de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 200mg/ml ---------- 1 frasco
Tomar 20 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

6. Paciente diabético, compareceu a clínica apresentando quadro intenso de candidíase no palato, usa prótese total superior. Descreva a conduta medicamentosa para o caso:
Uso Interno:
1. Cetoconazol 200mg ---------- 14 comprimidos
Tomar 1 comprimido no mesmo horário durante 14 dias.

3ª PROVA 2022

1. Paciente A. S., masculino, 18 anos, aparece em seu consultório para extração dos elementos 38 e 48 incluso e retido (será necessário remoção de osso e abertura de tecido), paciente na anamnese não foi constato nenhum problema sistêmico e nem alergia a quaisquer medicamentos. Você marcou para subsequente cirurgia. Indique os medicamentos pré-operatórios para o caso.
Receita
Ao senhor: A. S
Endereço: Rua Universitária 1402- Cascavel/PR

Uso Interno:
1. Dexametasona 4mg ---------- 1cp.
Tomar 1 cp uma hora antes do procedimento.

Natalia Denuzzi
CRO-PR: 10.696
Cascavel, 27 de julho de 2022.

OBS: nesse caso eu poderia dar um analgésico (Paracetamol 750 ou Dipirona 500) no pré também.

2. No caso descrito na questão 1. Indique os medicamentos que serão utilizados no pós-operatório:
Receita
Ao senhor: A. S
Endereço: Rua Universitária

Uso Interno:
1. Paracetamol 750mg ---------- 12 cp.
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.
2. Nimesulida 100mg ---------- 6 cp
Tomar 1cp de 12 em 12 horas durante 3 dias.
Uso Externo:
1. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100ml.
Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

Natalia Denuzzi
CRO-PR: 10.696
Cascavel, 27 de julho de 2022.

3. Paciente P. A., masculino 32 anos apresenta-se em seu consultório, no exame clínico foi constato abscesso periodontal no dente 36 o qual necessita ser drenado por via intraoral. Na mesma sessão será feita abertura coronária e medicação intra canal. Indique os medicamentos para o caso:
Receita
Ao senhor: P. A
Endereço: Rua Universitária, 1402- Cascavel/PR

Uso Interno:
1. Paracetamol 750mg ---------- 12 cp.
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Natalia Denuzzi
CRO-PR: 10.696
Cascavel, 27 de julho de 2022.

4. No caso descrito na questão 3 se o paciente necessitasse de uma drenagem extra oral e apresentasse: edema, vermelhidão, febril, tenso e ansioso. Indique os medicamentos para o caso:
Receita
Ao senhor: P.A

Endereço: Rua Universitária, 1402- Cascavel/PR

Uso Interno:
1. Amoxicilina 500mg + Clavulanato de Potássio 125mg ---------- 21 cp.
Tomar 1 cp de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 750mg ---------- 12 cp.
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Natalia Denuzzi
CRO-PR: 10.696
Cascavel, 27 de julho de 2022.

OBS: AINE são vai piorar, porque diminui a imunidade do paciente, podendo causar hiperinfecção.


NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF: PR | NÚMERO: XXXX | B2

19 de 08 de 2009

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Dr. EDIUILSON ILO LISBOA
CRO 14286 - PR
Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário.
Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX
B

Paciente: Fulano de Tal

Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

Ediudson Ilo Lisboa
Assinatura do Emitente

MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA: Midazolan

QUANTIDADE E FORMA FARMACÊUTICA: 1 comprimido

DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA: 15mg

POSOLOGIA: 1 hora antes da consulta

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR
Nome:
Endereço:
Telefone:
Identidade nº: Órgão Expedidor:

CARIMBO DO FORNECEDOR
Nome do Vendedor | Data

Dados da Gráfica (Nome - Endereço Completo - CNPJ)

Numeração desta impressão de a

5. Paciente R. N. S., feminino, apresenta-se em seu consultório descrevendo que foi a um posto de saúde e que restaurou o elemento 21 e este não para de doer, mesmo tomando um AINE indicado pelo dentista, foi diagnosticado pulpite irreversível (polpa inflamada com indicação de endodontia), no momento você não pode atender o paciente, apenas receitar medicamentos para melhorar os sintomas. Indique os medicamentos para o caso:
Receita
A senhora: R. N. S
Endereço: Rua Universitária, 1402- Cascavel/PR

Uso Interno:
1. Paracetamol 500mg + Codeína 30mg ---------- 12 cp
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Natalia Denuzzi
CRO-PR: 10.696
Cascavel, 27 de julho de 2022.

6. Paciente F. I. L., 8 anos, 18kg, aparece no consultório queixando-se de dor, no exame clínico foi encontrado o dente 36 com necrose pulpar, com infecção invasiva (celulite), mostrando-se edemaciada e atingindo a

região sublingual. Depois de feita a anestesia, foi drenado o abscesso, o paciente foi liberado da consulta com a receita para pegar na UBS. Indique os medicamentos para o caso:

Receita
Ao senhor: F. I. L.
Endereço: Rua Universitária, 1402. Cascavel/PR

Uso Interno:
1. Amoxicilina 250mg/5ml + Clavulanato de Potássio 62,5 mg ---------- 1 frasco.
Tomar 6 ml de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 200mg/ml ---------- 1 frasco.
Tomar 18 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.
3. Cetoprofeno 20mg/ml ---------- 1 frasco.
Tomar 18 gotas 1x ao dia durante 3 dias.

Natalia Denuzzi
CRO-PR: 10.696
Cascavel, 27 de julho de 2022.

7. Paciente M.N., idosa, necessita extração dos elementos 41, 42, 31, 32 e 33 com comprometimento periodontal severo. Na anamnese paciente relata que tem endocardite infecciosa e é alérgica a penicilina:

Receita
À senhora: M. N
Endereço: Rua Universitária, 1402- Cascavel/PR

Uso Interno:
1. Clindamicina 300mg ---------- 21 cp
Tomar 2 cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2. Paracetamol 500mg ---------- 12 cp
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.
Uso Externo:
1. Digluconato de Clorexidina 0,12% ---------- 100ml.
Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia durante 7 dias.

Natalia Denuzzi
CRO-PR: 10.696
Cascavel, 27 de julho de 2022.

8. Paciente de 18 anos com herpes labial em estágio inicial, precisa de um medicamento para alívio da dor e diminuição do tempo de infecção. Indique os medicamentos para o caso:

Receita
Ao senhor: Fulano de Tal
Endereço: Rua Universitária,1402- Cascavel/PR

Uso Interno:
1. Aciclovir creme 50mg/g ---------- 1 frasco.
Aplicar, com as mãos limpas, 5x ao dia, com intervalos de 4 horas, suprindo as doses noturnas durante 7 dias.

Natalia Denuzzi

CRO: 10.696-PR
Cascavel, 27 de julho de 2022.

9. Paciente 51 anos com Candidose oral severa, já efetuada as orientações de higiene e medicado com antifúngico tópico. Em retorno as medidas foram pouco efetivas, necessitando medicamento sistêmico. Indique os medicamentos para o caso:

Receita
Ao senhor: Fulano de Tal
Endereço: Rua Universitária, 1402- Cascavel/PR

Uso Interno:
1. Cetoconazol 200mg ----------14 cp
Tomar 1 cp por dia, no mesmo horário, durante 14 dias.

Natalia Denuzzi
CRO: 10.696-PR
Cascavel, 27 de julho de 2022.

10. Paciente com 65 anos. Precisa 2 implantes dentários. Sem enxertos ósseos ou aplicação de osso heterogêneo. Na anamnese não apresenta nenhum problema sistêmico. Relata ter muita ansiedade. Indique os medicamentos para o caso:

Receita
Ao senhor: Fulano de Tal
Endereço: Rua Universitária, 1402- Cascavel/PR

Uso Interno:
1. Dexametasona 4mg---------- 1cp.
Tomar 1cp 1 hora antes do procedimento.
2. Paracetamol 500mg ---------- 12 cp.
Tomar 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Natalia Denuzzi
CRO: 10.696-PR
Cascavel, 27 de julho de 2022.

Lorazepam 1 mg
1 cp
Tomar 1 hora antes do procedimento

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF: PR | NÚMERO: XXXX | **B2**

19 de 08 de 2009

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dr. EDIUILSON ILO LISBOA
CRO 14286 - PR
Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário.
Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX

B

Paciente: Fulano de Tal

Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA

Midazolan

QUANTIDADE E FORMA FARMACÊUTICA

1 comprimido

DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA

15mg

POSOLOGIA

1 hora antes da consulta

Ediudson Ilo Lisboa

Assinatura do Emitente

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Telefone: _____

Identidade nº: _____ Órgão Expedidor: _____

CARIMBO DO FORNECEDOR

Nome do Vendedor _____ Data _____

Dados da Gráfica (Nome - Endereço Completo - CNPJ)

Numeração desta impressão de _____ a _____