CASO 01

- Paciente com 20 anos, com fratura no elemento 11, necessita extração, o qual foi planejado com antecedência devido a não ter lesão e estar planejado implante em sessão única

*considerações: não precisa de antibiótico e nem de corticóide pois é um procedimento simples e de um único elemento

Receita

Uso interno:

01. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

02. Nimesulida 100 mg ---------- 6 cp

Tomar 1 cp de 12h/12h durante 3 dias

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias

CASO 02

- Paciente com 42 anos, necessita de raspagem subgengival, diabético a qual não consegue chegar no limítrofe da normalidade e com pressão levemente alterada

*considerações: diabético e hipertenso não compensada precisa de antibiótico. Problemas sistêmicos como estes, tiramos antiinflamatório

Receita

Uso interno:

01. Amoxilina 500 mg ---------- 21 cp

Tomar 2 cp 1 hora antes do procedimento e, após, tomar 1 cp de 8h/8h durante 7 dias

02. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias

CASO 03

- Paciente com 32 anos necessita de enxerto ósseo na região do elemento 14, será efetuada na mesma sessão implante

*considerações: enxerto ósseo é um procedimento complexo. Como ele precisa estar o mais estéril possível, usar antibiótico. Pode aplicar corticóide em dose única antes devido a extensão do procedimento

Receita

Uso interno:

01. Amoxilina 500 mg ---------- 21 cp

Tomar 2 cp 1 hora antes do procedimento e, após, tomar 1 cp de 8h/8h durante 7 dias

02. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

03. Nimesulida 100 mg ---------- 6 cp

Tomar 1 cp de 12h/12h durante 3 dias

04. Dexametasona 4 mg ---------- 1 cp

Tomar 1 cp 1 hora antes do atendimento

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias

CASO 04

- Paciente com 51 anos, necessita de implante no elemento 11. Paciente relata ser ansioso

*considerações: implante unitário, sem enxerto, não precisa de antibiótioc. Paciente ansioso e idoso, aplicar sedativo adequando

Receita

Uso interno:

01. Paracetamol 500 mg ---------- 12 cp

Tomar um cp de 6h/6h durante 3 dias

02. Lorazepam 1 mg ---------- 1 cp

Tomar um cp 1 hora antes do atendimento

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x/dia durante 7 dias

CASO 05

- Paciente cardiopata (usa prótese valvar), doente renal, idoso, necessita de raspagem em campo aberto (abertura gengival cirúrgica), pois apresenta bolsas gengivais profundas

*considerações: cardiopatias precisam de antibiótico e dose profilática, por isso a dose maior anteriormente ao procedimento. Como é idoso, evitar usar antiinflamatório

Receita

Uso interno:

01. Amoxilina 500 mg ---------- 21 cp

Tomar 4 cp 1 hora anter do procedimento e, após, tomar 1 cp de 8h/8h durante 6 dias

02. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias

CASO 06

- Paciente menor de idade (9 anos), 20 Kg, Síndrome de Down, colaborador, necessita de extração do elemento 55. Paciente relatou apresentar alergia a penicilinas

*considerações: não é porque o paciente possui condições especiais que você precisa entuchar ele de remédio. Procedimento simples, não precisa de antibiótico. Paciente não é ansioso, então não precisa de sedação. Usar ibuprofeno (analgésico + antiinflamatório) pois é mais seguro para as crianças

Receita

Uso interno:

01. Ibuprofeno 200 mg/ml ---------- 15 ml

Tomar 20 gotas de 6h/6h durante 3 dias

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias

CASO 07

- Paciente com 34 anos, apresenta gastrite, sem outros problemas sistêmicos, não usuário de outro medicamento. Necessita de extração do elemento 45 por motivos ortodônticos

*considerações: paciente possui problema sistêmico, evitar antiinflamatório. Não é necessário omeprazol pois o paciente não possui mais nenhuma alteração sistêmica nem uso de outros medicamentos

Receita

Uso interno:

01. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias

CASO 08

- Paciente com 30 anos, hígido, após endodontia do elemento 36, volta ao consultório com vermelhidão no local, febre e dor. Paciente encontra-se medicado com amoxilina, cetoprofeno e dipirona

*considerações: a medicação anterior não deu conta, então potencializar ela. A codeína vai aliviar mais a dor e o clavulanato de potássio vai potencialicar a ação da amoxilina. Antiinflamatório vai mais atrapalhar que ajudar, então não colocar

Receita

Uso interno:

01. Amoxilina 500 mg + clavulanato de potássio 125 mg ---------- 21 cp

Tomar 2 cp 1 hora antes do procedimento e, após, tomar 1 cp de 8h/8h durante 7 dias

02. Codeína 15 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

CASO 09

- Paciente com 34 anos, diabético e sem problemas sistêmico, ansioso, não usuário de outro medicamento, necessita de cirurgia de terceiro molar incluso e retido

*cirurgia complexa com movimentação óssea, passar corticóide antes. A diabetes estão controlada então podemos fazer uso de antiinflamatório. Como a cirurgia é localizada, não é necessário antibiótico. Paciente ansioso, adulto, preferir midazolam

Receita

Uso interno:

01. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

02. Nimesulida 100 mg ---------- 6 cp

Tomar 1 cp de 12h/12h durante 3 dias

03. Dexametasona 4 mg ---------- 1 cp

Tomar 1 cp 1 hora antes do atendimento

04. Midazolam 15 mg ---------- 1 cp

Tomar 1 cp 1 hora antes do atendimento

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias

CASO 10

- Paciente com 35 anos necessita de extração de raízes residuais com focos infecciosos

*é normal ter certa infecção, mas como foi citado, ela é localizada, dispensando uso de antibiótico

Receita

Uso interno

01. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

02. Nimesulida 100 mg ---------- 6 cp

Tomar 1 cp de 12h/12h durante 3 dias

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias

CASO 11

- Paciente com 10 anos, 25 Kg, necessita de extração dos elemento 73 e 83. Paciente é diabético não compensado

*diabetes não compensada precisa de antibiótico

Receita

Uso interno:

01. Amoxilina 250 mg/5ml ---------- 1 cx

Tomar 8 ml de 8h/8h durante 7 dias

02. Ibuprofeno 100 mg/ml ---------- 1 frasco

Tomar 25 gotas de 6h/6h durante 3 dias

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias

CASO 12

- Paciente, 18 anos, necessita de extração dos elementos 38 e 48 (incluso e retido). Será necessário remoção de osso e abertura de tecido. Paciente relata não possuir nenhuma alergia a medicamentos e nem problemas sistêmicos

*considerações: procedimento mais complicado, colocar corticóide antes. Procedimento não é extenso e o paciente é super saudável, então não dar antibiótico

Receita

01. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

02. Nimesulida 100 mg ---------- 6 cp

Tomar 1 cp de 12h/12h durante 3 dias

03. Dexametasona 4 mg ---------- 1 cp

Tomar 1 cp 1 hora antes do atendimento

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias

C.Q.

CASO 13

- Paciente, 32 anos, apresenta-se abcesso periodontal no dente 36 o qual necessita ser drenado via intraoral. Na mesma sessão será feita abertura coronária e medicação intra canal

*infecção localizada então dispensa antibiótico. Como o procedimento tem envolvimento com infecção mas não é sistêmica, corticoide antes e AINE depois

Receita

01. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

02. Nimesulida 100 mg ---------- 6 cp

Tomar 1 cp de 12h/12h durante 3 dias

03. Dexametasona 4 mg ---------- 1 cp

Tomar 1 cp 1 hora antes do atendimento

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias

CASO 14

- Paciente, 32 anos, apresenta-se abcesso periodontal no dente 36 o qual necessita ser drenado via extraoral. Paciente apresenta edema, vermelhidão, febril, tenso e ansioso

*problema sistêmico tira antiinflamatório. Como o caso está grave, já potencializa amoxilina

Receita

01. Amoxilina 500 mg + clavulanato de potássio 125 mg ---------- 21 cp

Tomar 2 cp 1 hora antes do procedimento e, após, tomar 1 cp de 8h/8h durante 7 dias

02. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

03. Midazolam 15 mg ---------- 1 cp

Tomar 1 cp 1 hora antes do atendimento

CASO 15

- Paciente com 65 anos, precisa de 2 implantes dentários. Sem enxertos ósseos ou aplicação de osso heterógeno. Na anamnese não apresenta nenhum problema sistêmico. Relata muita ansiedade

*considerações: ansiedade e idoso, receitar lorazepam. Sem enxerto então sem antibiótico. Como é idoso, evitar entupir o cara de antiinflamatório, principalmente corticóide

Receita

Uso interno:

01. Paracetamol 750 mg ---------- 12 cp

Tomar 1 cp de 6h/6h durante 3 dias

02. Nimesulida 100 mg ---------- 6 cp

Tomar 1 cp de 12h/12h durante 3 dias

03. Lorazepam 1 mg ---------- 1 cp

Tomar 1 cp 1 hora antes do atendimento

Uso externo:

01. Digluconato de clorexidina 0,12% ---------- 100 ml

Fazer bochechos com a medida de uma colher de sopa, 3x/dia durante 7 dias