SDD 9 - Masse ou tuméfaction pariétale

Spécialité : Chirurgie viscérale et digestive

Date : 10/01/2025
Auteur : GERVAIS Ugo (DES CVD)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES MIIC)

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	ITEM 245 – Hernie pariétale de l'adulte ITEM 195 – Douleurs abdominale aigues
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 1 – Constipation SDD 4 – Douleurs abdominales
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Patient consultant pour douleur abdominale avec tuméfaction inguinale droite

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne de garde aux urgences du CHU.
Vous recevez Mr BOULE, 78 ans, ancien boulanger. Il ne présente pas d'antécédent en dehors d'une hypertrophie bénigne de prostate.
Il se présente car il a une « boule » au niveau de l'aine à droite, qui le gêne plus que d'habitude.

Consignes :
Vous devez en 8 minutes :

- Réaliser l'examen clinique et l'interrogatoire ciblé du patient.
- Exposer votre prise en charge initiale.

Vous ne devez pas :

- Prescrire d'examen complémentaire
- Rédiger une ordonnance

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Recherche des ATCD d'étranglement herniaire	1pt	☐
2.	Recherche la présence de nausée ou de vomissement	1 pt	☐
3.	Recherche une occlusion digestive au moins un parmi (absence de selle, de gaz, abolition des BHA)	1pt	☐
4.	Demande les paramètres vitaux du patient (Pression artérielle ET pouls ET température ET saturation)	1pt	☐
5.	Palpe l'abdomen dans son intégralité (9 cadrans)	1pt	☐
6.	Palpe la hernie ET essaye de la réduire	1pt	☐
7.	Recherche une impulsivité à la toux	1pt	☐
8.	Recherche une douleur au niveau de la hernie	1pt	☐
9.	Palpe les autres orifices herniaires	1pt	☐
10.	Met le patient à jeun	1pt	☐
11.	Prescrit une sonde naso-gastrique en aspiration	1pt	☐
12.	Prescrit des antalgiques de palier 3	1pt	☐
13.	Appel du chirurgien digestif de garde pour une prise en charge chirurgicale	1pt	☐
Communications et attitudes			

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante	Performance Limite	Performance Satisfaisante	Performance Très Satisfaisante	Performance Remarquable
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	15 points

ECOS TACFA

SCRIPT PATIENT

Plan de la station ECOS :

Patient sur un brancard parlant à l'étudiant.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Script :

- Vous êtes un homme de 78 ans, sans ATCD notable. Ne prend pas de TTT. Vit seul et autonome à domicile. Pas d'éthylisme ni de tabagisme
- Vous présentez une hernie inguinale droite depuis 10 ans qui, jusque-là, ne vous gênait pas et pour laquelle aucune PEC chirurgicale n'était indiquée.
- Depuis la veille, la hernie vous fait très mal, vous n'arrivez pas à la réduire.
- Vous avez constaté un arrêt des matières et des gaz depuis la veille. Il n'y a pas de BHA.
- Vous présentez des nausées et vomissements d'allures fécaloïdes.
- Vos constantes sont TA 127/89 mmHg, pouls à 90 bpm, température 37.8°C, saturation 98% en air ambiant. Vous êtes douloureux à 7/10, non soulagé par le PARACETAMOL.
- Vous présentez une sensibilité abdominale diffuse à la palpation avec défense en hypogastre et flanc droit. La hernie est non réductible.
- Les autres orifices herniaires sont sans particularités

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)