UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Réanimation
Gestion ACR
avec patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : COURSIERES Marion Date de rédaction : 27/11/2023

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 38 – État de mort apparente

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Urgence

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Communication interprofessionnelle

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Reconnaître un arrêt cardio-respiratoire

2- Appliquer l'algorithme de réanimation cardiopulmonaire de base

Patient simulé nécessaire à la station : OUI (plutôt âgé si possible)

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin OUI
- Brancard OUI : patient sur le brancard
- ECG : donné à l'étudiant par l'infirmier :

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne à l'hôpital dans un service de gériatrie quand soudain un infirmier vous interpelle pour un patient inconscient, ne respirant plus

L'infirmier amène le scope suivant

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Analyser le document fourni par l'infirmier.
2. Indiquer à l'infirmier la conduite à tenir de manière détaillée.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Enonce ECG	3
Repère la dissociation électromécanique sur l'électrocardiogramme	5
Conclu que le rythme n'est PAS choquable	5
Dit que le patient est en arrêt cardiorespiratoire	2
Dit qu'il faut appeler le réanimateur de garde	3
Tache 2	
Demande à l'infirmier avant de démarrer la réanimation cardiopulmonaire	3
Demande le plan dur sous le patient	3
Demande à l'infirmier de dégager les voies aériennes supérieures du patient	3
Demande à l'infirmier de poser une voie veineuse et si échec une voie intra-osseuse	5
Demande à l'infirmier une fois la voie posée d'injecter de l'adrénaline immédiatement puis toutes les 3 à 5 min	5
Précise que la posologie d'adrénaline est de 1mg à chaque bolus	3
Explique à l'infirmier de cibler une fréquence de massage de 100 à 120 compressions par minute	3
Explique à l'infirmier que le sternum du patient doit s'enfoncer de 5 à 6 cm pendant la réanimation cardio-pulmonaire	3
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à coopérer avec les pairs	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1	
Enonce ECG	
Repère la dissociation électromécanique sur l'électrocardiogramme	
Conclu que le rythme n'est PAS choquable	
Dit que le patient est en arrêt cardiorespiratoire	
Dit qu'il faut appeler le réanimateur de garde	
Tache 2	
Demande à l'infirmier avant de démarrer la réanimation cardiopulmonaire	
Demande le plan dur sous le patient	
Demande à l'infirmier de dégager les voies aériennes supérieures du patient	
Demande à l'infirmier de poser une voie veineuse et si échec une voie intra-osseuse	
Demande à l'infirmier une fois la voie posée d'injecter de l'adrénaline immédiatement puis toutes les 3 à 5 min	
Précise que la posologie d'adrénaline est de 1mg à chaque bolus	
Explique à l'infirmier de cibler une fréquence de massage de 100 à 120 compressions par minute	
Explique à l'infirmier que le sternum du patient doit s'enfoncer de 5 à 6 cm pendant la réanimation cardio-pulmonaire	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à coopérer avec les pairs	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	