Complementul fata de 2. Discuție și exemple.

Matematic, REPREZENTAREA unui număr NEGATIV în complement față de doi este valoarea 2ⁿ-V, unde V este valoarea absolută a numărului reprezentat.

Complementul fata de 2. Discuție și exemple.

Matematic, reprezentarea unui număr NEGATIV în <u>complement față de doi</u> este valoarea 2ⁿ-V, unde *V* este valoarea absolută a numărului reprezentat.

1001 0011 (= 93h = 147), deci in interpretarea FARA SEMN 1001 0011= 147

Fiind un numar care incepe cu 1, în interpretarea CU SEMN, acest numar este unul negativ. Cat este valoarea lui ?

Raspuns: Valoarea sa este: — (complementul fata de 2 al configuratiei binare initiale)

Ca urmare trebuie sa determinam complementul fata de 2 al configuratiei 1001 0011 Cum se obtine complementul fata de 2 al unui numar (reprezentat in memorie, deci reprezentat in baza 2)?

Varianta 1 (Oficiala): Se scade binar conținutul (evident binar) al locației de complementat din 100 ...00, unde numărul de după cifra binară 1 are atâtea zerouri câți biți are locația de complementat.

```
1 0000 0000 –

1001 0011

0110 1101 = 6Dh = 96+13 = 109 (deci complementul fata de 2 pe 8 biti al numarului 147 este 109)
```

Ca urmare, valoarea in interpretarea CU SEMN a numarului 1001 0011 este -109

Varianta 2 (derivată din definiția complementului față de 2 – mai rapidă dpdv practic): se inversează valorile tuturor biților (valoarea 0 devine 1 și valoarea 1 devine 0) din locația de reprezentare, după care se adaugă 1 la valoarea obținută.

Cf acestei reguli, plecăm deci de la 1001 0011 și inversăm valorile tuturor biților, obținând 0110 1100 dupa care adaugam 1 la valoarea obtinuta: 0110 1100 + 1 = 0110 1101 = 109; Ca urmare, valoarea in interpretarea CU SEMN a numarului 1001 0011 este -109

Varianta 3 (MULT mai rapidă dpdv practic, cea mai rapidă pt obținerea configurației binare a complementului față de 2): Se lasă neschimbați biții începând din dreapta reprezentării binare până la primul bit 1 inclusiv, iar restul biților se inversează.

Aplicând această regulă, plecăm de la 1001 0011 și lăsăm neschimbați biții din dreapta până la primul bit 1 inclusiv (în cazul nostru asta înseamnă doar primul bit 1 din dreapta – care ramâne așadar neschimbat), iar restul biților se inversează, deci obținem... 0110 1101 = 6DH = 109

Deci, valoarea in interpretarea CU SEMN a numarului 1001 0011 este -109

Varianta 4 (CEA mai rapidă dpdv practic, dacă ne interesează doar valoarea absolută în baza 10 a complementului față de 2):

Regulă derivată din definiția complementului față de 2: Suma valorilor absolute a celor două valori complementare este cardinalul mulțimii reprezentabile pe acea dimensiune.

- Pe 8 biţi se pot reprezenta 2^8 valori = 256 valori ([0..255] sau [-128..+127])
- Pe 16 biţi se pot reprezenta 2^16 valori = 65536 valori ([0..65535] sau [-32768,+32767])
- Pe 32 biţi se pot reprezenta 2^32 valori = 4.294.967.296 valori (...)

Deci pe 8 biti , complementul fata de 2 a lui 1001 0011 (= 93h = 147) este 256 - 147 = 109, ca urmare valoarea in interpretarea CU SEMN pentru 1001 0011 este -109

[0..255] – interval de reprezentare admisibil pt "intreg FARA semn reprezentat pe 1 octet" [-128..+127] – interval de reprezentare admisibil pt "intreg CU semn reprezentat pe 1 octet"

[0..65535] – interval de reprezentare admisibil pt "intreg FARA semn reprezentat pe Word = 2 octeti" [-32768..+32767] – interval de reprezentare admisibil pt "intreg CU semn reprezentat pe Word = 2 octeti"

La ce ne trebuie complementul fata de 2 noua ca programatori in ASM?

1001 0011 (= 93h = 147), deci in interpretarea FARA SEMN 1001 0011= 147

```
Care este valoarea in interpretarea cu semn a lui 1001 0011?

Care este valoarea in interpretarea cu semn a lui 93h?

Care este valoarea in interpretarea cu semn a lui 147 din baza 10?

a). 01101101 b).-109 c). 6Dh d).+147

(nici unul dintre raspunsuri, deoarece intrebarea este un nonsens – pentru că 147 ESTE DEJA O INTERPRETARE !!!)
```

```
1 0000 0000 –

1001 0011

01101101 = 6Dh = 96+13 = 109 (deci complementul fata de 2 pe 8 biti al numarului 147 este 109)
```

Ca urmare, valoarea in interpretarea CU SEMN al numarului 1001 0011 este... -109

Deci 147 si 109 sunt 2 valori complementare, în sensul că 1001 0011 = fie 147, fie -109 în funcție de interpretare. Deci complementul lui 147 este -109. Este valabil oare și invers ? Este -147 complementul lui 109 ?... NU!!!!!!! Si daca nu, care este complementul lui 109 atunci ?

Sa verificam... 109 = 01101101, complementul fata de 2 a lui 01101101 este 10010011 = 147, deci.... Ce facem dpdv cu informația aceasta? ...și care este concluzia atunci?...

Matematic, reprezentarea unui număr NEGATIV în complement față de doi este valoarea 2ⁿ-V, unde V este valoarea absolută a numărului reprezentat. Deci toată discuția despre complementul față de 2 are sens dpdv practic DOAR ATUNCI când ne referim la REPREZENTAREA BINARA a unui număr NEGATIV din baza 10 !!! Adică la INTERPRETAREA CU SEMN a unui număr binar care începe cu 1 !! Adică DOAR atunci când discutăm despre INTERPRETAREA de numere care încep cu 1 în baza 2 !!!!!! Atunci când avem un număr binar care începe cu 0, INTERPRETAREA lui VA FI ACEEASI atât în CU SEMN cât și fără semn, adică 01101101 = 109 IN AMBELE INTERPRETARI !! Ca urmare, faptul că 147 este în sine "complementul lui 01101101 (109 în baza 10) față de 2 ca valoare absolută" nu ne ajută la nimic și nu are nici o urmare practică pentru nimic într-un astfel de context.

Deci: toată discuția despre valori complementare are sens doar dacă atenția noastră se concentrează pe problematica NUMERELOR NEGATIVE!! Ex: se pleacă de la o reprezentare în baza 2 care începe cu 1 și ne întrebăm care va fi numărul negativ asociat în interpretarea CU SEMN!! Sau: plecăm de la o valoare aboslută (109 sau 147) și ne întrebăm care este reprezentarea în baza 2 pentru numărul -109 sau pentru -147!! Deci totul se învârte in jurul numerelor NEGATIVE!!

O abordare care pleacă de la o reprezentare în baza 2 care începe cu 0 și se întreabă sec DOAR care va fi "valoarea complementară a acelei reprezentări" (fără ca această valoare complementară să fie folosită apoi la ceva concret) nu își are sensul scoasă din contextul interpretării unui număr CU SEMN <u>ca negativ.</u>

Faptul că există un interval de valori pentru care interpretarea unei configurații binare este aceeași în ambele interpretări se întâmplă (luăm ca exemplu dimensiunea unui octet) deoarece [0..255] ∩ [-128..+127] = [0..+127] și astfel orice număr din intervalul [0..+127] va reprezenta atât varianta CU SEMN cât și cea FARA SEMN a configurației binare date! Aceasta REPREZENTARE în baza 2 va fi o secvență de biți care începe cu 0, o astfel de secvență fiind caracterizată de faptul că în baza 10 valoarea sa va fi aceeași (pozitivă!) în ambele interpretări. Aceste numere fac parte din intersecția interpretării fără semn [0..255] cu cea cu semn [-128..+127].

Deci intersecția intervalelor de reprezentare admisibile pe dimensiunea N este constituită DOAR din valorile care în binar încep cu bitul 0 ! Ca urmare, valorile binare care încep cu bitul 1 NU sunt comune acestor intervale "complementare", ceea ce înseamnă că interpretările cu semn și fără semn ale oricărei configurații binare care începe cu 1 VOR FI INTOTDEAUNA DIFERITE și ele NU vor fi NICIODATA părți ale aceluiași interval de reprezentare admisibil !!! Valorile absolute ale celor două interpretări reprezintă două valori complementare. Ex: -128, 128; 147, -109; -1, 255; -3, 253; -127, 129 NU vor face parte niciodată din același interval de reprezentare admisibil. (NU se aplică însă și pentru 127, -129 !!! – explicațiile urmează... ©)

Aşadar... care este reprezentarea binara pt -147 ? Sau cât este 10010011 în interpretarea cu semn ? 147 = 10010011, deci ... cum il obtinem pe -147 ?

Mai general, hai să vedem care sunt tipurile de întrebări pe care le putem pune plecând de la o configurație binară dată și să fixăm astfel care sunt situațiile în care apare necesitatea utilizării complementului față de 2:

a) Dacă avem o REPREZENTARE de tip $\overline{0xxx}$ de valoare $+\overline{abc}$ în interpretarea FARA semn, ce valoare va avea această REPREZENTARE în interpretarea CU SEMN ?

R: Tot atâta! Un număr care începe cu 0 în baza 2 are aceeași valoare atât în interpretarea cu semn cât și în cea fără semn, fiind un număr pozitiv (109 este tot 109 în ambele interpretări).

b). Dacă avem o REPREZENTARE de forma $\overline{0xxx}$ de valoare $+\overline{abc}$, care va fi REPREZENTAREA binară a valorii $-\overline{abc}$? (Ex: dacă plecăm de la 109, cum se reprezintă binar -109?)

R: De abia într-o astfel de întrebare începe "complementul față de 2 să joace un rol", iar răspunsul este: REPREZENTAREA sa va fi "complementul față de 2 al configurației binare inițiale". Pentru valoarea 109 = 01101101, complementul față de 2 a lui 01101101 este 10010011, deci -109 = 10010011

Ca urmare putem concluziona că valoarea complementară a unui întreg care începe cu 0, va începe cu 1 (excepție făcând doar valoarea 0) și va încăpea ca valoare complementară în interpretarea CU SEMN pe aceeași dimensiune de reprezentare ca și valoarea inițială !! (-109 este tot un byte ca și 109).

c). Dacă avem o REPREZENTARE de tip 1xxx... de valoare +abc în interpretarea FARA semn, ce valoare va avea această REPREZENTARE în interpretarea CU SEMN?

R: Valoarea sa este: - (complementul fata de 2 al configurației binare initiale). Pentru exemplul nostru, avem: 10010011 = 147 (fără semn) = - (complementul față de 2 al configurației 10010011) = -(01101101) = -109.

d). Dacă avem o REPREZENTARE de forma $\overline{1xxx}$ de valoare $+\overline{abc}$, care va fi REPREZENTAREA binară a valorii $-\overline{abc}$? (Ex: dacă plecăm de la 10010011 = +147, cum se reprezintă binar -147?)

R: Răspunsul nu poate fi decât unul similar cu cel de la b) : REPREZENTAREA sa va fi "complementul față de 2 al configurației binare inițiale". Numai că: dacă un număr începe cu 1 în reprezentarea lui în baza 2 și are valoarea +abc în interpretarea FARA SEMN, atunci tot cu 1 va trebui să înceapă și varianta lui negativă -abc ca REPREZENTARE (pentru că în caz contrar nu ar mai fi un număr negativ în interpretarea CU SEMN). Dar, complementarea unei valori binare de forma $\overline{1xxx}$ va furniza prin complementare în mod natural o valoare binară CARE INCEPE CU 0 pe o dimensiune de reprezentare identică cu cea de pornire !!! - excepție făcând DOAR valorile de forma $\overline{100}$ (-128, +128, -32768, +32768 etc).

Ca urmare, concluzionăm că dacă plecăm de la o reprezentare de forma $\overline{1xxx}$ de valoare $+\overline{abc}$ NU PUTEM OBTINE valoarea $-\overline{abc}$ PE O ACEEASI DIMENSIUNE DE REPREZENTARE !!!!!

<u>Dovada</u>: 147 = 10010011 (147 ∈ [0..255], însă -147 ∉ [-128..+127], deci -147 NU este reprezentabil pe un octet chiar daca +147 este !!!!!!)

Deci nu numai că, complementarea nu poate fi făcută corect pe aceeași dimensiune de reprezentare ca a valorii inițiale ca METODOLOGIE, dar și analiza intervalelor de reprezentare admisibile ne confirmă asta dpdv SEMANTIC!!!!

Ca urmare, obținerea lui -147 plecând de la 147 = 10010011, se face astfel:

- i). Reprezentarea binară a lui 147 începe cu 1, dar trebuie să ținem cont și că -147 ∉ [-128..+127], însă -147 ∈ [-32768..+32767] ceea ce duce la concluzia că -147 NU este reprezentabil ca octet CI DOAR CA SI CUVANT!!
- ii). Pe o dimensiune de tip WORD, 147 = 00000000 10010011 (deci un număr binar care începe cu 0) și conform răspunsului de la b), avem că -147 = "complementul față de 2 al configurației binare inițiale".

Complementul față de 2 a configurației 00000000 10010011 este 11111111 01101101, deci--147 = 11111111 01101101 = FF6Dh

Verificare: 11111111 01101101 = FF6Dh = 65389 in interpretarea FARA semn, suma valorilor absolute a celor doua valori complementare fiind 65389 + 147 = 65536 = cardinalul multimii numerelor reprezentabile pe 1 WORD, deci cele 2 interpretari ale configuratiei binare 11111111 01101101 sunt corecte si consistente!!

Ca urmare, putem deduce că implicarea "complementului față de 2" se manifestă în <u>3 cazuri</u> :

Format	Interpretare	Valoare	In ce fel este implicat	Răspuns
binar nr			"complementul față de 2"	
0xxx	Fără semn	+abc	1	-
	Cu semn	+abc	Cum se reprezintă -abc?	Compl fata de 2 a lui 0xx
1xxx	Fără semn	+def	-	-
	Cu semn	-(compl fata	Cum se reprezintă -def?	Compl fata de 2 a lui 1xx extins fără
		de 2 a lui 1xx)		semn pe 2 * sizeof (1xxx)

(excepție fac reprezentările de forma de forma $\overline{100}$ (-128, +128, -32768, +32768 etc).

A se remarca faptul că noțiunea de "complement față de 2" NU este implicată în nici un fel atunci când abordăm doar reprezentările fără semn! Exemplu:

Nr binar	Interpretare	Valoare	In ce fel este implicat	Răspuns
			"complementul față de 2"	
01101101	Fără semn	+109	-	-
	Cu semn	+109	Cum se reprezintă -109 ?	10010011
10010011	Fără semn	+147	-	-
	Cu semn	-(01101101) =	Cum se reprezintă -147?	Complementul față de 2 a lui
		-109		00000000 10010011 care este
				11111111 01101101

Coloanele 3 și 4 de mai sus pot fi rezumate astfel:

Numărul X în	-X începe	-X se reprezintă:	Exemple:
reprezentare binară	cu		
începe cu			
0	1	Pe aceeași dimensiune ca X	109 = 01101101; $-109 = 10010011$
1	1	2 * sizeof(X)	147 = 10010011; -147 = 11111111 01101101

(excepție fac reprezentările de forma de forma $\overline{100}$ (-128, +128, -32768, +32768 etc).

Ca și concluzie: <u>complementul față de 2</u> a unui număr care are aceeași valoare în ambele interpretări (și doar un număr pozitiv poate avea aceeași valoare în ambele interpretări!) NU se poate reprezenta ca număr negativ în baza 2 pe aceeași dimensiune de reprezentare ca numărul inițial. Mai exact, complementul față de 2 a lui 109, fiind 147, ceea ce vrem să subliniem este ca <u>-147 nu se poate reprezenta pe un octet</u>!

Care este nr MINIM de biti pe care se poate reprezenta -147 ?

Pe n biti se reprezinta 2^n valori:
 fie valorile [0..2^n - 1] in interpretarea FARA SEMN
 fie valorile [-2^(n-1), 2^(n-1)-1] in interpretarea CU SEMN

Pe 8 biti astfel se pot reprezenta 2⁸ valori (=256 valori), fie $[0..2^8-1] = [0..255]$ in interpretarea FARA SEMN, fie valorile $[-2^8-1] = [-2^7, 2^7-1] = [-128..+127]$ in interpretarea CU SEMN

Pe 9 biti... [0..511] sau [-256..+255] si cum -147 € [-256..+255] rezulta ca numarul MINIM de biti pe care se poate reprezenta -147 este 9, iar reprezentarea lui -147 este:

(...Pe 9 biti se pot reprezenta 512 numere, 512-147 = 365 = 1 6Dh = 1 0110 1101 ...)

Deci 1 0110 1101 = 16Dh = 256 + 6*16 + 13 = 256 + 96 + 13 = 365 in interpretarea FARA SEMN!

 $1\ 0110\ 1101 = -(complemental fata de 2 a lui 1\ 0110\ 1101) = -(0\ 1001\ 0011) = -(093h) = -147$

Ca si TD in ASM, evident ca avem byte, word sau dword, deci -147 € [-32768..+32767] si cf. celor de mai sus avem -147 = 11111111 01101101 = FF6Dh ca valoare reprezentata pe cuvant (word) = 2 octeti.

Care este numărul minim de biţi pe care se poate reprezenta 3 ? Răspuns: pe 2 biţi; 3 = 11b

Pe 2 biti se pot reprezenta 2^2 valori (=4 valori), fie $[0..2^2-1] = [0..3]$ in interpretarea FARA SEMN, fie valorile $[-2^2-1]$ in interpretarea CU SEMN

Care este numărul minim de biți pe care se poate reprezenta -3 ? Răspuns: pe 3 biți; deoarece pe 2 biți NU se poate datorită explicației de mai sus și pe 3 biți avem că:

Pe 3 biti se pot reprezenta 2³ valori (=8 valori), fie $[0..2^3-1] = [0..7]$ in interpretarea FARA SEMN, fie valorile $[-2^3-1]$ in interpretarea CU SEMN

Ca urmare, cum

(...Pe 3 biti se pot reprezenta 8 numere, 8-3=5=101b...) - deci 101b este reprezentarea lui -3 pe 3 biţi

101b = 5 in interpretarea FARA SEMN!

101b = -(complementul fata de 2 a lui 101) = -(011) = -3

De lamurit: <u>Cine este "complementul fata de 2" pentru cine</u> ? <u>Si față de cine ?</u>...

O configuratie binara fata de alta? Sau un numar zecimal cu semn față de unul fără semn? Sau două valori absolute una față de alta?... Vom vedea ca se folosesc în practică toate cele 3 exprimări...

"Complementul fata de 2" se refera la REPREZENTARI sau la INTERPRETARI...?

Pt ca este "FATA DE 2" se refera LA BAZA 2, deci ne referim în primul rând ca definiție la REPREZENTARI

- complementul față de 2 a lui 01101101 este 10010011 (asta mă ajută să răspund la întrebarea <u>"care este reprezentarea lui -109 ?"</u>)
- complementul față de 2 a lui 10010011 este 01101101 (asta mă ajută să răspund la întrebarea "care este valoarea în interpretarea CU SEMN a lui 10010011)

Pe de alta parte ne referim SI LA INTERPRETARI, mai exact la INTERPRETARILE FARA SEMN ale celor două reprezentări binare complementare - 01101101 şi 10010011 de exemplu – spunând că "109 şi 147 sunt 2 valori complementare" (echivalent semantic şi cu "<u>Valorile absolute ale celor două interpretări ale unui număr binar ce începe cu 1 reprezintă două valori complementare"</u>). Adică 147 şi 109 sunt 2 valori complementare, în sensul că REPREZENTAREA 1001 0011 = fie +147, fie -109 în funcție de interpretare. INSA NU există o reprezentare care să aibă fie valoarea -147, fie 109 !!

De aceea, pentru a distinge claritatea a ceea ce se vrea a fi subliniat, se forțează de multe ori exprimarea într-un sens poate incorect cumva relativ la definiție dar relevant ca și concluzie în cazuri ca cel de mai sus, astfel: 147 și 109 sunt 2 valori complementare, în sensul că "-109 este complementul lui +147", însă "-147 NU este complementul lui +109" !!! Forțarea aici este reprezentată de apariția semnului MINUS în exprimare... însă pe de altă parte devine clar ceea ce se vrea exprimat.

Deci... NU are sens discuția despre valori complementare în baza 10 pornind de la o REPREZENTARE care începe cu 0 în baza 2 !! ... de exemplu în sensul că pornind de la 01101101 (109) valoarea sa complementară este 10010011 (147). Ca aceste concept să aibă sens trebuie să fie implicate în discuție DIN START "reprezentarea unui număr negativ" sau "interpretarea unei configurații binare CE INCEPE CU BITUL 1 ca număr cu semn".

Deci implicarea "complementului față de 2" este una UNIDIRECTIONALA !!! având sens doar pornind dinspre interpretarea CU SEMN și a reprezentării numerelor negative! Asta exprima de fapt "forțarea" de mai sus...