

ARA DENT STUDIO · PITESTI

Cabinet Stomatologic Premium

GHIDUL

BOLII PARODONTALE

Previne. Trateaza. Pastreaza-ti dintii.

Boala parodontala se poate preveni si trata —
dar osul pierdut nu se mai reface. Trateaza din timp.

Editia 2026

Dr. Robert Lungu

Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolara

Prima consultatie — GRATUITA

Suna: 0754 219 011 | Luni-Vineri 09:00-18:00

01

Ce este
boala
parodontala?

Definitie

Boala parodontala este o infectie bacteriana cronica care afecteaza tesuturile de sustinere ale dintelui — gingia, ligamentul parodontal si osul alveolar. Netratata, duce la distrugerea progresiva a osului care sustine dintii si, in final, la pierderea acestora.

Formele bolii parodontale

FORMA CLINICA

Gingivita

Forma initiala, reversibila. Afecteaza doar gingia — fara distructie osoasa. Tratata corect, se vindeca complet.

FORMA CLINICA

Parodontita marginala cronica superficiala

Bacteriile au ajuns sub gingie. Incepe distructia osoasa. Tratamentul opreste evolutia dar osul pierdut nu se mai reface.

FORMA CLINICA

Parodontita marginala cronica profunda

Distructie osoasa avansata, pungi parodontale adanci, mobilitate dentara. Necesita tratament complex. Cu cat astepti mai mult, cu atat pierzi mai mult os.

02

Semne de
alarmă

Cum recunosti boala parodontala

SEMN DE ALARMA**Sangerare gingivala la periaj sau spontana**

Cel mai frecvent semn precoce. Gingia sanatoasa NU sangereaza. Sangerarea inseamna inflamatie activa — bacteriile sunt prezente.

SEMN DE ALARMA**Retractie gingivala — "dintii par mai lungi"**

Gingia se retrage expunand radacina. Odata retrasa, gingia nu revine la pozitia initiala fara interventie chirurgicala.

SEMN DE ALARMA**Mobilitate dentara**

Dintele se misca la atingere sau masticatie. Semn de distructie osoasa avansata. Cu cat mobilitatea e mai mare, cu atat osul pierdut e mai mult.

SEMN DE ALARMA**Spatii aparute intre dinti**

Dintii par ca se "departeaza". Osul care ii tinea impreuna s-a resorbit.

SEMN DE ALARMA**Miros urat persistent (halena)**

Bacteriile din pungile parodontale produc compusi sulfurosi cu miros caracteristic, greu de mascat cu pasta de dinti sau apa de gura.

SEMN DE ALARMA**Durere sau disconfort la masticatie**

Semn ca infectia este activa si afecteaza structurile de sustinere.

De ce trebuie tratata din timp

03

Osul alveolar pierdut nu se mai reface — acesta e mesajul cel mai important

Aceasta este diferenta fundamentala dintre boala parodontala si o carie: o carie se trateaza si dintele revine la normal. In boala parodontala, odata ce osul s-a resorbit, acel os nu mai creste la loc. Tratamentul opreste distructia — dar nu o inverseaza.

STADIU INCIPIENT

Gingivita

Gingia inflama, sangereaza.
Osul intact. Tratament simplu
— detartraj + igienizare.
Vindecarea e completa.

STADIU MEDIU

Parodontita superficiala

Incepe distructia osoasa.
Tratament: chiuretaj
subgingival. Evolutia se
opreste dar osul pierdut
ramane pierdut.

STADIU AVANSAT

Parodontita profunda

Distructie osoasa severa,
mobilitate dentara. Tratament
complex, posibil chirurgical.
Unii dinti pot fi pierduti.

*Boala parodontala se poate preveni si trata.
Osul pierdut insa nu se mai reface. Trateaza din timp.*

— Dr. Robert Lungu

Factori de risc

04

Cine este mai predispus la boala parodontala

Factori modificabili

- Igiena orala deficitara — placa bacteriana acumulata
- Fumatul — reduce vascularizatia gingivala si masca sangerarea
- Stresul cronic — scade imunitatea locala
- Alimentatie saraca in vitamina C si D
- Detartraj efectuat rar sau deloc
- Bruxism (scrasnit) — agraveaza distructia osoasa

Factori nemodificabili

- Predispozitie genetica — agregare familiala
- Diabet zaharat — creste susceptibilitatea la infectii
- Sarcina — modificarile hormonale amplifica raspunsul gingival
- Medicamente care produc hiperplazie gingivala
- Boli sistemice imunosupresoare

Fumatul este cel mai important factor de risc modificabil. Pacientii fumatori au risc de 3-7 ori mai mare de a dezvolta boala parodontala si raspund mai slab la tratament. Renuntarea la fumat imbunatateste semnificativ prognosticul.

Diabetul si boala parodontala se influenteaza reciproc — diabetul agraveza boala parodontala si invers.

Cum se trateaza boala parodontala

05

Tratamentul pas cu pas la ARA DENT STUDIO

ETAPA 1

Consultatie parodontala + evaluare completa

Sondaj parodontal complet — masuram adancimea pungilor la toti dintii. Radiografii pentru evaluarea nivelului osos. Plan de tratament personalizat. Prima consultatie este gratuita.

ETAPA 2

Igienizare profesionala + detartraj supragingival

Indepartarea tartrului si a placii bacteriene de deasupra gingiei cu ultrasunete si Air-Flow. Esential ca prim pas — reduce incarcatura bacteriana inainte de tratamentul subgingival.

ETAPA 3

Chiuretaj subgingival (root planing)

Curatarea radacinilor sub gingie cu chiurete specializate. Indepartam tartrul subgingival, tesutul de granulatie infectat si netezim suprafata radiculara pentru a impiedica readeziunea bacteriilor. Se efectueaza sub anestezie locala — fara durere.

ETAPA 4

Reevaluare parodontala — dupa 6-8 saptamani

Dupa ce tesuturile s-au vindecat, reevaluam rezultatele. Masuram din nou pungile parodontale si nivelul osos. Decidem daca tratamentul conservator a fost suficient sau daca sunt necesare proceduri chirurgicale suplimentare.

ETAPA 5

Mentinere parodontala pe termen lung

Boala parodontala nu se vindeca definitiv — se controleaza. Pacientii cu boala parodontala au nevoie de detartraj si chiuretaj de mentinere la 3-6 luni pe toata viata. Fara mentinere, boala reapare si distructia continua.

Cum previi boala parodontala

06

Boala parodontala este in mare masura o boala care se poate preveni

Rutina zilnica corecta

- Periaj corect de 2 ori pe zi — minim 2 minute
- Ata dentara zilnic — indeparteaza placa interproximal
- Apa de gura antibacteriana — adjuvant, nu inlocuieste periajul
- Periuta interdentara — pentru spatii mai mari
- Periaj imediat dupa dulciuri si bauturi acide

Controale regulate la medic

- Detartraj profesional la 6 luni — obligatoriu
- Control stomatologic anual minim
- Radiografii periodice pentru evaluarea osului
- Comunicare deschisa — spune medicului orice simptom
- Pacientii cu risc — detartraj la 3-4 luni

Semne care trebuie sa te trimita imediat la medic

Sangerare gingivala
la fiecare periaj

Gingie rosie,
umflata sau
dureroasa

Dinte care pare ca
s-a "lungit" sau
s-a miscat

Miros urat
persistent care nu
dispare

Boala parodontala se poate preveni.

Daca a aparut, se poate trata.

Osul pierdut nu se mai reface — de aceea tratamentul precoce este esential.

ARA DENT STUDIO

Bd. Republicii nr. 19, Pitesti

0754 219 011

WhatsApp: 0754 219 011

aradentpitesti.ro

Luni – Vineri | 09:00 – 18:00

Dr. Robert Lungu — Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolara

Detartraj, chiuretaj subgingival, evaluare parodontala — ARA DENT STUDIO Pitesti