

Abgabe Hausübung im Fach Mathematik 0



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Abgabe von:

Ruben Deisenroth (Mat.: 9876543),
Max Mustermann (Mat.: 1234567),
Peter Peterson (Mat.: 0000000)

Übungsblatt Nummer: 01**Übungsgruppe Nummer:** 69**Übungsgruppenleiter:** Senpai Yoda**Semester:** WiSe 2020/21**Fachbereich:** Informatik**Datum:** 26. Februar 2021

H 1.1: Systematisches Testen von Methoden**(8 Punkte)**

a) Was ist $1+1$? im Fach Mathe 0 gehen wir mit Zahlen wie Folgt um: $1 + 1 = -1 - (-3) = \sqrt{4} = \underline{\underline{2}}$

b) Was ist $2-1$?

$$2 - 1 = 42 - 41 = \sqrt{\left(\frac{2e^{42}}{\pi}\right)^0} = \underline{\underline{1}}$$

H 1.2: UwUOwO**(2 Punkte)**

LwL

H 1.3: Alternativer style

(5 Punkte)

Such pretty much wow

1.3 a) Ganzzahladdition auf \mathbb{N}

(3 Punkte)

Was ist $69+420$?

Lösung:

Die Antwort auf Alles ist 42. Die Antwort auf diese Frage ist jedoch 489.

1.3 b) Irgend son Graph

(2 Punkte)

Gegeben: $f(x) = 0,5(x+1)^2 - 2$

Zu berechnen: Nullstellen von $f(x)$

Lösung:

$$\begin{aligned} 0,5(x+1)^2 - 2 &= 0 && | \text{Klammer auflösen} \\ 0,5 \cdot (x^2 + 2 \cdot x \cdot 1 + 1^2) - 2 &= 0 && | \text{Ausmultiplizieren} \\ 0,5 \cdot x^2 + x + 0,5 - 2 &= 0 \\ 0,5 \cdot x^2 + x - 1,5 &= 0 && | \text{Mitternachtsformel mit } a=0,5; b=1; c=-1,5 \\ \frac{-(1) \pm \sqrt{1^2 - (4 \cdot 0,5 \cdot (-1,5))}}{2 \cdot 0,5} &= x_{1/2} \\ \frac{-1 \pm \sqrt{1 - (-3)}}{1} &= x_{1/2} \\ \frac{-1 \pm \sqrt{4}}{1} &= x_{1/2} \\ -1 \pm 2 &= x_{1/2} \Rightarrow \underline{\underline{x_1 = 1, x_2 = -3}} \end{aligned}$$

H 1.4: Weitere Macros

(2 Punkte)

asdfgg Boxed/framed environments

Definition 1.4.1 – Mitternachtsformel Für eine Polynom zweiten Grades in der Form $a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ gilt für $a, b, c \in \mathbb{R}$ immer:

$$(1) \quad x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

Definition 1.4.2 test

0.1. ---

asdf

0.2. ()MBbd|

asdf hi

a